

第一学期期末高等数学试卷

一、解答下列各题

(本大题共 16 小题, 总计 80 分)

1、(本小题 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 12x + 16}{2x^3 - 9x^2 + 12x - 4}$

2、(本小题 5 分)

求 $\int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$.

3、(本小题 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x \cdot \arcsin \frac{1}{x}$

4、(本小题 5 分)

求 $\int \frac{x}{1-x} dx$.

5、(本小题 5 分)

求 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt$.

6、(本小题 5 分)

求 $\int \cot^6 x \cdot \csc^4 x dx$.

7、(本小题 5 分)

求 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} dx$.

8、(本小题 5 分)

设 $\begin{cases} x = e^t \cos t^2 \\ y = e^{2t} \sin t \end{cases}$ 确定了函数 $y = y(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

9、(本小题 5 分)

求 $\int_0^3 x \sqrt{1+x} dx$.

10、(本小题 5 分)

求函数 $y = 4 + 2x - x^2$ 的单调区间

11、(本小题 5 分)

求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{8 + \sin^2 x} dx$.

12、(本小题 5 分)

设 $x(t) = e^{-kt} (3\cos \omega t + 4\sin \omega t)$, 求 dx .

13、(本小题 5 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^2 + \ln y^2 = x^6$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

14、(本小题 5 分)

求函数 $y = 2e^x + e^{-x}$ 的极值

15、(本小题 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2 + (2x+1)^2 + (3x+1)^2 + \cdots + (10x+1)^2}{(10x-1)(11x-1)}$

16、(本小题 5 分)

求 $\int \frac{\cos 2x}{1 + \sin x \cos x} dx$.

二、解答下列各题

(本大题共 2 小题, 总计 14 分)

1、(本小题 7 分)

某农场需建一个面积为 512 平方米的矩形的晒谷场, 一边可用原来的石条围沿, 另三边需砌新石条围沿, 问晒谷场的长和宽各为多少时, 才能使材料最省.

2、(本小题 7 分)

求由曲线 $y = \frac{x^2}{2}$ 和 $y = \frac{x^3}{8}$ 所围成的平面图形绕 ox 轴旋转所得的旋转体的体积.

三、解答下列各题

(本大题 6 分)

设 $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$, 证明 $f'(x) = 0$ 有且仅有三个实根.

一学期期末高数考试 (答案)

一、解答下列各题

(本大题共 16 小题, 总计 77 分)

1、(本小题 3 分)

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 12}{6x^2 - 18x + 12} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{12x - 18} \\ &= 2\end{aligned}$$

2、(本小题 3 分)

$$\begin{aligned}&\int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{(1+x^2)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} + C.\end{aligned}$$

3、(本小题 3 分)

$$\begin{aligned}&\text{因为 } |\arctan x| < \frac{\pi}{2} \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow \infty} \arcsin \frac{1}{x} = 0 \\ &\text{故 } \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x \cdot \arcsin \frac{1}{x} = 0\end{aligned}$$

4、(本小题 3 分)

$$\begin{aligned}&\int \frac{x}{1-x} dx \\ &= -\int \frac{1-x-1}{1-x} dx \\ &= -\int dx + \int \frac{dx}{1-x} \\ &= -x - \ln|1-x| + C.\end{aligned}$$

5、(本小题 3 分)

$$\text{原式} = 2x\sqrt{1+x^4}$$

6、(本小题 4 分)

$$\begin{aligned} & \int \cot^6 x \cdot \csc^4 x \, dx \\ &= - \int \cot^6 x (1 + \cot^2 x) d(\cot x) \\ &= -\frac{1}{7} \cot^7 x - \frac{1}{9} \cot^9 x + c. \end{aligned}$$

7、(本小题 4 分)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= -\sin \frac{1}{x} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= -1 \end{aligned}$$

8、(本小题 4 分)

$$\begin{aligned} \text{解: } \frac{dy}{dx} &= \frac{e^{2t} (2\sin t + \cos t)}{e^t (\cos^2 t - 2t \sin^2 t)} \\ &= \frac{e^t (2\sin t + \cos t)}{(\cos^2 t - 2t \sin^2 t)} \end{aligned}$$

9、(本小题 4 分)

$$\begin{aligned} \text{令 } \sqrt{1+x} &= u \\ \text{原式} &= 2 \int_1^2 (u^4 - u^2) du \\ &= 2 \left(\frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{116}{15} \end{aligned}$$

10、(本小题 5 分)

$$\begin{aligned} & \text{函数定义域 } (-\infty, +\infty) \\ & y' = 2 - 2x = 2(1 - x) \\ & \text{当 } x = 1, y' = 0 \\ & \text{当 } x < 1, y' > 0 \text{ 函数单调增区间为 } (-\infty, 1] \\ & \text{当 } x > 1, y' < 0 \text{ 函数的单调减区间为 } [1, +\infty) \end{aligned}$$

11、(本小题 5 分)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \cos x}{9 - \cos^2 x} \\ &= - \frac{1}{6} \ln \frac{3 + \cos x}{3 - \cos x} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{6} \ln 2 \end{aligned}$$

12、(本小题 6 分)

$$\begin{aligned} dx &= x'(t) dt \\ &= e^{-kt} [(4\omega - 3k) \cos \omega t - (4k + 3\omega) \sin \omega t] dt \end{aligned}$$

13、(本小题 6 分)

$$\begin{aligned} 2yy' + \frac{2y'}{y} &= 6x^5 \\ y' &= \frac{3yx^5}{y^2 + 1} \end{aligned}$$

14、(本小题 6 分)

定义域 $(-\infty, +\infty)$, 且连续

$$y' = 2e^{-x}(e^{2x} - \frac{1}{2})$$

$$\text{驻点: } x = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$$

$$\text{由于 } y'' = 2e^x + e^{-x} > 0$$

$$\text{故函数有极小值, } y(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}) = 2\sqrt{2}$$

15、(本小题 8 分)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{x})^2 + (2 + \frac{1}{x})^2 + (3 + \frac{1}{x})^2 + \cdots + (10 + \frac{1}{x})^2}{(10 - \frac{1}{x})(11 - \frac{1}{x})} \\ &= \frac{10 \times 11 \times 21}{6 \times 10 \times 11} \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

16、(本小题 10 分)

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \frac{\cos 2x}{1 + \sin x \cos x} dx &= \int \frac{\cos 2x}{1 + \frac{1}{2} \sin 2x} dx \\ &= \int \frac{d(\frac{1}{2} \sin 2x + 1)}{1 + \frac{1}{2} \sin 2x} \\ &= \ln \left| 1 + \frac{1}{2} \sin 2x \right| + c \end{aligned}$$

二、解答下列各题

(本大题共 2 小题, 总计 13 分)

1、(本小题 5 分)

设晒谷场宽为 x , 则长为 $\frac{512}{x}$ 米, 新砌石条围沿的总长为

$$L = 2x + \frac{512}{x} \quad (x > 0)$$

$$L' = 2 - \frac{512}{x^2} \quad \text{唯一驻点} \quad x = 16$$

$$L'' = \frac{1024}{x^3} > 0 \quad \text{即 } x = 16 \text{ 为极小值点}$$

故晒谷场宽为 16 米, 长为 $\frac{512}{16} = 32$ 米时, 可使新砌石条围沿

所用材料最省

2、(本小题 8 分)

$$\text{解: } \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{8}, 8x^2 = 2x^3 \quad x_1 = 0, x_2 = 4.$$

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^4 \left[\left(\frac{x^2}{2} \right)^2 - \left(\frac{x^3}{8} \right)^2 \right] dx = \pi \int_0^4 \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{64} \right) dx \\ &= \pi \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{7} x^7 \right) \Big|_0^4 \end{aligned}$$

$$= \pi 4^4 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) = \frac{512}{35} \pi$$

三、解答下列各题

(本 大 题 10 分)

证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 可导, 从而在 $[0, 3]$ 连续, 可导.

又 $f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = 0$

则分别在 $[0, 1], [1, 2], [2, 3]$ 上对 $f(x)$ 应用罗尔定理得, 至少存在

$\xi_1 \in (0, 1), \xi_2 \in (1, 2), \xi_3 \in (2, 3)$ 使 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = f'(\xi_3) = 0$

即 $f'(x) = 0$ 至少有三个实根, 又 $f'(x) = 0$ 是三次方程, 它至多有三个实根,

由上述 $f'(x)$ 有且仅有三个实根

高等数学 (上) 试题及答案

一、 填空题 (每小题 3 分, 本题共 15 分)

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}} .$

2、 当 k 时, $f(x) = \begin{cases} e^x & x \leq 0 \\ x^2 + k & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.

3、 设 $y = x + \ln x$, 则 $\frac{dx}{dy} = \underline{\hspace{2cm}}$

4、 曲线 $y = e^x - x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是

5、 若 $\int f(x) dx = \sin 2x + C$, C 为常数, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}} .$

二、 单项选择题 (每小题 3 分, 本题共 15 分)

1、 若函数 $f(x) = \frac{|x|}{x}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = (\quad)$

A、 0 B、 -1 C、 1 D、 不存在

2、 下列变量中, 是无穷小量的为 ()

A. $\ln \frac{1}{x} (x \rightarrow 0^+)$ B. $\ln x (x \rightarrow 1)$ C. $\cos x (x \rightarrow 0)$ D. $\frac{x-2}{x^2-4} (x \rightarrow 2)$

3、 满足方程 $f'(x) = 0$ 的 x 是函数 $y = f(x)$ 的 ().

A . 极大值点 B . 极小值点 C . 驻点 D . 间断点

4、 下列无穷积分收敛的是 ()

A、 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$

B、 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$

C、 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x} dx$

D、 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

5、设空间三点的坐标分别为 $M(1, 1, 1)$ 、 $A(2, 2, 1)$ 、 $B(2, 1, 2)$ 。则 $\angle AMB =$ _____

A、 $\frac{\pi}{3}$

B、 $\frac{\pi}{4}$

C、 $\frac{\pi}{2}$

D、 π

三、 计算题（每小题 7 分，本题共 56 分）

1、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{\sin 2x}$ 。

2、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

3、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\cos x} e^{-t^2} dt}{x^2}$

4、设 $y = e^5 + \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ ，求 y'

5、设 $f = y(x)$ 由已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ ，求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

6、求不定积分 $\int \frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{2}{x} + 3\right) dx$

7、求不定积分 $\int e^x \cos x dx$

8、设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^x} & x < 0 \\ \frac{1}{1+x} & x \geq 0 \end{cases}$ ，求 $\int_0^2 f(x-1) dx$

四、 应用题（本题 7 分）

求曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成图形的面积 A 以及 A 绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积。

五、 证明题（本题 7 分）

若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$ ， $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ ，证明：

在 $(0,1)$ 内至少有一点 ξ ，使 $f'(\xi) = 1$ 。

参考答案

一. 填空题 (每小题 3 分 , 本题共 15 分)

1、 e^6 2、 $k=1$ 3、 $\frac{x}{1+x}$ 4、 $y=1$ 5、 $f(x)=2\cos 2x$

二 . 单项选择题 (每小题 3 分 , 本题共 15 分)

1、 D 2、 B 3、 C 4、 B 5、 A

三 . 计算题 (本题共 56 分 , 每小题 7 分)

1. 解 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{1}{8}$

2. 解 : $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + e^x + xe^x} = \frac{1}{2}$

3、 解 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\cos x} e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x} = -\frac{1}{2e}$

4、 解 : $y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

5、 解 : $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{2t}$

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dx}{dt} = \frac{-\frac{1}{2t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = -\frac{1+t^2}{4t^3}$

6、 解 : $\int \frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{2}{x}+3\right) dx = -\frac{1}{2} \int \sin\left(\frac{2}{x}+3\right) d\left(\frac{2}{x}+3\right) = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2}{x}+3\right) + C$

7、 解 : $\int e^x \cos x dx = \int \cos x de^x$
 $= e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + \int \sin x de^x$
 $= e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x dx$
 $= e^x (\sin x + \cos x) + C$

8、 解 : $\int_0^2 f(x-1) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \dots$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^0 \frac{dx}{1+e^x} + \int_0^1 \frac{dx}{1+x} \\
&= \int_{-1}^0 \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right) dx + \ln(1+x) \Big|_0^1 \\
&= 1 - \ln(1+e^x) \Big|_{-1}^0 + \ln 2 \\
&= 1 + \ln(1+e^{-1}) = \ln(1+e)
\end{aligned}$$

四. 应用题 (本题 7 分)

解：曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 的交点为 $(1, 1)$,

于是曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成图形的面积 A 为

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

A 绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积为：

$$V = \pi \int_0^1 ((\sqrt{y})^2 - y^4) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{5} \right]_0^1 = \frac{3}{10} \pi$$

五、证明题 (本题 7 分)

证明： 设 $F(x) = f(x) - x$,

显然 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续，在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内可导，

且 $F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} > 0$, $F(1) = -1 < 0$.

由零点定理知存在 $x_1 \in [\frac{1}{2}, 1]$, 使 $F(x_1) = 0$.

由 $F(0) = 0$, 在 $[0, x_1]$ 上应用罗尔定理知，至少存在一点

$\xi \in (0, x_1) \subset (0, 1)$, 使 $F'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$, 即 $f'(\xi) = 1$...