EpiMan|公卫论坛,中国最大的公共卫生专业学术论坛。 【考研考博】版独家整理奉献。

苏州大学二00五年攻读硕士学位研究生入学考试试题 预防综合 学科、专业: ···········研究方向: ···················(A)卷

- 一、卫生统计学部分(30分)
 - 1名词解释(每个2分,共8分)
 - (1)统计量、参数 (2)处理因素
 - (3) 系统抽样 (4) 非参数检验
 - 2. 最佳选择题(每题1, 共10分)
 - (1)图示某地某年流行性乙脑患者的年龄分布,宜绘制()。
 - A. 直条图 B. 圆形图
 - c. 线性 D. 直方图
 - E. 统计地图
 - (2)两样本率的比较,当符合条件时,()。
 - A 只能采用卡方检验 B. 只能采用 u 检验
- c 不可采用 U 检验 D 不可采用精确概率法
- E. 三种方法均可
- (3)假设检验中未拒绝无效假设时,().
- A. 不可能犯第一类错设 B. 不可能犯第二类错误
- c 可能犯第一类错误 D 两类错误都可能犯
- E. 两类错误都不可能犯
- (4)已知钩虫感染率男高子女. 甲乡人口男多于女, 乙乡人口女多于男, 欲比较两乡钩虫总感染率()。
 - A 分性别比较 B 作两率比较的卡方检验
 - c 不能比较 D. 对性别标准化后再比较
 - E. 作两个总率差别的假设检验
 - (5) 成组设计两样本比较的秩和检验中,描述不正确的是()。
 - A. 将两组数据统一由小到大编秩
 - B 遇有相同数据, 若在同一组, 按顺序编秩
 - c 遇有相同数据, 若在不同组, 按顺序编秩
 - D 遇有相同数据, 若在不同组, 取其平均秩次
 - E. 以样本例数较小组的铁和 T 查 T 界值表
 - (6)用二项分布直接计算概率法检验 H0: $\pi = 0.4$,H1: $\pi > 0.4$ 当随样样本含置 n = 10,阳性数 X = 6 时,为作统计推断应将概率 P = ()与检验水准 a 比较.
 - A. P(X=6)
 - B P(X=6)+P(x=7)+...+P(x=1 O)

注意:答案请不要答在试题上

遍号: 359

第(1)页共(5)页

苏 州 大 学

二〇0五年攻读硕士学位研究生入学考试试题

GWR|公卫人脉,公卫人脉平台,认识报考大学公卫师兄师姐的最佳平台。

预防综合}

学科、专业: …… …研究方向: …- …… 考试科日; …… (A)卷

- c P(x=7) + P(x=8) + . + P(x=10)
- D. P(x=6)+P(x=5)+.+P(x=0)
- E. P(x=5)+P(x=4)+...+P(x=0)
- (7)从同一正态总体中随机抽取含量为 n 的样本,理论上有 99%

的样本均数在()范围。

- A. X 的均数加减 2.58S B.X 的均数加减 2.58Sx
 - c. $v \pm 2$. 58 σ D. $v \pm 2$. 580 σ x
 - E.x 的均数±258 σ X
- (8)在四格表卡方检验中. 当有 T<5 时, ()。
 - A 作校正卡方检验 B. 卡方检验不用校正
 - c可采用确切概率法 D.不能作卡方检验
 - E不能采用确切概率法
- (9)原始数据分布不明时,表示集中趋势的指标()。
- A 均数合理 B. 中位数合理
- C. 几何均数合理 D.均数和中位数都合理
- E. 几何均数和中位数都合理
- (11)两样本比较作 t 检验,差别有显著性时,P 值越小说明()。
- A. 两样本均数差别越大 B. 两总体均数差别越大
- C越有理由认为两总体均数不同
- D.越有理由认为两样本均教不同
- E.I 型错误越太
- 3.问答题(每题 4 分, 共 4 分):
 - (1)以完全随机设计的方差分析为例,简述方差分析的基本思想。
- 4. 计算分析题(每题8分,共8分)
 - (11 调查得 16 名 18—22 岁男大学生身高 x(M). 肺活量 Y(L)的数据。

计算出: Σ x_27.266, Σ x 的平方=16.471, Σ Y=66.293, Σ xY=113.042。①求直线回归方程(5 分): ②对 b 作假设检验(3 分)。(r=O.8 7,t0.05/2(14)=2.145)

参考公式: b=LXY 除以 LXX,a=Y-bX、3

第(2)页共(5)页

苏 州 大 学

EpiMan|公卫论坛,中国最大的公共卫生专业学术论坛。 【考研考博】版独家整理奉献。

' 二00五年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学科、专业; ………研之方向: ……"

- 二.营养与食品卫生部分(30)分
- 1.名词解释(共8分,每题2分)
- (1)视黄醇当量
- (2)基础代谢
- (3)菌落总数
- (4)杂醇油
- 2.填空(共 12 分,每题 2 分)

(3)盐酸缺乏症又称

(1)发生化学性食物中毒时,应及时采用特效解毒剂.呻中毒用,有机磷中毒用

亚硝酸盐中毒用

(2)婴儿开始添加辅食的时间以 月龄为宜.

,是人体缺乏 和

引起的.

- 4)调节血钙的激素有一 一 和 一.
- 5】维生素 D 在体内的活性形式是
- 6)我国允许使用的合成抗氧化剂有一
 - 3问答题(共10分,每题5分】
 - (1)什么是植物化学物?主要有哪几类?
 - (2)试述细菌性食物中毒的预防原则和处理原则.
- 三. 劳动卫生学部分《共30分)
 - 1. 名词解释(每题 2 分, 共 IO 分)
 - (1)矽肺 (2)胸膜斑 (3)PTs
 - (4)铅性腹绞痛 (5)汞性震颤
 - 2. 简答题(每题 4 分, 共 1 2 分)
 - (I)苯毒作用的机理和临床表现是什么?
 - (2)影响毒物对机体毒作用的因素是什么?
 - (3)矽肺与硅酸盐肺的区别是什么?
 - 3. 论述题{8分)
 - (1)职业性致癌物分哪几类?我国职业病诊断标堆中职业性肿瘤主要

第(3)页共(5)页

二00五年攻读硕士学位研究生入学考试试题 预防综合

学科,专业: ·········研究方向: ·······考试科目......(A)卷 是哪些?如何识别与判定职业性致魑因素?

- 四. 环境卫生学部分(共30分)
 - 1. 名词解释(2 分×5=10 分)
 - (1)功能蓄积 (2)环境激素效应 (3)cOD
 - (4)克山病 (5)等标污染负荷
 - 2. 简答题(5 分×4=20 分)
 - (1)请举例说明生物标志物的种类..
 - (2)大气污染对健康的间接危害有哪些?
 - (3)介水传染病的流行特点有哪些?
 - (4)大骨节病的病因有哪几方面?
- 五、流行病学部分(共30分)
 - 1名词解释(每题2分. 共8分)
 - (1)巢式病例对照研究 (2)berkson 偏倚
 - (3)向均数回归 (4)潜在减寿年数
 - 2. 选择题(只可选一个最好答案,每题 1 分),共 IO 分)
 - (1)在健康研究中,下列选项都可以作为暴露,除了().
 - a. 一个潜在的危险因素 b 正在研究的结局
 - c. 处理或疗法 d. 在疾病发生前的任何可能事件
 - (2)下列选项都可以作为"疾病"或"健康结局" ,除了()。

 - a. 病或伤残 b. 增强的健康 c. 死亡
- - (3)作为消初偏倚的方法,你可以用下面方法保证病例和对照的可比 性,除了()。
 - a. 如何选择他们 b. 如何调查他们
- - c。一他们如何暴露 d. 他们怎样受其他危险因素的影响
 - (4)预防呼吸道传染病的综合措施中,一般以下列哪项为主?()
 - a. 隔离病人 b. 切断传播途径
 - c 治疗病人 d. 预防接种
 - (5)为研究肺癌的病例,将肺癌与非肺癌按年龄。性别、居住地等配 比,然后对两组观察对象吸烟情况进行对比,这是一种什么性质的 研究?()
 - a 描述性研究 b 病例对照研究
 - c. 队列研究 d 实验研究
 - (6)疫苗可产生哪一类免疫?()

第(4)页共(5)页

二00五年攻读硕士学位研究生入学考试试题 学科.专业: ………… • 研究方向: ………---考试科目

- a 自然自动免疫 b. 自然被动免疫
- C. 人工自动免疫. d. 人工被动免疫
- (7)下列哪项不能作为传染源?()
 - a.潜伏期病人 b. 恢复期病人
- ···c·临床症状期的病人d. 被腐蚀的木头
- (8)对病例对照研究资料进行分层分析的目的是()。
 - a 控制选择偏倚
- b 控制混杂偏倚
- ···C.控制信息偏倚 d. 提高资料利用率
- (9)比数比主要应用于()。
 - a.生态学研究 b.病例对照研究
- - C.队列研究
- d.流行病学实验研究
- (10)流行病学实验研究中以下哪条不是其缺点?()
 - a.设计和实比较复杂 b. 病例对照研究
- , C.采用随机分组很难控制混杂因素 D.研究人群的依从性较差
- 3 简答题(每题 3 分。共12 分)
- (1)作为一个研究者,你想研究过去使用口服避孕药妇女的心肌梗塞 危险性.用大纲形式 设计一个病例对照研究; 陈述问题和假设;描述 病例和对照并且如何在研究中接收两组妇女; 用可测量的术语定义露 露;说明资料收集方法。
- (2)一项研究报道了某地 300 名白人儿统死于意外中毒事故,死亡儿 童中,社会经济条件差的儿童数五倍于社会经济条件好的家庭.据此推 断,某地社会经济条件差的家庭中,儿童发生意外中毒的频率五倍于社 会经济条件好的家庭。此项推论正确吗?为什么?
- (3) 病例对照研究显示,在心脏病发作前的一年内,心脏病的幸存者 所报告的精神紧张程度比对照者所报告的要高,能否从这一研究得 出精神紧张引起心脏病发作的结论?
- (4) 在 1966 年至 1969 年间波士顿 Vincent memorial 医院报道治疗八 例阴道腺之前,年轻妇女阴道腺奶罕见记载. 这种疾病不寻常地出现 在 1946 年至 1951 年出生于新格兰医院的八个\病人身上,导致了一项 调查、特别注意在怀孕期中母亲摄入雌激素与病人阴道的关系、哪一 类研究适合于此项问题?为什么?

第(5)页共(5)页