



SILTEC 2026 · SOMMA+ AGRONEGÓCIOS

BENCHMARKING DE SILAGEM

O que separa as silagens de maior Milk 2024

182 amostras. Um retrato regional da silagem.

O banco reúne um recorte consistente para comparar qualidade bromatológica e desempenho relativo.



182

amostras de silagem



4

faixas de desempenho



2

safras: 2025–2026 e
safrinha 2026



3R

Ribersolo como
laboratório de referência



Universo analisado

Amostras de trincheiras validadas em relação aos parâmetros usados na formulação das dietas das fazendas.

Antes de comparar, o critério importa.

01

Laboratório

Apenas análises de 3R
Ribersolo.

02

Amostragem

Somente amostras de
trincheiras.

03

Exclusões

Sem glebas separadas,
testes ou ensaios.

04

Validação

Conferência com a
formulação das dietas das
fazendas.



Como ler este material

O benchmark é **descritivo**: ele mostra padrões do banco, mas não prova relações de causa e efeito.

Leitura integrada com híbrido, ambiente, colheita, processamento e conservação.

Período: safra 2025–2026 e safrinha 2026.

O benchmark traduz qualidade em faixas.

Mais amido e digestibilidade, com menos fibra, acompanham o avanço do desempenho relativo.

Parâmetro	10% superiores	25% superiores	50% intermediários	25% inferiores
Matéria seca (%)	38,85	37,36	36,27	34,94
FDN (%)	35,95	38,53	40,60	45,30
Amido (%)	36,56	33,75	31,09	26,15
Digestibilidade FDN 48 h (%)	62,81	62,21	60,73	57,53
Digestibilidade amido 7 h (%)	85,88	85,16	82,80	76,09
Kd do amido (%)	28,17	27,36	25,31	20,87
Milk 2024	1.565	1.531	1.479	1.376


+3,91 p.p. em matéria seca

-9,35 p.p. em FDN

+10,41 p.p. em amido



BENCHMARK REGIONAL · 04




O que separa os extremos?

Cinco sinais aparecem quando comparamos os quartis de Milk 2024.

O amido lidera as associações positivas.

Coeficientes de Spearman: principais fatores associados positivamente ao Milk 2024.



Maior associação positiva

0,75


Amido

Disponibilidade de amido aparece como sinal central no banco.

ρ = correlação de Spearman. Associação não demonstra causalidade.

A fibra estrutural puxa o Milk 2024 para baixo.

Coeficientes de Spearman: principais fatores associados negativamente ao Milk 2024.



ρ = correlação de Spearman. Associação não demonstra causalidade.



Principal ponto de atenção

-0,86

FBN

A fibra em detergente neutro é o sinal negativo mais intenso no recorte.

Q4 e Q1 têm assinaturas nutricionais distintas.

Q1

Milk 2024 ≤ 1.434,25 · n=46

Q4

Milk 2024 ≥ 1.517,13 · n=46

PARÂMETRO	Q1 INFERIOR	Q4 SUPERIOR	DIFERENÇA Q4-Q1
FDN	45,30	37,52	-7,77 p.p.
Lignina	5,28	4,36	-0,92 p.p.
Amido	26,15	34,87	+8,72 p.p.
Digestibilidade do amido – 7 h	76,09	85,32	+9,23 p.p.
Digestibilidade da FDN – 48 h	57,53	62,41	+4,89 p.p.

O Q4 combina menos FDN e lignina com mais amido e digestibilidade.

Diferenças descritivas entre quartis de Milk 2024; os valores seguem a unidade reportada pelo laboratório.

Cinco focos aparecem de forma consistente.

O banco aponta uma agenda prática de qualidade, sem reduzir a decisão a um único número.



O perfil superior combina os cinco focos — a leitura é integrada, não isolada.

A diferença começa antes do laboratório.

Para aproximar uma silagem do perfil Q4, o banco recomenda uma leitura integrada da cadeia de decisão.



Perfil de silagem e Milk 2024

O laudo sintetiza escolhas agronômicas e de conservação — por isso, os indicadores precisam ser interpretados em conjunto.

Como usar o benchmark no campo.

O valor do benchmark está em transformar o resultado do laboratório em uma conversa de decisão.



PERGUNTA PARA DISCUSSÃO

Qual indicador está mais distante do perfil Q4 na sua fazenda hoje?

Três mensagens para levar para a fazenda.

01



Perfil nutricional
faz diferença.

Mais amido, digestibilidade e
matéria seca, com menos FDN,
acompanham maior Milk 2024.

02



Qualidade é
combinação.

Os extremos diferem em um
conjunto de parâmetros — não em
um indicador isolado.

03



Benchmark orienta,
não substitui contexto.

É um ponto de partida para decisão
e melhoria contínua, não uma meta
universal.

MEDIR · COMPARAR · AJUSTAR · MEDIR NOVAMENTE

Notas metodológicas e próximos passos.

Item	Informação
Banco	182 amostras de silagem
Laboratório	3R Ribersolo
Tipo	Amostras de trincheiras
Período	Safra 2025–2026 e safrinha 2026
Estatística	Associações descritivas; coeficiente de Spearman no rascunho

Limitação: as associações não permitem concluir causalidade. As decisões devem ser avaliadas no contexto de cada sistema produtivo.



Próxima edição:
um banco ainda mais
inteligente.

Acompanhar evolução por fazenda, híbrido, ambiente, ponto de colheita e perfil de conservação.

Mais histórico · mais contexto · melhor decisão



ENCERRAMENTO · SILTEC 2026

ESCOLHAS DE HOJE, RESULTADOS DE AMANHÃ.

Perguntas e discussão

Vamos discutir o seu cenário.