Matemática Discreta I

Prefinal - 17 de junio de 2021

Turno Tarde

Importante

- Justifica todas tus respuestas.
- Para aprobar se debe obtener al menos 50 puntos.
- En cada hoja que entregues escribí, en forma clara y completa, tu nombre y apellido. Si es posible escribí con birome.
- Al finalizar, toma fotos del prefinal por el celular, y subí las fotos en formato pdf en el apartado "Tu Trabajo Añadir o crear".
- Una vez subido el archivo, presionar "Entregar". Deben verificar que el documento esté en el sentido correcto y que su calidad permita que sea leído y corregido.

Preguntas

- Las preguntas sobre el enunciado podés hacerlas en "Comentarios privados".
- Preguntas relacionadas con el desarrollo del ejercicio podés hacerlas en "Comentarios privados".

Ejercicios

(1) (12 pts.) Sea $\{a_n\}_{n>0}$ la sucesión definida recursivamente por

$$a_0 = 1,$$
 $a_1 = 6,$ $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2},$ para $n \ge 2.$

Probar que $a_n = (n+1) \, 3^n$ para todo $n \ge 0$.

Hacer el procedimiento paso a paso y en forma detallada.


- (2) (8 pts.) Calcular $(2632)_7 (1334)_5$ y expresar el resultado en base 6.
- (3) (a) (12 pts.) Usando el método de la demostración de la ecuación lineal en congruencia, encontrar todas las soluciones enteras de

$$51x \equiv 24 \ (60)$$
.

- (b) (8 pts.) Hallar las soluciones enteras x tales que $0 \le x \le 100$.
- (4) En una empresa se requiere formar un grupo de trabajo de 7 personas seleccionadas entre 6 abogados y 9 contadores. ¿De cuántas maneras puede formarse si:
 - (a) (3 pts.) no hay restricciones en la selección?
 - (b) (4 pts.) el grupo debe tener exactamente 3 contadores?

- (c) (4 pts.) el grupo debe tener un número impar de abogados?
- (d) (4 pts.) el grupo debe tener a lo sumo 3 abogados?

(5) Dados los grafos



- (a) (8 pts.) Escribir la lista de adyacencia del primer grafo.
- (b) (9 pts.) Encontrar una caminata euleriana en el primer grafo.
- (c) (6 pts.) Demostrar que los grafos son isomorfos.
- (6) Probar las siguientes afirmaciones;
 - (a) (10 pts.) Calcular el resto de la división de 2^{2475} por 13. No usar calculadora, deducir el resultado del teorema de Fermat.
 - (b) (12 pts.) No existen enteros no nulos a, b tales que $6a^3=b^3$.