

Learning Theory: generalization bound

Apple Zhang

2023 年 6 月 13 日

1 集中不等式 (Concentration inequality)

定理 1 (Chernoff bounding). 对于任意随机变量 X 以及 $\epsilon > 0$ 、 $t > 0$, 由 Markov 不等式可得

$$\Pr(X \geq \epsilon) = \Pr(e^{tX} \geq e^{t\epsilon}) \leq e^{-t\epsilon} \mathbb{E}[e^{tX}] \quad (1)$$

定理 2 (Hoeffding inequality). 设 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 为一组独立随机变量且 $a_i \leq X_i \leq b_i$, 且

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \mu = \mathbb{E}(\bar{X}). \quad (2)$$

则对于任意 $\epsilon > 0$, 有以下不等式成立

$$\Pr(\bar{X} - \mu \geq \epsilon) \leq \exp\left(-\frac{2n^2\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right), \quad (3)$$

$$\Pr(\bar{X} - \mu \leq -\epsilon) \leq \exp\left(-\frac{2n^2\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right). \quad (4)$$

或等价的, 若令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 则

$$\Pr(S_n - \mathbb{E}[S_n] \geq \epsilon) \leq \exp\left(-\frac{2\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right), \quad (5)$$

$$\Pr(S_n - \mathbb{E}[S_n] \leq -\epsilon) \leq \exp\left(-\frac{2\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right). \quad (6)$$

定义 1 (鞅). 随机过程序列 Z_1, Z_2, \dots 对一切 n 有 $\mathbb{E}[Z] < \infty$, 且

$$\mathbb{E}[Z_{i+1} | Z_1, \dots, Z_i] = Z_i, \quad (7)$$

则称 Z_1, Z_2, \dots 为鞅 (Martingale). 定义 $Y_i = Z_i - Z_{i-1}$, 则

$$\mathbb{E}[Y_{i+1} | Z_1, \dots, Z_i] = 0, \quad (8)$$

则序列 Y_1, Y_2, \dots 称为鞅差 (Martingale difference).

基于鞅的定义, 可以得到 Azuma inequality:

定理 3 (Azuma inequality). 假设 X_1, X_2, \dots 是鞅, 令其鞅差为 $Y_i = X_i - X_{i-1}$, 若对任意 i 都存在 $c_i > 0$ 使得 $|Y_i| \leq c_i$ 成立, 则

$$\Pr[X_n - X_0 \geq \epsilon] \leq \exp\left(\frac{-2\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n c_i^2}\right), \quad (9)$$

$$\Pr[X_n - X_0 \leq -\epsilon] \leq \exp\left(\frac{-2\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n c_i^2}\right). \quad (10)$$

在 Azuma inequality 的基础上可以进一步得到:

定理 4 (McDiarmid inequality). 设一组独立随机变量 $\{X_i\}_{i=1}^n \in \mathcal{X}^n$, 且存在 $c_1, \dots, c_n > 0$ 使得对于函数 $f: \mathcal{X} \mapsto \mathbb{R}$,

$$|f(x_1, \dots, x_t, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x'_t, \dots, x_n)| \leq c_t. \quad (11)$$

对任意 $t \in [n]$ 和任意 $x_1, \dots, x_n, x'_t \in \mathcal{X}$ 成立. 设 $f(S) = f(X_1, \dots, X_n)$, 则对于任意 $\epsilon > 0$ 有

$$\Pr[f(S) - \mathbb{E}[f(S)] \geq \epsilon] \leq \exp\left(\frac{-2\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n c_i^2}\right), \quad (12)$$

$$\Pr[f(S) - \mathbb{E}[f(S)] \leq -\epsilon] \leq \exp\left(\frac{-2\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n c_i^2}\right). \quad (13)$$

可以看到 Hoeffding inequality 就是当 $f(S) = \sum_{i=1}^n X_i$ 时的一个特殊形式.

2 Rademacher 复杂度

定义 2 (Rademacher 复杂度). 设从分布 \mathcal{D} 中抽样出的样本集合 $S = \{z_i\}_{i=1}^n$, 且 \mathcal{G} 表示将样本空间映射到区间 $[a, b]$ 的函数族, 则经验 Rademacher 复杂度定义为

$$\hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) = \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i g(z_i) \right]. \quad (14)$$

Rademacher 复杂度定义为经验 Rademacher 复杂度的期望, 即

$$\mathfrak{R}_n(\mathcal{G}) = \mathbb{E}_{S \sim \mathcal{D}^n} [\hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G})] = \mathbb{E}_{S, \sigma} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i g(z_i) \right] \quad (15)$$

Rademacher 复杂度具有以下运算

$$\mathfrak{R}_n(a\mathcal{G} + b) = |a|\mathfrak{R}_n(\mathcal{G}), \quad \mathfrak{R}_n(\mathbf{conv}(\mathcal{G})) = \mathfrak{R}_n(\mathcal{G}). \quad (16)$$

其中 $\mathbf{conv}(\cdot)$ 为取凸包运算. 事实上, 对于 $\mathbf{conv}(\mathcal{G}) = \{\sum_{j=1}^k \theta_j g_j : g_j \in \mathcal{G}, \theta_j \geq 0, \sum_{j=1}^k \theta_j = 1, k \in \mathbb{N}_+\}$.

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_n(\mathbf{conv}(\mathcal{G})) &= \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{g_j \in \mathcal{G}, \mathbf{1}^T \boldsymbol{\theta} = 1, \theta_i \geq 0, k \in \mathbb{N}_+} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i \sum_{j=1}^k \theta_j g_j(x_i) \right] \\ &= \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{g_j \in \mathcal{G}} \sup_{\mathbf{1}^T \boldsymbol{\theta} = 1, \theta_i \geq 0, k \in \mathbb{N}_+} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \theta_j \left(\sum_{i=1}^n \sigma_i g_j(x_i) \right) \right] \\ &= \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{g_j \in \mathcal{G}} \max_j \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i g_j(x_i) \right] \\ &= \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i g(x_i) \right] = \mathfrak{R}_n(\mathcal{G}). \end{aligned}$$

接下来的不等式则是基于 Rademacher 复杂度的泛化界

定理 5. 假设样本 Z_1, \dots, Z_n 为独立且采样自分布 \mathcal{D} 的随机变量, 对于函数族 \mathcal{G} , 其中任意 $f \in \mathcal{G}$ 的值域为 $[a, b]$, 则存在 $\delta > 0$, 使得至少有 $1 - \delta$ 的概率使得对于样本集 S , 有

$$\mathbb{E}_Z[g(Z)] \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(Z_i) + 2\mathfrak{R}_n(\mathcal{G}) + (b-a)\sqrt{\frac{\log(1/\delta)}{2n}}, \quad \forall g \in \mathcal{G}. \quad (17)$$

$$\mathbb{E}_Z[g(Z)] \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(Z_i) + 2\hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) + 3(b-a)\sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2n}}, \quad \forall g \in \mathcal{G}. \quad (18)$$

证明. 可以采用 McDiarmid inequality 进行证明. 令

$$T(g) = \mathbb{E}_Z(g(Z)), \quad \hat{T}_S(g) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(Z_i). \quad (19)$$

定义样本集上的函数

$$\phi(S) = \sup_{g \in \mathcal{G}} (T(g) - \hat{T}_S(g)) \quad (20)$$

同时考虑以下样本集

$$S = \{Z_1, \dots, Z_t, \dots, Z_n\}, \quad S' = \{Z_1, \dots, Z'_t, \dots, Z_n\}. \quad (21)$$

则有

$$\begin{aligned} \phi(S) - \phi(S') &= \sup_{g \in \mathcal{G}} (T(g) - \hat{T}_S(g)) - \sup_{g \in \mathcal{G}} (T(g) - \hat{T}_{S'}(g)) \\ &\leq \sup_{g \in \mathcal{G}} (T(g) - \hat{T}_S(g) - T(g) + \hat{T}_{S'}(g)) \quad \text{use } \sup(U + V) \leq \sup(U) + \sup(V). \\ &= \sup_{g \in \mathcal{G}} (\hat{T}_{S'}(g) - \hat{T}_S(g)) \\ &= \frac{1}{n} \sup_{g \in \mathcal{G}} (g(Z'_t) - g(Z_t)) \\ &\leq \frac{b-a}{n} \end{aligned} \quad (22)$$

因此, 根据 McDiarmid inequality, 可以得到

$$\Pr[\phi(S) - \mathbb{E}_S[\phi(S)] \geq \epsilon] \leq \exp\left(\frac{-2n\epsilon^2}{(b-a)^2}\right) \quad (23)$$

或者, 至少有 $1 - \delta$ 的概率,

$$\phi(S) \leq \mathbb{E}_S[\phi(S)] + (b-a)\sqrt{\frac{\log(1/\delta)}{2n}}. \quad (24)$$

接下来计算 $\mathbb{E}_S[\phi(S)]$ 的上界, 我们有

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_S[\phi(S)] &= \mathbb{E}_S[\sup_{g \in \mathcal{G}} T(g) - \hat{T}_S(g)] \\
&= \mathbb{E}_S \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[g(Z)] - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(Z_i) \right] \\
&= \mathbb{E}_S \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}_{\tilde{S}} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\tilde{Z}_i) \right] - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(Z_i) \right] \\
&= \mathbb{E}_S \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \mathbb{E}_{\tilde{S}} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\tilde{Z}_i) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(Z_i) \right] \right] \\
&\leq \mathbb{E}_{S, \tilde{S}} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (g(\tilde{Z}_i) - g(Z_i)) \right], && \text{use } \sup \mathbb{E}[x] \leq \mathbb{E}[\sup x]. \\
&= \mathbb{E}_{S, \tilde{S}, \sigma} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i (g(\tilde{Z}_i) - g(Z_i)) \right] && \Pr[\sigma_i = 1] = \Pr[\sigma_i = -1] = \frac{1}{2} \\
&\leq \mathbb{E}_{\tilde{S}, \sigma} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i g(\tilde{Z}_i) \right] + \mathbb{E}_{S, \sigma} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n -\sigma_i g(Z_i) \right] \\
&= 2\mathbb{E}_{S, \sigma} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i g(\tilde{Z}_i) \right] = 2\mathfrak{R}_n(\mathcal{G}). \tag{25}
\end{aligned}$$

由此以及 (24) 可以推出 (17).

同理, 令 $\psi(S) = \hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G})$ 容易知道

$$\psi(S) - \psi(S') = \hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) - \hat{\mathfrak{R}}_{S'}(\mathcal{G}) \leq \frac{b-a}{n}. \tag{26}$$

再次根据 McDiarmid inequality, 得到

$$\Pr \left[\mathfrak{R}_n(\mathcal{G}) \geq \hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) + (b-a) \sqrt{\frac{\log(1/\delta)}{2n}} \right] \leq \delta. \tag{27}$$

由于 δ 的任意性, 所以

$$\Pr \left[\mathfrak{R}_n(\mathcal{G}) \geq \hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) + (b-a) \sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2n}} \right] \leq \frac{\delta}{2}. \tag{28}$$

由于不等式两端同乘以 2 不改变概率, 因此

$$\Pr \left[2\mathfrak{R}_n(\mathcal{G}) \geq 2\hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) + 2(b-a) \sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2n}} \right] \leq \frac{\delta}{2}. \tag{29}$$

同时根据 (17) 推出

$$\Pr \left[\mathbb{E}_Z[g(Z)] \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(Z_i) + 2\mathfrak{R}_n(\mathcal{G}) + (b-a) \sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2n}} \right] \leq \frac{\delta}{2}. \tag{30}$$

依据 union bound, 则有

$$\Pr \left[\mathbb{E}_Z[g(Z)] \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(Z_i) + 2\hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) + 3(b-a) \sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2n}} \right] \leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta. \tag{31}$$

至此 (18) 证毕. \square

在二分类情形下, 可以进一步得到假设集 \mathcal{H} 的泛化界. 首先介绍下面的引理

引理 1. 假设 \mathcal{H} 是取值为 $\{+1, -1\}$ 的函数族, \mathcal{G} 为关于 \mathcal{H} 的分类损失函数族, 即 $\mathcal{G} = \{(x, y) \mapsto 1_{h(x) \neq y} \mid h \in \mathcal{H}\}$. 记样本集合为 $S = ((x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n))$, 且 $S_{\mathcal{X}} = (x_1, \dots, x_n)$. 则有

$$\hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) = \frac{1}{2} \hat{\mathfrak{R}}_{S_{\mathcal{X}}}(\mathcal{H}). \quad (32)$$

证明. 根据定义代入:

$$\begin{aligned} \hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) &= \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i g(x_i, y_i) \right] \\ &= \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i 1_{h(x_i) \neq y_i} \right] \\ &= \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i \frac{1 - y_i h(x_i)}{2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i y_i h(x_i) \right], \quad \text{use } \mathbb{E}_{\sigma}[\sigma] = 0 \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i h(x_i) \right] = \frac{1}{2} \hat{\mathfrak{R}}_{S_{\mathcal{X}}}(\mathcal{H}). \end{aligned}$$

证毕. \square

因此对于二分类问题, 可以直接得出其基于 Rademacher 复杂度的泛化界:

推论 1. 假设 \mathcal{H} 是取值为 $\{+1, -1\}$ 的假设集, 样本集合 $S \subset \mathcal{X} \times \{-1, 1\}^n$ 对应的数据分布为 \mathcal{D} . 则至少有 $1 - \delta$ 的概率, 对任意 $h \in \mathcal{H}$ 有

$$R(h) \leq \hat{R}_S(h) + \hat{\mathfrak{R}}_n(\mathcal{H}) + \sqrt{\frac{\log(1/\delta)}{2n}}, \quad \forall g \in \mathcal{G}. \quad (33)$$

$$R(h) \leq \hat{R}_S(h) + \hat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{H}) + 3\sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2n}}, \quad \forall g \in \mathcal{G}. \quad (34)$$

其中, $R(h)$ 和 $\hat{R}_S(h)$ 分别为泛化误差和经验误差

$$R(h) = \Pr_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[h(x) \neq y] = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[1_{h(x) \neq y}], \quad \hat{R}_S(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{h(x_i) \neq y_i}. \quad (35)$$

2.1 Rademacher 复杂度的常用结论

引理 2 (Massart Lemma). 假设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有限集, 记 $r = \sup_{\mathbf{x} \in \mathcal{A}} \|\mathbf{x}\|_2$, 则

$$\mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{\mathbf{x} \in \mathcal{A}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i x_i \right] \leq \frac{r \sqrt{2 \log |\mathcal{A}|}}{n}. \quad (36)$$

引理 3 (Talagrand Lemma). 设 $\phi: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ 是一个 L -Lipschitz 函数, 则

$$\mathfrak{R}_S(\phi \circ \mathcal{H}) \leq L \mathfrak{R}_S(\mathcal{H}). \quad (37)$$

其中 $\phi \circ \mathcal{H} = \{z \mapsto \phi(h(z)) : h \in \mathcal{H}\}$ 表示函数集的复合.

未完待续...

2.2 基于 Covering Number 的复杂度上界

2.2.1 Covering 与 Packing

定义 3 (ϵ -covering). 在度量空间的子集 \mathcal{V} 上定义度量 ρ , 其 ϵ -covering 表示有限集 $\{v_1, \dots, v_N\}$, 使得任意 v_i, v_j ($i \neq j$), 有 $\rho(v_i, v_j) > \epsilon$. 同时, ϵ -packing number 定义为最大的 ϵ -packing 的集合大小, 记为

$$N(\epsilon, \mathcal{V}, \rho) = \min\{|\Theta| : \Theta \subset \mathcal{V}, \forall v \in \mathcal{V}, \exists v_i \in \Theta, \rho(v, v_i) \leq \epsilon\}. \quad (38)$$

定义 4 (ϵ -packing). 在度量空间的子集 \mathcal{V} 上定义度量 ρ , 其 ϵ -packing 表示有限集 $\{v_1, \dots, v_N\}$, 使得对于任意 $v \in \mathcal{V}$, 总存在 $i \in [N]$ 使得 $\rho(v_i, v) \leq \epsilon$. 同时, ϵ -covering number 定义为最小的 ϵ -covering 的集合大小, 记为

$$M(\epsilon, \mathcal{V}, \rho) = \max\{|\Theta| : \Theta \subset \mathcal{V}, \forall v_i, v_j \in \Theta, v_i \neq v_j, \rho(v_i, v_j) > \epsilon\}. \quad (39)$$

引理 4. 对任意 $\epsilon > 0$, 有以下不等式成立

$$M(2\epsilon, \mathcal{V}, \rho) \leq N(\epsilon, \mathcal{V}, \rho) \leq M(\epsilon, \mathcal{V}, \rho). \quad (40)$$

这个引理的证明很有趣, 可以作为小小的思维锻炼.

证明. 设 Θ^* 是最大的 ϵ -packing, 则对任意 $v \in \mathcal{V} \setminus \Theta^*$, 总存在 $\theta \in \Theta^*$, 使得 $\rho(v, \theta) \leq \epsilon$, 否则, 就说明任意 $\theta \in \Theta^*$ 都有 $\rho(v, \theta_i) > \epsilon$, 所以 $\Theta^* \cup \{v\}$ 将形成一个更大的 ϵ -packing, 与 Θ^* 是最大的 ϵ -packing 矛盾. 这说明 Θ^* 是一个 ϵ -covering. 则根据定义 $M(\epsilon, \mathcal{V}, \rho) = |\Theta^*| \geq N(\epsilon, \mathcal{V}, \rho)$.

另一方面, 任取 $\Theta = \{\theta_1, \dots, \theta_m\}$ 为 2ϵ -packing, 以及 $\Psi = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ 为 ϵ -covering, 如果 $m > n$, 则根据鸽巢原理, 必将存在 $\theta_i, \theta_j \in \Theta$ 以及一个 $\psi_k \in \Psi$, 使得 $\rho(\theta_i, \psi_k) \leq \epsilon$ 且 $\rho(\theta_j, \psi_k) \leq \epsilon$. 根据三角不等式, 有 $\rho(\theta_i, \theta_j) \leq \rho(\theta_i, \psi_k) + \rho(\theta_j, \psi_k) \leq 2\epsilon$, 而这与 $\rho(\theta_i, \theta_j) > 2\epsilon$ 矛盾. 因此, $m \leq n$, 于是说明 $M(2\epsilon, \mathcal{V}, \rho) \leq N(\epsilon, \mathcal{V}, \rho)$. \square

于是我们就有以下定理来得到 covering number 的上界.

定理 6. 对于任意 ϵ , 有以下不等式成立

$$N(\epsilon, \mathcal{V}, \rho) \leq M(\epsilon, \mathcal{V}, \rho) \leq \frac{\text{vol}(\mathcal{V} + B(\epsilon/2))}{\text{vol}(B(\epsilon/2))}. \quad (41)$$

其中的 “+” 表示 Minkovski 加法, $B(\epsilon)$ 表示圆心在原点, 半径为 ϵ 的圆.

证明. 设 $\Theta = \{\theta_1, \dots, \theta_m\}$ 是一个 ϵ -packing, 则 $B(\theta_i, \epsilon/2)$ 都是彼此不相交的. 并且

$$\bigcup_{i=1}^m B(\theta_i, \epsilon/2) \subset \Theta + B(\epsilon/2) \quad (42)$$

则有

$$\text{vol}(\Theta + B(\epsilon/2)) \geq \text{vol}\left(\bigcup_{i=1}^m B(\theta_i, \epsilon/2)\right) = m \text{vol}(B(\epsilon/2)). \quad (43)$$

说明对任意的 ϵ -packing, 其集合大小满足

$$m \leq \frac{\text{vol}(\mathcal{V} + B(\epsilon/2))}{\text{vol}(B(\epsilon/2))} \quad (44)$$

即所证明的结论. \square

定理 7. 对于任意 ϵ , 设 $\phi: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ 是一个 L -Lipschitz 函数, 则

$$N(\epsilon, \phi \circ \mathcal{V}, \rho) \leq N(\epsilon/L, \mathcal{V}, \rho). \quad (45)$$

2.2.2 Dubley's Theorem

接下来, 我们将通过 covering number 的角度得到 Rademacher 复杂度的上界. 这个结论由 Dudley's Theorem 给出:

定理 8 (Dudley's Theorem). 若 \mathcal{F} 表示函数族 $f: \mathcal{X} \mapsto \mathbb{R}$, 则

$$\mathfrak{R}_S(\mathcal{F}) \leq 12 \int_0^\infty \sqrt{\frac{\log N(\epsilon, \mathcal{F}, L_2(P_n))}{n}} \quad (46)$$

若 \mathcal{F} 中每个函数值域都在 $[-1, 1]$, 则有

$$\mathfrak{R}_S(\mathcal{F}) \leq 12 \int_0^1 \sqrt{\frac{\log N(\epsilon, \mathcal{F}, L_2(P_n))}{n}} \quad (47)$$

事实上, 更一般的形式是

定理 9 (Localized Dudley's Theorem). 若 \mathcal{F} 表示函数族 $f: \mathcal{X} \mapsto \mathbb{R}$, 则

$$\mathfrak{R}_S(\mathcal{F}) \leq \inf_{\alpha \geq 0} \left(4\alpha + 12 \int_\alpha^\infty \sqrt{\frac{\log N(\epsilon, \mathcal{F}, L_2(P_n))}{n}} \right). \quad (48)$$

可以看出, 一般的 Dudley's Theorem 是当 $\alpha = 0$ 的一个特殊情况, 所以 Localized Dudley's Theorem 可以得到比 Dudley's Theorem 的更紧的上界.

参考资料

- [1] Mohri M, Rostamizadeh A, Talwalkar A. Foundations of machine learning[M]. MIT press, 2018.
- [2] Richard Xu, Machine Learning Notes, <https://github.com/roboticcam/machine-learning-notes/>.