

Sonia Maria Ribeiro Wolf

Paciente com artrose bilateral do joelho, com lesão graves do compartimento medial e evolução para geno varo devido a alteração degenerativas, evolui com diminuição dos movimentos de caminhada e dificuldade para estar em posição ortostática.

Pelo exame de RX panorâmico de membro inferior notamos o desvio angular em varo e a alteração decorrente da falta de cartilagem local. Confirmado com o exame de Ressonância Nuclear Magnética, as lesões de cartilagem são irreversíveis.

Noto que pelo exames anteriores, as condições da cartilagem foram notadamente observadas como lesões progressivas e de caracter com mal prognostico.

Hoje, realizamos o tratamento paliativo com artrocentese, medicações intraarticulares e reabilitação exaustiva para determinar uma analgesia em repouso. Aos mínimos esforços é facilmente observada a dor e a incapacidade de locomoção.

Para tratamento definitivo, a proposta da cirurgia de reconstrução da articulação com prótese total é a forma de analgesia completa, porem observamos que a degeneração é no compartimento medial e que a prótese total será uma cirugia grande com necessidade de ressecar totalmente a articulação do joelho e para isso, a cirurgia foi proposta como indicação relativa pela grande mutilação local e o nível de complicações relativas ao procedimento

Dr. Nemi Sabeh Juniqu

sem mais

unidade on assis

+ 55 18 3323 6054 rua smith vasconcelos, 304 + sp

