Transição craniocervical sem alterações

Acentuação da lordose cervical

Discreta retrolistese de C3 sobre C4.

Espondilolistese degenerativa grau I de C6 sobre C7

Osteofitose marginal em C3 a C7. As vertebras avaliadas apresenta altura habitual.

Achados compatíveis com hemangiomas nos corpos vertebrais T1 e T2. Alterações degenerativas nas articulações interapofisárias cervicais, com maior reação óssea hipertro

quantidade de líquido articular e edema nas facetas e nas partes moles periarticulares, achados que sugerem inflamatório (degenerativo).

interapofisárias direitas. Destaca-se o comprometimento da interapofisária direita C3-C4, que apresenta

Uncoartrose à direita no nível C3-C4 e bilateral nos níveis C4-C5 a C6-C7.

Espessamento dos ligamentos amarelos no nível C3-C4, que comprimem o saco dural posteriormente.

Protrusão discal póstero-mediana no nível C2-C3, que comprime o saco dural, sem repercussões mielo-radiculares

Complexo disco-osteofitário posterolateral direito no nível C3-C4, que comprime o saco dural e que associado às correspondente, com deslocamento da raiz emergente deste lado. degenerativas nas articulações uncovertebral e interapofisária adjacentes promovem estreitamento do forame inte

associado às alterações degenerativas nas uncovertebrais e interapofisárias promovem discreto estreitamento do Complexo disco-osteofitário posterior e difuso no nível C4-C5, que comprime o saco dural e toca a medula espir

sem repercussões mielo-radiculares. Protrusão discal posterior e paramediana direita no nível C6-C7, com fissura do ânulo fibroso, que comprime o degenerativas nas uncovertebrais e interapofisárias promovem discreto estreitamento dos forames intervertebrais Complexo disco-osteofitário posterior e difuso no nível C5-C6, que comprime o saco dural e que associado às

Medula espinhal de contornos regulares e sinal homogêneo. Canal vertebral com amplitude normal.

Estruturas musculares paravertebrais integras.

Espondilodiscoartropatia degenerativa multissegmentar, com destaque para sinovite na interapofisária direita no n o estreitamento dos forames intervertebrais nos níveis C3-C4 a C5-C6.

Revisado por CRM 112281/SP - DR. LUCAS AVILA LESSA GARCIA Junas Justin

Laudado por RIC CRM 112281/SP - DR. LUCAS AVILA LESSA GARCIA

CRM:CRM 900959 - ANVISA: 355030890-864-000273-1-6355030890-864-000273-1-6 EXAME REALIZADO EM: 03/03/2024 - LIBERADO EM: 06/03/2024 09:24

IMPRESSO EM: 06/03/2024 14:52

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DRA MARIA BEATRIZ NOBREGA HADLER CRM 43776S