

Logika Tételkidolgozás

Aradi Patrik

2018. május 28.

1. Az ítéletkalkulus szintaxisa és szemantikája. Ki-elégíthetőség, logikai következmény, alap összefüggések.

Az ítéletlogikában a változók a 0, 1 halmazból kapnak értéket.

A formulák változókból épülnek fel, melyeket összekötő jelek alkalmazásával kapunk. Pl.: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

Szintaxis A logikában meghatározza, hogy hogy néz ki egy formula.

Pl.: $(p \vee q)$

Szemantika Megmondja, hogy a leírt formulának mi a jelentése. Mi az adott formulának az értéke egy adott változó értékadás esetén

1.1. Szintaxis

Változók p, q, r -el jelöljük, melyek 0, 1 értéket vehetnek fel.

Logikai konstansjelek (0 aritású függvényjelek) az "igaz" \uparrow és a "hamis" \downarrow jelek

Konnektívák Velük tudjuk összekötni a formulákat, lehetséges értékeik: $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$

Formulák Definíciója

- Minden változó és minden logikai konstans formula
- Ha F formula, akkor $(\neg F)$ is formula
- Ha F és G formulák, akkor $(F \wedge G), (F \vee G), (F \rightarrow G), (F \leftrightarrow G)$ is formulák
- Más formula nincs

Műveleti sorrend A \wedge és \vee műveletek *asszociatívak*, pl.: $(F \vee G) \vee H$ helyett $F \vee G \vee H$ -t írhatunk. A \rightarrow művelet *jobb-asszociatív*, $F \rightarrow G \rightarrow H = F \rightarrow (G \rightarrow H)$ zárójellezést jelenti

1.2. Szemantika

Boole-függvény Hogy a konnektívák szemantikájáról tudjunk beszélni, mindehez rendelünk egy Boole-függvényt. A Bool-függvény bitvektort egy bitbe képző függvény: $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

Az $f|n$ jelyi, hogy f egy n -változós függvény. A \neg unáris Boole függvény. A bináris konnektívákhoz rendelt Boole-függvényekhez készíthető igazságtábla. Egy n változós Boole-függvény 2^n soros

Értékadás Egy \mathcal{A} függvény, mely minden változóhoz egy igazságértéket (bitet: 0 vagy 1) rendel. Egy formula kiértékeléshez szükség van egy értékadásra.

Az \mathcal{A} értékadás mellett az F formula értékét $\mathcal{A}(F)$ jelöli.

- Ha a formula a p változó, akkor értéke $\mathcal{A}(p)$
- $\mathcal{A}(\uparrow) = 1$
- $\mathcal{A}(\downarrow) = 0$
- $\mathcal{A}(\neg F) = \neg \mathcal{A}(F)$
- $\mathcal{A}(F \vee G) = \mathcal{A}(F) \vee \mathcal{A}(G)$
- $\mathcal{A}(F \wedge G) = \mathcal{A}(F) \wedge \mathcal{A}(G)$
- $\mathcal{A}(F \rightarrow G) = \mathcal{A}(F) \rightarrow \mathcal{A}(G)$
- $\mathcal{A}(F \leftrightarrow G) = \mathcal{A}(F) \leftrightarrow \mathcal{A}(G)$

Tehát rekurzívan kiértékeljük az "eggyel egyszerűbb" formulákat és a legkülső konnektívának megfelelően kombináljuk az értékeket.

Közvetlen részformula Egy formula közvetlen részformulái az "eggyel lentebb" szinten lévő részei".

- Változóknak és a logikai konstansoknak nincs közvetlen részformulája.
- A $(\neg F)$ alakú formulák közvetlen részformulája F
- Az $(F \vee G)$, $(F \wedge G)$, $(F \rightarrow G)$, $(F \leftrightarrow G)$ alakú formulák közvetlen részformulái F és G

A formulák kiértékelését úgy végeztük el, hogy rekurzívan kiértékeljük a közvetlen részformulákat, majd az eredményekből és a külső konnektivitásból számítjuk az egész formula értékét. Az ilyen rendszerű definíciókat és bizonyításokat a **formula felépítése szerinti teljes indukciónak** nevezzük.

Felépítés szerinti indukció Definíciókban csak meg kell mondjuk, hogy aktuálisan a formulához rendelt objektumot hogyan számítjuk ki a részformuláihoz rendelt objektumokból, ügyelve arra, hogy minden esetet pontosan egyszer vegyünk sorra.

Bizonyításokban minden esetre meg kell mutatnunk, hogy ha az állítás igaz a formula összes közvetlen részformulájára, akkor miért igaz az egész formulára is. (teljes indukció is így működik)

Kielégíthetőség Ha az \mathcal{A} értékadásra és az F formulára $\mathcal{A}(F) = 1$, azt úgy is írjuk, hogy $\mathcal{A} \models F$ és úgy is mondjuk, hogy \mathcal{A} kielégíti F -et, vagy \mathcal{A} egy modellje F -nek. Ha egy formulának van modellje, akkor azt mondjuk, kielégíthető, ha nincs, kielégíthetetlen. Ha az F formulának minden kiértékelés modellje, akkor tautológia, ennek jele pedig $\models F$.

Modellek halmaza Ha F egy formula, akkor $Mod(F)$ az F összes modelljének halmaza. Tehát azt hogy $\mathcal{A}(F) = 1$, vagy $\mathcal{A} \models F$, úgy is írhatjuk, hogy $\mathcal{A} \in Mod(F)$. F pontosan akkor kielégíthetetlen, ha $Mod(F) = \emptyset$. Ha Σ formula egy halmaza és \mathcal{A} egy értékadás, akkor $\mathcal{A} \models \Sigma$ azt jelenti, hogy \mathcal{A} kielégíti Σ összes elemét. F formula pontosan akkor tautológia, ha Σ kielégíthetetlen.

Logikai következmény Ha F és G formulák, akkor $F \models G$ (" F -nek következménye G ") azt jelöli, hogy minden \mathcal{A} -ra ha $\mathcal{A}(F) = 1$, akkor $\mathcal{A}(G) = 1$. Tehát, ha F igaz akkor G is igaz, és $Mod(F) \subseteq Mod(G)$. Ugyanígy használhatjuk a $\Sigma \models F, \Sigma \models \Gamma$ jelöléseket is, ahol Σ, Γ formulahalmazok. Pl.: $\Sigma \models F$ akkor áll fenn, ha Σ minden modellje, modellje F -nek is. $F \equiv G$ jelölés azt jelenti, hogy $Mod(F) = Mod(G)$.

Tétel $Mod(\Sigma \cup \Gamma) = Mod(\Sigma) \cap Mod(\Gamma)$ Hiszen a bal oldalon szereplő halmazban azok az értékadások vannak, melyek kielégítik $\Sigma \cup \Gamma$ összes elemét, azaz Σ összes elemét is és Γ összes elemét is, azaz melyek benne vannak $Mod(\Sigma)$ -ban is és $Mod(\Gamma)$ -ban is, ez pedig épp a jobb oldal.

2. Boole-függvények. Shannon-expanzió. Boole-függvények teljes rendszerei

Boole-függvény A Bool-függvény bitvektort egy bitbe képző függvény: $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.