

Функции нескольких переменных

Экстремум функции двух переменных

Если в области D задана непрерывная функция двух переменных

$Z = f(x, y)$ и в точке $M_0(x_0, y_0) \in D$ функция имеет локальный экстремум (максимум или минимум), то в этой точке либо обе ее частные производные равны нулю $f'_x(x_0, y_0) = 0$; $f'_y(x_0, y_0) = 0$ ($M_0(x_0, y_0)$ – стационарная точка), либо одна из них не существует ($M_0(x_0, y_0)$ – критическая точка).

Необходимые условия существования экстремума

Пример.1 Найти координаты стационарных точек заданной функции

$$z = x^2 + 5y^2 - 4xy - 2y + 1$$

Вычислим частные производные заданной функции:

$$z'_x = 2x - 4y, \quad z'_y = -4x + 10y - 2.$$

В точке локального экстремума либо обе ее частные производные равны нулю $f'_x(x_0, y_0) = 0$; $f'_y(x_0, y_0) = 0$ ($M_0(x_0, y_0)$ – стационарная точка), либо одна из них не существует ($M_0(x_0, y_0)$ – критическая точка).

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \begin{cases} 2x - 4y = 0 \\ -4x + 10y - 2 = 0 \end{cases} \begin{cases} x = 2y \\ -8y + 10y - 2 = 0 \end{cases} \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Определили координаты одной стационарной точки $M_0(2, 1)$.

Пример.2 Найти координаты стационарных точек заданной функции

$$z = -2x^2 + 16x - 3y^2 + 12y + 7$$

Вычислим частные производные заданной функции:

$$z'_x = -4x + 16, \quad z'_y = -6y + 12.$$

В точке локального экстремума либо обе ее частные производные равны нулю $f'_x(x_0, y_0) = 0$; $f'_y(x_0, y_0) = 0$ ($M_0(x_0, y_0)$ – стационарная точка), либо одна из них не существует ($M_0(x_0, y_0)$ – критическая точка).

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \begin{cases} -4x + 16 = 0 \\ -6y + 12 = 0 \end{cases} \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

Определили координаты одной стационарной точки $M_0(4, 2)$.

Достаточные условия существования экстремума

Пусть в окрестности критической точки $M_0(x_0, y_0)$ функция $f(x, y)$ имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно.

Введем обозначения: $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$.

Рассмотрим выражение: $D = AC - B^2$.

Если $D > 0$, то в точке $M_0(x_0, y_0)$ функция $f(x, y)$ имеет экстремум,

если $A < 0$, то максимум, если $A > 0$, то минимум.

Если $D < 0$, то в точке $M_0(x_0, y_0)$ функция $f(x, y)$ не имеет экстремума.

Если $D = 0$, требуются дополнительные исследования.

Пример.1

Найти экстремум функции $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 3x - 6y$.

Решение:

Найдем частные производные по x и y , чтобы вычислить координаты стационарной точки: $f'_x = 2x + y - 3$; $f'_y = 2y + x - 6$. Решим систему двух линейных уравнений:

$$\begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ 2y + x - 6 = 0 \end{cases}$$

Получим координаты стационарной точки $M_0(0, 3)$. Найдем частные производные второго порядка функции $f(x, y)$: $f''_{xx} = 2$, $f''_{xy} = 1$, $f''_{yy} = 2$,

тогда в стационарной точке $M_0(0; 3)$ параметры принимают значения: $A = 2$, $B = 1$, $C = 2$, $D = 3 > 0$, следовательно в точке $M_0(0, 3)$ имеется экстремум и это минимум, т.к. $A = 2 > 0$. Вычислим минимальное значение функции: $f_0(0; 3) = -9$.

Пример.2

Найти экстремум функции $f(x, y) = \frac{1}{2}xy + (47 - x - y)(\frac{x}{3} + \frac{y}{4})$.

Решение:

Найдем частные производные по x и y , чтобы вычислить координаты стационарной точки: $f'_x = \frac{y}{2} - \left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4}\right) + \frac{1}{3}(47 - x - y)$;

$$f'_y = x/2 - \left(x/3 + y/4\right) + 1/4(47 - x - y).$$

Решим систему двух линейных уравнений:

$$\begin{cases} x/2 - \left(x/3 + y/4\right) + 1/4(47 - x - y) = 0 \\ y/2 - \left(x/3 + y/4\right) + 1/3(47 - x - y) = 0 \end{cases}$$

Для упрощения вычислений удобно привести оба уравнения к общему знаменателю – 12. Система примет вид:

$$\begin{cases} y + 8x = 188 \\ x + 6y = 141 \end{cases}$$

Получим координаты стационарной точки $M_0(21; 20)$. Найдем частные производные второго порядка функции $f(x, y)$: $f''_{xx} = -2/3$, $f''_{xy} =$

$$-1/12,$$

$$f''_{yy} = -1/2,$$

тогда в стационарной точке $M_0(21; 20)$ параметры принимают значения: $A = -2/3$, $B = -1/12$, $C = -1/2$, $D > 0$, следовательно в точке $M_0(21, 20)$

имеется экстремум и это максимум, т.к. $A = -2/3 < 0$. Вычислим

максимальное значение функции: $f_0(21; 20) = 282$.

Примеры для самостоятельной работы:

1. Найти экстремум функции $f(x, y) = x^3 + y^3 - 15xy$
2. Найти экстремум функции $f(x, y) = -x^2 + 5x - y^2 - 2y + xy$.