

PARA SU COMODIDAD TODAS ESTAS PRUEBAS PUEDEN SER REALIZADAS EN LA CLÍNICA EUGIN DURANTE SU PRIMERA VISITA CON UN COSTE MÁS REDUCIDO Y CON CITA PREVIA

NO OBSTANTE, SI POR ALGUNA RAZÓN DESEA TRAERLAS HECHAS, LE DETALLAMOS EL LISTADO DE PRUEBAS Y SU VALIDEZ

PD 17-19-ES (Rev. 14 SEP/17)

Página 1 de 2

MUJER

VALIDEZ

Pruebas imprescindibles para un primer diagnóstico

➤ **Análisis de sangre:**

- Hemograma completo (1 año)
- Pruebas de coagulación (PT, aPTT) (1 año. En caso de realizar una FIV 6 meses)
- Anti-TPO y TSH (1 año)
(si antiTPO previo positivo, la TSH sólo tendrá una validez de 6 meses)
- Grupo sanguíneo y Rh (realizar sólo una vez)
- Coombs indirecto (si Rh negativo) (realizar sólo una vez)
- Pruebas hepáticas (SGOT, SGPT) (1 año)
- Serologías (VDRL o RPR y TPHA o FTA-ABS, Anti VHC, HBsAg, Anti HBs, Anti HBc total, Anti HBc IgM, Anti VIH, Rubéola IgG, CMV IgG e IgM). (1 año)

➤ **Exámenes ginecológicos:**

- Ecografía transvaginal con recuento de folículos antrales (1 año)
- Citología cérvico-vaginal o determinación HPV en cérvix. (No puede ser realizado durante su período menstrual) (2 años)

➤ **Si tiene 45 años o más también debe aportar las siguientes pruebas:**

- **Mamografía** (2 años)
- **Ecografía mamaria** (2 años)
- **Electrocardiograma con informe del resultado** (2 años)
- **Glucemia en ayunas** (1 año)
- **Informe de su médico** de cabecera, cardiólogo o ginecólogo/obstetra donde acredite que su estado de salud o circunstancias médicas personales no contraindican un futuro embarazo (2 años)

Pruebas adicionales

- ✓ **AMH (hormona antimulleriana)** puede realizarse cualquier día del ciclo (1 año)
- ✓ **Cariotipo** (realizar sólo una vez)
- ✓ **En caso de inseminación intrauterina:**
Para valorar la permeabilidad tubárica se requiere una histerosonosalpingografía o una histerosalpingografía, no sería necesaria si usted ha tenido una gestación reciente. Recuerde que debe llevarse a cabo durante la primera fase del ciclo (entre el día 4 – día 14) y no es posible realizarla si usted tiene la regla.
- ✓ **En caso de FIV o una recepción de ovocitos:**
Para una evaluación de la cavidad uterina se requiere una histerosonografía, histeroscopia o histerosalpingografía. Recuerde que debe llevarse a cabo durante la primera fase del ciclo (entre el día 4 – día 14) y no es posible realizarla si usted tiene la regla.
- ✓ **En caso de fallos previos de FIV o recepción de ovocitos, o historia de dos o más abortos:**
 - Cariotipo
 - Histeroscopia o histerosonografía con biopsia endometrial
 - Estudio de trombofilia
 - Estudio síndrome antifosfolípido
- ✓ En caso de padecer una enfermedad o encontrarse en un estado que pueda contraindicar un tratamiento de reproducción (ej. cardiopatías, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades crónicas, obesidad severa, enfermedad mental o psiquiátrica...), será necesario aportar informe médico de su especialista autorizando el tratamiento de reproducción asistida y el embarazo.
- ✓ En caso de infección por el virus de la Inmunodeficiencia adquirida será imprescindible presentar un informe del infectólogo según modelo adjunto.
- ✓ Si es portadora de una enfermedad hereditaria, cromosómica o genética debe aportar informe de su genetista.
- ✓ Si ha realizado ciclos de reproducción asistida previos debe aportar los informes.

PARA SU COMODIDAD TODAS ESTAS PRUEBAS PUEDEN SER REALIZADAS EN LA CLÍNICA EUGIN DURANTE SU PRIMERA VISITA CON UN COSTE MÁS REDUCIDO Y CON CITA PREVIA

NO OBSTANTE, SI POR ALGUNA RAZÓN DESEA TRAERLAS HECHAS, LE DETALLAMOS EL LISTADO DE PRUEBAS Y SU VALIDEZ

PD 17-19-ES (Rev. 14 SEP/17)

Página 2 de 2

MUY IMPORTANTE PARA EL HOMBRE:

No recomendamos una abstinencia sexual superior a 2-3 días para dejar la muestra de semen el día de la primera visita.

En caso de azoospermia o de imposibilidad para obtener una muestra de semen:
Imprescindible comunicárnoslo previamente para estudiar su caso de forma individualizada y valorar la necesidad de realizar de forma simultánea a la primera visita, una visita con el andrólogo o una biopsia testicular.

Le recordamos que si desea dejar muestra de semen el día de la primera visita médica para su uso posterior, las serologías que traiga deben haberse realizado en un plazo no superior a 3 meses.

HOMBRE

VALIDEZ

Pruebas imprescindibles para un primer diagnóstico

➤ **Análisis de sangre:**

- | | |
|---|-------------------------|
| - Hemograma completo | (1 año) |
| - Grupo sanguíneo y Rh. | (realizar una sola vez) |
| - Serologías (VDRL o RPR y TPHA o FTA-ABS, Anti VHC, HBsAg, Anti HBs, Anti HBc total, Anti HBc IgM, Anti VIH) | (3 meses) |
| - Seminograma. | (1año) |

Pruebas adicionales

- Informe del andrólogo o cualquier otra prueba relacionada (resultado biopsia testicular, microdelección de cromosoma Y, estudio molecular fibrosis quística...), si ya están realizados.
- Cariotipo, muy recomendable en caso de alteraciones graves de los parámetros seminales, fallos previos de FIV / recepción de ovocitos, o historia de dos o más abortos.
- En caso de infección por el virus de la Inmunodeficiencia adquirida será imprescindible presentar un informe del infectólogo según modelo adjunto.
- Si es portador de una enfermedad hereditaria, cromosómica o genética debe aportar informe de su genetista.