

Curso	:	Probabilidad y Estadística
Sigla	:	EYP1113
Pauta	:	Examen
Profesor	:	Ricardo Aravena (Sec. 1 y 3) y Ricardo Olea (Sec. 2)
Ayudantes	:	Erwin Agüero Meza, Tamara Fernandez Aguilar y Claudia Reyes Vizcarra.

## Problema 1

Consideremos el valor de una acción de una empresa que se transa en la Bolsa de Santiago en un instante  $t$ . Se define el retorno de la acción en el instante  $t$  como la ganancia (o pérdida) porcentual al invertir en  $t - 1$  y vender en  $t$ , es decir,

$$X_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}},$$

con  $P_t$  el valor de la acción en  $t$ . Este retorno se comporta como una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad es Normal de media cero con una varianza que depende de la variabilidad,  $Y_{t-1}$ , del mercado en el día anterior. Un investigador propone que los retornos de esta acción pueden ser representados como sigue:

$$X_t | Y_{t-1} = y \sim \text{Normal}(0, 1/\sqrt{y}), \quad Y_{t-1} \sim \text{Gamma}(k, \nu)$$

con  $k > 1$  y  $\nu > 0$ .

(a) [1.5 Ptos] Muestre que

$$f_{X_t}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\Gamma(k+1/2)}{\Gamma(k)} \frac{\nu^k}{\left(\nu + \frac{x^2}{2}\right)^{k+1/2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

(b) [1.5 Ptos] Calcule la esperanza y varianza del retorno de la acción en un instante  $t$ .

(c) [1.5 Ptos] Determine la distribución de  $Y_{t-1}$  condicionada a que  $X_t = x$ . Reconozca el modelo e identifique sus parámetros.

(d) [1.5 Ptos] Si  $k = 3/2$  y  $\nu = 1$ , calcule  $P(Y_{t-1} \leq 1/2 | X_t = \sqrt{2})$ .

## Solución

(a) Tenemos que

$$\begin{aligned} f_{X_t}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_t, Y_{t-1}}(x, y) dy \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_t | Y_{t-1}=y}(x) \cdot f_{Y_{t-1}}(y) dy \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{y}}} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-0}{1/\sqrt{y}}\right)^2\right] \frac{\nu^k}{\Gamma(k)} y^{k-1} \exp(-\nu y) dy \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\nu^k}{\Gamma(k)} \int_0^{\infty} y^{(k+1/2)-1} \exp\left[-y \left(\nu + \frac{x^2}{2}\right)\right] dy \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\nu^k}{\Gamma(k)} \frac{\Gamma(k+1/2)}{\left(\nu + \frac{x^2}{2}\right)^{k+1/2}} \int_0^{\infty} \frac{\left(\nu + \frac{x^2}{2}\right)^{k+1/2}}{\Gamma(k+1/2)} y^{(k+1/2)-1} \exp\left[-y \left(\nu + \frac{x^2}{2}\right)\right] dy \quad [0.2 \text{ Ptos}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_{X_t}(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\nu^k}{\Gamma(k)} \frac{\Gamma(k+1/2)}{(\nu + \frac{x^2}{2})^{k+1/2}} \cdot 1 \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\Gamma(k+1/2)}{\Gamma(k)} \frac{\nu^k}{(\nu + \frac{x^2}{2})^{k+1/2}}, \quad x \in \mathbb{R} \quad [0.3 \text{ Ptos}]
 \end{aligned}$$

(b) Se pide

$$\mathbf{E}(X_t) = \mathbf{E}[\mathbf{E}(X_t | Y_{t-1})] = \mathbf{E}(0) = 0 \quad [0.5 \text{ Ptos}]$$

y

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Var}(X_t) &= \mathbf{Var}[\mathbf{E}(X_t | Y_{t-1})] + \mathbf{E}[\mathbf{Var}(X_t | Y_{t-1})] \quad [0.1 \text{ Ptos}] \\
 &= \mathbf{Var}(0) + \mathbf{E}(Y_{t-1}^{-1}) \quad [0.1 \text{ Ptos}] \\
 &= \int_0^\infty \frac{1}{y} \frac{\nu^k}{\Gamma(k)} y^{k-1} e^{-\nu y} dy \quad [0.1 \text{ Ptos}] \\
 &= \int_0^\infty \frac{\nu^k}{\Gamma(k)} y^{[k-1]-1} e^{-\nu y} dy \quad [0.1 \text{ Ptos}] \\
 &= \frac{\nu \Gamma(k-1)}{\Gamma(k)} \int_0^\infty \frac{\nu^{k-1}}{\Gamma(k-1)} y^{[k-1]-1} e^{-\nu y} dy \quad [0.1 \text{ Ptos}] \\
 &= \frac{\nu \Gamma(k-1)}{\Gamma(k)} \cdot 1, \quad \text{ya que } k > 1 \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\
 &= \frac{\nu \Gamma(k-1)}{(k-1) \Gamma(k-1)} \quad [0.1 \text{ Ptos}] \\
 &= \frac{\nu}{k-1} \quad [0.2 \text{ Ptos}]
 \end{aligned}$$

(c) Tenemos que

$$\begin{aligned}
 f_{Y_{t-1} | X_t=x}(y) &= \frac{f_{X_t, Y_{t-1}}(x, y)}{f_{X_t}(x)} \quad [0.4 \text{ Ptos}] \\
 &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\nu^k}{\Gamma(k)} y^{(k+1/2)-1} \exp\left[-y\left(\nu + \frac{x^2}{2}\right)\right]}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\Gamma(k+1/2)}{\Gamma(k)} \frac{\nu^k}{(\nu + \frac{x^2}{2})^{k+1/2}}} \quad [0.4 \text{ Ptos}] \\
 &= \frac{\left(\nu + \frac{x^2}{2}\right)^{k+1/2}}{\Gamma(k+1/2)} y^{(k+1/2)-1} \exp\left[-y\left(\nu + \frac{x^2}{2}\right)\right] \quad [0.4 \text{ Ptos}]
 \end{aligned}$$

Es decir,

$$Y_{t-1} | X_t = x \sim \text{Gamma}\left(k + 1/2, \nu + \frac{x^2}{2}\right) \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

(d) Si  $k = 3/2$  y  $\nu = 1$ , entonces

$$Y_{t-1} | X_t = \sqrt{2} \sim \text{Gamma}(2, 2) \quad [0.5 \text{ Ptos}]$$

Se pide

$$\begin{aligned}
 P(Y_{t-1} \leq 1/2 | X_t = \sqrt{2}) &= 1 - \sum_{z=0}^{2-1} \frac{(2 \cdot 1/2)^z e^{-2}}{z!} \quad [0.4 \text{ Ptos}] \\
 &= 1 - e^{-2} - e^{-2} \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\
 &= 1 - 2e^{-2} \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\
 &= 0,7293294 \quad [0.2 \text{ Ptos}]
 \end{aligned}$$

+ 1 Punto Base

## Problema 2

- (a) Considere la proporción de tiempo,  $X$ , utilizado en responder un test de aptitud. Suponga que la función de densidad de  $X$  está dada por:

$$f_X(x) = (1 + \theta)x^\theta, \quad 0 < x < 1, \quad -1 < \theta,$$

donde  $\theta$  denota la habilidad.

- a.1 [1.5 Ptos] Con base a una muestra  $X_1, \dots, X_n$  determine la distribución asintótica del estimador máximo verosímil de  $\theta$ .
- a.2 [1.5 Ptos] Si en una muestra  $n = 40$  alumnos, se observa

$$\sum_{i=1}^n X_i = 23 \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n \ln(X_i) = -30$$

¿Es evidencia suficiente para afirmar que  $\theta > 0$  (habilidad positiva)? (Use  $\alpha = 5\%$ )

- (b) Con base a los resultados históricos, donde un 20% de los alumnos que se presentan al examen no logra aprobar, usted desea calcular:
- b.1 [1.5 Ptos] La probabilidad exacta que al menos un alumno(a) de su grupo de estudio compuesto por 5 personas repruebe.
- b.2 [1.5 Ptos] La probabilidad aproximada que a lo más 30 alumno(a)s, de entre los 200 que se presentan al examen, reprueben.

## Solución

- (a) a.1 Primeramente, obtenemos el estimador máximo verosímil de  $\theta$  usando la función de verosimilitud

$$L(X_1, \dots, X_n, \theta) = \prod_{i=1}^n (1 + \theta) X_i^\theta = (1 + \theta)^n \left[ \prod_{i=1}^n X_i \right]^\theta \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

Tomando logaritmo natural

$$\ln L(X_1, \dots, X_n, \theta) = n \ln(1 + \theta) + \theta \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

Derivando e igualando a cero se tiene

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{1 + \theta} + \sum_{i=1}^n \ln(X_i) = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)} - 1 \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

Ahora, para obtener la distribución asintótica calculamos la varianza asintótica:

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln L(\theta) = -\frac{n}{(1 + \theta)^2} \Rightarrow \text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{(1 + \theta)^2}{n} \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

Por tanto,

$$\hat{\theta} \overset{\text{aprox.}}{\sim} \text{Normal} \left[ \theta, \frac{(1 + \theta)}{\sqrt{n}} \right] \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

a.2 La hipótesis de interés es

$$H_0 : \theta = 0 \quad \text{vs} \quad H_a : \theta > 0, \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

con

$$\hat{\theta} = -\frac{40}{-30} - 1 = \frac{1}{3}, \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

El estadístico de prueba bajo  $H_0$

$$Z_n = \frac{\hat{\theta} - 0}{(1+0)/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{40}}{3} = 2,087 \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

distribuye Normal(0,1), por lo tanto

$$\text{valor-p} = P(Z > 2,087) \approx 1 - 0,9817 = 0,0183 \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

Como el valor-p es menor que  $\alpha = 5\%$  podemos afirmar que hay evidencia contra  $H_0$ , es decir, podemos asumir habilidad positiva. [0.3 Ptos]

(b) b.1 Sea  $X$  la variable aleatoria que representa al número alumnos que reprueba, es decir,

$$X \sim \text{Binomial}(n, p) \quad [0.3 \text{ Ptos}]$$

con  $p = 0,2$  y  $n = 5$ . [0.2 Ptos]

Nos piden

$$[0.5 \text{ Ptos}] \quad P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{5}{0} \cdot 0,2^0 \cdot (1-0,2)^{5-0} = 1 - 0,3277 = 0,6723 \quad [0.5 \text{ Ptos}]$$

b.2 Tenemos que

$$X \sim \text{Binomial}(n, p) \approx \text{Normal}\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right) \quad [0.5 \text{ Ptos}]$$

con  $p = 0,2$  y  $n = 200$ .

Aplicando corrección por continuidad

$$[0.5 \text{ Ptos}] \quad P(X \leq 30) = P(X < 30,5) \approx \Phi\left(\frac{30,5 - 40}{\sqrt{200 \cdot 0,2 \cdot 0,8}}\right) = \Phi(-1,68) = 0,0465 \quad [0.5 \text{ Ptos}]$$

+ 1 Punto Base

### Problema 3

Con base a un análisis de los últimos 100 alumnos que han reprobado el curso EYP1113, se han tabulado los puntajes que ellos habían obtenidos en la PSU-lenguaje, con promedio observado de 700 puntos, como se muestra a continuación:

Categoría	$\leq 620$	$(620 - 680]$	$(680 - 710]$	$(710 - 740]$	$> 740$
Frecuencia	12	18	24	24	22

- (a) **[3.0 Ptos]** ¿Se adecúan a una distribución normal, con una desviación estándar conocida e igual a 60? Especifique hipótesis, obtenga el test y su respectiva conclusión. (Utilice tres decimales en sus cálculos)
- (b) **[1.0 Ptos]** Basado en los resultados anteriores, determine un intervalo de confianza al 90 % para el puntaje medio PSU-L.
- (c) **[2.0 Ptos]** Con el objeto de profundizar el estudio se requiere determinar el tamaño de muestra mínimo que permita estimar el puntaje medio con un error no mayor a 5 puntos y con un 95 % de confianza. ¿Que tamaño muestral pondría usted?

### Solución

- (a) La hipótesis es

$$H_0 : \text{Datos} \sim \text{Normal}(\mu, \sigma) \quad \text{vs} \quad H_a : \text{Datos} \not\sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$$

Del enunciado tenemos que

$$\hat{\mu} = 700 \quad \text{y} \quad \sigma = 60 \quad \text{[0.5 Ptos]}$$

Categoría	Frecuencia ( $O$ )	Probabilidad Estimada	Frecuencia Estimada ( $E$ )	$(O - E)^2/E$
$\leq 620$	12	0,0912	9,12	0,909
$(620 - 680]$	18	0,2783	27,83	3,472
$(680 - 710]$	24	0,1967	19,67	0,953
$(710 - 740]$	24	0,1813	18,13	1,901
$> 740$	22	0,2525	25,25	0,418
$\Sigma$	100,000	1,000	100,000	7,653

[0.5 Ptos]

[0.5 Ptos]

[0.5 Ptos]

El estadístico de prueba

$$X^2 = \sum_{i=1}^5 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 7,653 \sim \chi^2(\nu) \quad \text{[0.3 Ptos]}$$

con  $\nu = (5 - 1) - 1 = 3$ , ya que solo se estimo un parámetro. [0.2 Ptos]

De la tabla chi-cuadrado tenemos que

$$5\% < \text{valor-p} < 10\% \quad \text{[0.5 Ptos]}$$

Por lo tanto para un error tipo I del 5 %, no existe suficiente evidencia para rechazar que los datos distribuyen Normal.

- (b) Basado en el teorema del límite central, tenemos que

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \underset{\text{aprox.}}{\sim} \text{Normal}(0, 1)$$

Por lo tanto, un intervalo de confianza para el puntaje medio  $\mu$  está dado por

$$< \mu >_{1-\alpha} \in \bar{X} \pm k_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{[0.5 Ptos]}$$

$$\in 700 \pm 1,645 \cdot \frac{60}{\sqrt{100}} \quad \text{[0.3 Ptos]}$$

$$\in (690,13 - 709,87) \quad \text{[0.2 Ptos]}$$

(c) Se pide

$$\text{[1.0 Ptos]} \quad n = \left( \frac{k_{1-\alpha/2} \cdot \sigma}{\delta} \right)^2 = \left( \frac{1,96 \cdot 60}{5} \right)^2 = 553,1904 \quad \text{[0.5 Ptos]}$$

Se propone un mínimo de 554 casos. **[0.5 Ptos]**

**+ 1 Punto Base**

# Formulario

- Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria independiente e idénticamente distribuida con función de probabilidad  $p_X$  o de densidad  $f_X$ , determinada por un parámetro  $\theta$ . Si  $\hat{\theta}$  es el estimador máximo verosímil del parámetro  $\theta$ , entonces:

- $\mathbf{E}(\hat{\theta}) \rightarrow \theta$ , cuando  $n \rightarrow \infty$ .
- $\mathbf{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{I_n(\theta)}$ , con  $I_n(\theta) = -\mathbf{E} \left[ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln L(\theta) \right]$ .
- $\hat{\theta} \sim \text{Normal} \left( \theta, \sqrt{\frac{1}{I_n(\theta)}} \right)$ , cuando  $n \rightarrow \infty$ .
- El estimador máximo verosímil de  $g(\theta)$  es  $g(\hat{\theta})$ , cuya varianza está dada por:  $\mathbf{Var}[g(\hat{\theta})] = \frac{[g'(\theta)]^2}{I_n(\theta)}$ .

- Propiedades función  $\Gamma(\cdot)$ :

$$(1) \quad \Gamma(k) = \int_0^\infty u^{k-1} e^{-u} du; \quad (2) \quad \Gamma(a+1) = a \Gamma(a);$$

$$(3) \quad \Gamma(n+1) = n!, \quad \text{si } n \in \mathbb{N}_0; \quad (4) \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

- Propiedades función  $B(\cdot, \cdot)$ :

$$(1) \quad B(q, r) = \int_0^1 x^{q-1} (1-x)^{r-1} dx; \quad (2) \quad B(q, r) = \frac{\Gamma(q) \Gamma(r)}{\Gamma(q+r)}$$

- Propiedad distribución Gamma:

$$\text{Si } T \sim \text{Gamma}(k, \nu) \Rightarrow F_T(t) = 1 - \sum_{x=0}^{k-1} \frac{(\nu t)^x e^{-\nu t}}{x!}, \quad \text{si } k \in \mathbb{N}$$

- Igualdades

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^x b^{n-k} = (a+b)^n, \quad \sum_{k=x}^{\infty} \phi^k = \frac{\phi^x}{1-\phi} \quad \text{si } |\phi| < 1, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \exp(\lambda)$$

# Distribuciones

Distribución	Densidad de Probabilidad	$\Theta_X$	Parámetros	Esperanza y Varianza
Binomial	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	$x = 0, \dots, n$	$n, p$	$\mu_X = np$ $\sigma_X^2 = np(1-p)$ $M(t) = [pe^t + (1-p)]^n, \quad t \in \mathbb{R}$
Geométrica	$p(1-p)^{x-1}$	$x = 1, 2, \dots$	$p$	$\mu_X = 1/p$ $\sigma_X^2 = (1-p)/p^2$ $M(t) = pe^t/[1 - (1-p)e^t], \quad t < -\ln(1-p)$
Binomial-Negativa	$\binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$	$x = r, r+1, \dots$	$r, p$	$\mu_X = r/p$ $\sigma_X^2 = r(1-p)/p^2$ $M(t) = \left\{ pe^t/[1 - (1-p)e^t] \right\}^r, \quad t < -\ln(1-p)$
Poisson	$\frac{(\nu t)^x e^{-\nu t}}{x!}$	$x = 0, 1, \dots$	$\nu$	$\mu_X = \nu t$ $\sigma_X^2 = \nu t$ $M(t) = \exp\left[\lambda(e^t - 1)\right], \quad t \in \mathbb{R}$
Exponencial	$\nu e^{-\nu x}$	$x \geq 0$	$\nu$	$\mu_X = 1/\nu$ $\sigma_X^2 = 1/\nu^2$ $M(t) = \nu/(\nu - t), \quad t < \nu$
Gamma	$\frac{\nu^k}{\Gamma(k)} x^{k-1} e^{-\nu x}$	$x \geq 0$	$k, \nu$	$\mu_X = k/\nu$ $\sigma_X^2 = k/\nu^2$ $M(t) = [\nu/(\nu - t)]^k, \quad t < \nu$
Normal	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$	$-\infty < x < \infty$	$\mu, \sigma$	$\mu_X = \mu$ $\sigma_X^2 = \sigma^2$ $M(t) = \exp(\mu t + \sigma^2 t^2/2), \quad t \in \mathbb{R}$
Log-Normal	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}(\zeta x)} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \lambda}{\zeta}\right)^2\right]$	$x \geq 0$	$\lambda, \zeta$	$\mu_X = \exp\left(\lambda + \frac{1}{2}\zeta^2\right)$ $\sigma_X^2 = \mu_X^2(e^{\zeta^2} - 1)$ $E(X^r) = e^{r\lambda} M_Z(r\zeta), \text{ con } Z \sim \text{Normal}(0,1)$
Uniforme	$\frac{1}{(b-a)}$	$a \leq x \leq b$	$a, b$	$\mu_X = (a+b)/2$ $\sigma_X^2 = (b-a)^2/12$ $M(t) = [e^{tb} - e^{ta}]/[t(b-a)], \quad t \in \mathbb{R}$
Beta	$\frac{1}{B(q, r)} \frac{(x-a)^{q-1} (b-x)^{r-1}}{(b-a)^{q+r-1}}$	$a \leq x \leq b$	$q, r$	$\mu_X = a + \frac{q}{q+r}(b-a)$ $\sigma_X^2 = \frac{q r (b-a)^2}{(q+r)^2 (q+r+1)}$
Hipergeométrica	$\frac{\binom{m}{x} \binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	$\max\{0, n+m-N\} \leq x \leq \min\{n, m\}$	$N, m, n$	$\mu_X = n \frac{m}{N}$ $\sigma_X^2 = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) n \frac{m}{N} \left(1 - \frac{m}{N}\right)$



# Tablas de Percentiles $p$

Distribución Normal Estándar $k_p$											Distribución t-student $t_p(\nu)$				
$k_p$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	$\nu$	$t_{0,90}$	$t_{0,95}$	$t_{0,975}$	$t_{0,99}$
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359	1	3,078	6,314	12,706	31,821
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753	2	1,886	2,920	4,303	6,965
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141	3	1,638	2,353	3,182	4,541
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517	4	1,533	2,132	2,776	3,747
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879	5	1,476	2,015	2,571	3,365
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224	6	1,440	1,943	2,447	3,143
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549	7	1,415	1,895	2,365	2,998
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852	8	1,397	1,860	2,306	2,896
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133	9	1,383	1,833	2,262	2,821
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389	10	1,372	1,812	2,228	2,764
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621	11	1,363	1,796	2,201	2,718
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830	12	1,356	1,782	2,179	2,681
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015	13	1,350	1,771	2,160	2,650
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177	14	1,345	1,761	2,145	2,624
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319	15	1,341	1,753	2,131	2,602
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441	16	1,337	1,746	2,120	2,583
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545	17	1,333	1,740	2,110	2,567
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633	18	1,330	1,734	2,101	2,552
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706	19	1,328	1,729	2,093	2,539
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767	20	1,325	1,725	2,086	2,528
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817	21	1,323	1,721	2,080	2,518
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857	22	1,321	1,717	2,074	2,508
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890	23	1,319	1,714	2,069	2,500
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916	24	1,318	1,711	2,064	2,492
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936	25	1,316	1,708	2,060	2,485
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952	26	1,315	1,706	2,056	2,479
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964	27	1,314	1,703	2,052	2,473
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974	28	1,313	1,701	2,048	2,467
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981	29	1,311	1,699	2,045	2,462
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986	30	1,310	1,697	2,042	2,457
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990	$\infty$	1,282	1,645	1,960	2,326

Distribución Chi-Cuadrado $c_p(\nu)$								
$\nu$	$c_{0,025}$	$c_{0,05}$	$c_{0,10}$	$c_{0,90}$	$c_{0,95}$	$c_{0,975}$	$c_{0,99}$	$c_{0,995}$
1	0,00	0,00	0,02	2,71	3,84	5,02	6,63	7,88
2	0,05	0,10	0,21	4,61	5,99	7,38	9,21	10,60
3	0,22	0,35	0,58	6,25	7,81	9,35	11,34	12,84
4	0,48	0,71	1,06	7,78	9,49	11,14	13,28	14,86
5	0,83	1,15	1,61	9,24	11,07	12,83	15,09	16,75
6	1,24	1,64	2,20	10,64	12,59	14,45	16,81	18,55
7	1,69	2,17	2,83	12,02	14,07	16,01	18,48	20,28
8	2,18	2,73	3,49	13,36	15,51	17,53	20,09	21,95
9	2,70	3,33	4,17	14,68	16,92	19,02	21,67	23,59
10	3,25	3,94	4,87	15,99	18,31	20,48	23,21	25,19
11	3,82	4,57	5,58	17,28	19,68	21,92	24,72	26,76
12	4,40	5,23	6,30	18,55	21,03	23,34	26,22	28,30
13	5,01	5,89	7,04	19,81	22,36	24,74	27,69	29,82
14	5,63	6,57	7,79	21,06	23,68	26,12	29,14	31,32
15	6,26	7,26	8,55	22,31	25,00	27,49	30,58	32,80
16	6,91	7,96	9,31	23,54	26,30	28,85	32,00	34,27
17	7,56	8,67	10,09	24,77	27,59	30,19	33,41	35,72
18	8,23	9,39	10,86	25,99	28,87	31,53	34,81	37,16
19	8,91	10,12	11,65	27,20	30,14	32,85	36,19	38,58
20	9,59	10,85	12,44	28,41	31,41	34,17	37,57	40,00
21	10,28	11,59	13,24	29,62	32,67	35,48	38,93	41,40
22	10,98	12,34	14,04	30,81	33,92	36,78	40,29	42,80
23	11,69	13,09	14,85	32,01	35,17	38,08	41,64	44,18
24	12,40	13,85	15,66	33,20	36,42	39,36	42,98	45,56
25	13,12	14,61	16,47	34,38	37,65	40,65	44,31	46,93