6.- En la reacción entre el permanganato de potasio ($KMnO_4$) y el yoduro de potasio (KI) en presencia de hidróxido de potasio (KOH) se obtiene manganato de potasio (K_2MnO_4), yodato de potasio (KIO_3) y agua.

a) Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

b) Calcule los gramos de KI necesarios para la reducción de 50 mL de una disolución 0,025 M de $KMnO_4$.

Datos: Masas atómicas relativas I=127; K=39

Instrucciones:	**a) Duración: 1 hora y 30 minutos.**
	b) Elija y desarrolle una opción completa, sin mezclar cuestiones de ambas. Indique, **claramente**, la opción elegida.
	c) No es necesario copiar la pregunta, basta con poner su número.
	d) Se podrá responder a las preguntas en el orden que desee.
	e) Puntuación: Cuestiones (nº 1, 2, 3 y 4) hasta 1,5 puntos cada una. Problemas (nº 5 y 6) hasta 2 puntos cada uno.
	f) Exprese sólo las ideas que se piden. Se valorará positivamente la concreción en las respuestas y la capacidad de síntesis.
	g) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

OPCIÓN B