

IMAT

Analyse dp

Application mécanique, optimisation probabilités, géométrie algébrique, codage orthographique, informatique. Numérique.

imath.fr

Buchitte Guy, google scholar

1. Principes généraux en optimisation 2. Analyse convexe 3. Problèmes en dualité (en dimension infinie) 4. Application en transport optimal

Problèmes du calcul des variations.

# Chapitre 1

## Principes généraux en optimisation

### 1.1 initiation

On considère des problèmes du type :  $\inf\{F(u)|u \in X\}$ , où  $X$ —espace vectoriel (Banach de dimension infinie)  $F : u \in X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$

- Existence d'un minimisation
- Unicité?
- Conditions d'optimalisés

Nécessaire ou suffisante ou des deux. Si  $\text{dom } F \neq \emptyset$ .

**Remarque.** Il existe une suite  $(u_n)$  dans  $X$  telle que  $\lim_{n \rightarrow \infty} F(u_n) = \inf_X F$

**Notations 1.**  $\text{dom } F = \{u \in X | F(u) < +\infty\}$ .

Si  $\text{dom } F \neq \emptyset \Rightarrow \inf F < +\infty$ .  $\forall \alpha > \inf_X F \exists u \in X$  tel que  $\inf_X F \leq F(u) < \alpha$ .  $(u_n)$  est une suite minimisante.

### 1.2 Cas $X = \mathbb{R}^N$

Soit  $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  continue et  $C$  une partie fermée, non vide de  $\mathbb{R}^N$ .

**Théorème 1.**  $f$  atteint son minimum sur  $C$  sous l'une des conditions suivantes :

- (i)  $C$  est bornée
- (ii)  $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) \leq +\infty$  (coercitive)

*Démonstration.* Soit  $(x_n)$  une suite minimalé i.e.  $x_n \in C$  et  $f(x_n) \rightarrow \alpha := \inf_X f$ .

Cas i)  $x_n \in C$  compact  $\Rightarrow \exists x_{n_k}, \exists \bar{x} | x_{n_k} \rightarrow \bar{x}$ . Alors  $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\bar{x})$  par continuité de  $f$  au pt  $\bar{x}$

Cas ii) Soit  $\beta > \alpha$ . Puisque  $f(x) \rightarrow +\infty$  qd  $n\|x\| \rightarrow \infty : \exists R > 0 | f(x) > \beta \text{ si } \|x\| \geq R$ . D'autre part  $\exists N | \forall n \geq N f(x_n) \leq \beta$ . Donc on a  $\|x_n\| \leq R \forall n \geq N$  et la suite  $(x_n)$  est bornée. Donc  $\exists x_{n_k}, \exists \bar{x} \in \mathbb{R}^N | x_{n_k} \rightarrow \bar{x}$ .  $x_{n_k} \in C$  fermé et  $x_{n_k} \rightarrow \bar{x} \Rightarrow \bar{x} \in C$ . donc on a :  $\bar{x} \in C$  et  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \alpha = \inf_C f$  Bien on a :  $F : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$   $\square$

$F(x) = f(s)$  si  $x \in C$  et  $+\infty$  sinon,  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $\inf_C f = \inf_X F$ .

**Remarque.** Ici  $F$  n'est pas continue mais dans les cas i) et ii), on a  $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} F(x) = +\infty$ . En optimisation  $f$  s'appelle le critère et  $C$  est la contrainte.  $F = f + \delta_C$ . Où  $\delta_C = 0$  si  $x \in C$  et  $+\infty$  sinon.

Mais  $F$  vérifie la propriété  $x_n \rightarrow x \Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n) \geq F(x)$  ( $\liminf_{n \rightarrow \infty} F(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) + \delta_C(x_n)] \geq \underbrace{\liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)}_{f(x)} + \underbrace{\liminf_{n \rightarrow \infty} \delta_C(x_n)}_{\geq \delta_C(x)}$ )  $\liminf_{n \rightarrow +\infty} \delta_C(x_n) \stackrel{?}{\geq} \delta_C(x)$ .

1er cas  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \delta_C(x_n) < +\infty$ .  $\forall N \exists n > N \ x_n \in C \Rightarrow \exists x_{n_k} | x_{n_k} \in C \forall k \Rightarrow x \in C$  ( $C$  est fermé)  $\Rightarrow \delta_C(x) = 0$ . 2me cas  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \delta_C(x_n) = +\infty$  trivial.

Autre preuve.  $x \in C$ —trivial;  $x \notin C \Rightarrow \exists N | x_n \notin C \forall n \geq N \Rightarrow \delta_C(x_n) = +\infty \forall n \geq N$ .

**Définition 1.**  $F : (X, d) \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  espace métrique est SEMI-CONTINUE INFÉRIEURE au point  $x \in X$  si  $\forall \alpha < F(x) \exists R > 0 \mid d(x, y) < R \Rightarrow F(y) > \alpha$  (ou bien  $\exists V$  ouvert contenant  $x$  tel que  $\inf_V F > \alpha$ )

**Définition 2.**  $F$  est f.c.i sur  $X$  (f.s.c.—FERMER SEMI-CONTINUONS) si  $F$  est s.c.i. en tout point  $x \in X$ .

**Lemme 1.**  $F$  est s.c.i. sur  $X$  si et seulement si l'une des conditions suivantes est vérifié :

1.  $\forall R \in \mathbb{R} | \{F \leq R\}$  est un fermé de  $X$  ( $\{F \leq R\} = \{x \in X | F(x) \leq R\}$ )
2. L'ensemble  $\text{epi } F = \{(u, \alpha) \in X \times \mathbb{R} | F(u) \leq \alpha\}$  est fermé dans  $X \times \mathbb{R}$ .
3. On a pour toute suite  $(u_n)$  dans  $X$   $u_n \rightarrow u \Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} F(u_n) \geq F(u)$

$$X = \mathbb{R} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \neq 0 \\ -1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\text{epi } F = \{(x, \alpha), F(x) \leq \alpha\}. \quad F_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0 \text{ ou } x \geq \frac{1}{n} \\ 1 - n|x|, & \text{si } 0 \leq |x| \leq \frac{1}{n} \end{cases}$$

**Théorème 2.** Soit  $F : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  où  $X$  est un e.v.n. local compact;  $F$  s.c.i. et coercive alors  $F$  atteint son minimum et l'ensemble ses solutions  $\text{Argmin } F = \{u \in X | F(u) = \inf F\}$  est un compact non vide.

*Démonstration.* Soit  $\alpha_n$  une suite de réels telle que :  $\alpha_{n+1} \leq \alpha_n$ .  $\alpha_n \rightarrow \inf_X F$ . Posons  $K_n = \{u \in X | F(u) \leq \alpha_n\}$ . On a :

- $K_n \neq \emptyset$  (car  $\alpha_n > \inf F$ )
- $K_{n+1} \subset K_n$  (car  $\alpha_{n+1} < \alpha_n$ )
- $K_n$  fermé (car  $F$  est s.c.i.)

Posons  $K = \bigcap_{n=1}^{+\infty} K_n$ . Si  $\lim_{\|u\| \rightarrow +\infty} F(u) = +\infty$ , alors  $\exists R > 0$ .  $K_n \subset \{\|u\| \leq R\}$  (c'est compact de  $X$ )  $\forall n$ . (car  $\exists R > 0 | \|u\| > r \Rightarrow F(u) > \alpha_n \forall n$ ) ( $K_n$ ) et une suite  $\searrow$  de compacts non vides :  $K_n$  est fermé borné Donc  $K = \bigcap K_n$  est donc un compact non vide. Or  $K = \{u \in X | F(u) \leq \alpha_n \forall n\} = \{u \in X | F(u) \leq \inf_X F\} = \text{Argmin } F$ .  $\square$

**Problème 1.**  $X$  Banach  $\dim X = +\infty \Rightarrow X$  non local compact; Idée : utiliser une topologie  $G$  plus faible que la topologie de la norme et telle que :

- $F$  est  $G$  s.c.i. et  $\forall \alpha | \{F \leq \alpha\}$  est  $G$ -compact.

# 1.3 Cas où $X$ est un Hilbert

**Rappel.**  $X$  Hilbert avec produit scalaire  $(u|v)$   $\|u\| = \sqrt{(u|u)}$ . Soit  $C$  convexe fermé non vide de  $X$  ;  $x \in X$   $f : y \in X \rightarrow \|x - y\|$  ;  $\inf_{y \in C} \|x - y\| = d(x, C)$  distance de  $x$  à  $C$ .

**Théorème 3.**  $\exists! x^* \in C$  tel que  $\|x - x^*\| = d(x, C) = \inf_{y \in C} \|x - y\|$ . (ici  $F(y) = \|x - y\| + \delta_C(y)$ ).

**Remarque.**  $F$  est s.c.i. et coercive.  $(\lim_{\|y\| \rightarrow +\infty} \|x - y\| = +\infty)$  mais  $X$  n'est pas local compact.

*Démonstration.* Soit  $(y_n)$  une suite dans  $C$  telle que  $\|x - y_n\| \rightarrow \alpha = d(x, C)$ . Alors on montre que  $(y_n)$  est une suite de Cauchy en utilisant :  $\|a - b\|^2 + \|a + b\|^2 = 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2$   
 $a = \frac{x - y_n}{2}$ ,  $b = \frac{x - y_m}{2}$ . donc  $\frac{\|y_n - y_m\|^2}{4} + \|x - \frac{y_n + y_m}{2}\|^2 = \frac{\|x - y_n\|^2}{2} + \frac{\|x - y_m\|^2}{2} \rightarrow \alpha^2$  ( $C$  convexe  $\frac{y_n + y_m}{2} \in C$  et  $\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\| \geq \alpha$ )  $\square$

$x_1^*, x_2^*$  solutions  $\Rightarrow x_1^* + x_2^*/2$  solution.  $0 \leq \left\| x - \frac{x_1^* + x_2^*}{2} \right\| \leq \frac{1}{2}\|x - x_1^*\| + \frac{1}{2}\|x - x_2^*\| < \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\alpha$

$x^*$  est solution  $\Leftrightarrow \operatorname{Re}((x^* - x | x^* - y)) \leq 0 \ \forall y \in C$ .  $X$  espace de Hilbert sur  $\mathbb{R}$ ,  $a(u, v)$  forme bilinéaire symétrique :  $(a(v, u) = a(u, v))$ . Telle que

- $|a(u, v)| \leq C\|u\|\|v\|$  (continuité)  $\forall (a, v) \in X \times X$
- $\exists k > 0$   $a(u, u) \geq k\|u\|^2 \ \forall u \in X$
- $f$  une forme linéaire continue sur  $X$  ( $f \in X^*$ ) (notation  $\langle f, u \rangle$  au lieu de  $f(v)$ ).

**Théorème 4** (Lax-Milgram).  $\exists! u \in X$  tel que  $a(u, v) = \langle f, v \rangle \ \forall v \in X$ . De plus, si on pose  $F(u) = \frac{1}{2}a(u, u) - \langle f, u \rangle$ , on a :  $F(u) \leq F(v) \ \forall v \in X$  (i.e.  $F(u) = \min_X F$ ) et  $u$  est l'unique minimiser de  $F$ .

**Remarque.**  $F$  est continue d'après i) (exo)  $\lim_{\|u\| \rightarrow \infty} F(u) = +\infty$  d'après (ii) (exo)  $(F(u) \geq k\|u\|^2 - \langle f, u \rangle \geq k\|u\|^2 - \|f\|_{X^*}\|u\|_X)$   $F$  est convexe.

**Corollaire 1** (Stampacchia). Soit  $C$  un convexe fermé de  $X$  et  $E(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle$  (qui est convexe, continue, convexe sur  $X$ ) ( $F(v) = E(v) + \delta_C(v)$ ). Alors  $\exists! u \in C$  tel que  $E(u) = \inf_{v \in C} E(v)$   $u$  est caractérisée par l'inéquation :  $a(u, v - u) \geq \langle f, v - u \rangle \ \forall v \in C$ .

**Remarque.** On prenant  $C = X$ , on retrouve Lax-Milgram car  $a(u, w) \geq \langle f, w \rangle \ \forall w \in X$  ( $w = v - u$ )  $\Rightarrow a(u, w) = \langle f, w \rangle$ .

$$a : X \times X \rightarrow \mathbb{R} \ f \in X^* \ \begin{cases} a(u, v) \leq M\|u\|\|v\| \\ a(u, v) \geq k\|u\|^2 \end{cases}.$$

$\inf_{u \in C} \{ \frac{1}{2}a(u, u) - \langle f, u \rangle \}$   $C$  convexe fermé de  $X$ .

$\exists! \bar{u} \in C$  tel que  $\frac{1}{2}a(\bar{u}, \bar{u}) - \langle f, \bar{u} \rangle \leq \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle \ \forall v \in C$ . Alors  $a(\bar{u}, v - \bar{u}) \geq \langle f, v - \bar{u} \rangle \ \forall v \in C$ .

**Remarque.** La fonctionnelle  $F(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle$  est continue sur  $X$  (exo). Elle est convexe (même strictement convexe). Elle es coercive car  $F(v) \geq \frac{k}{2}\|v\|_X^2 - \|f\|_{X^*}\|v\|_X \Rightarrow \lim_{\|v\| \rightarrow +\infty} F(v) = +\infty$ . Si  $(u_n)$  est une suite minimisante sur  $C$ , alors  $(u_n)$  est bornée dans  $X$ . Mais on ne peut pas extraire une sous suite  $(u_{n_k})$  telle que  $u_{n_k} \rightarrow u$  dans  $X$  ( $X$  n'est pas loc compact).

*Démonstration.* (argument analogue à celui du Thm de projection dans un Hilbert)

Posons  $(u|v)_a = a(u, v)$ . C'est une forme bilinéaire symétrique positive :  $(u|u)_a \geq k\|u\|^2 > 0$  si  $u \neq 0$ . Donc c'est un produit scalaire sur  $X$ . Norme associée  $\|u\|_a = \sqrt{(u|u)_a}$ .

Les normes  $\|\cdot\|$  et  $\|\cdot\|_a$  sont équivalentes car :  $k\|u\|^2 \leq \|u\|_a^2 \leq M\|u\|^2$ . En particulier  $(X, \|\cdot\|_a)$  est un espace de Hilbert. La forme linéaire.  $L : v \in X \rightarrow \langle f, v \rangle$  est continue dans  $(X, \|\cdot\|_a)$ . D'après Riesz :

$$\exists! u_0 \in X \text{ tel que } (u_0|v)_a = \langle f, v \rangle \forall v \in X.$$

D'après le Thm de projection ( $C$  est un convexe ferme de  $(X, \|\cdot\|)$ ) :

$$\exists! \bar{u} \in C \text{ tel que } \|u_0 - \bar{u}\|_a = \inf_{u \in C} \|u_0 - u\|_a.$$

En particulier, on aura :

$$a(\bar{u} - u_0, \bar{u} - u_0) = \inf_{u \in C} a(v - u_0, v - u_0)$$

Or  $\frac{1}{2}a(v - u_0, v - u_0) = \frac{a(v, v)}{2} - a(v, u_0) + \frac{a(u_0, u_0)}{2} = \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle + \frac{a(u_0, u_0)}{2}$  d'où  $\frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle \geq \frac{1}{2}a(\bar{u}, \bar{u}) - \langle f, \bar{u} \rangle \forall v \in X$ .  $(\frac{1}{2}a(v - u_0, v - u_0) - \frac{a(u_0, u_0)}{2} \geq \frac{a(\bar{u} - u_0, \bar{u} - u_0)}{2} - \frac{a(u_0, u_0)}{2})$

En fait on a :  $\bar{u} \in \text{Argmin}_C F \Leftrightarrow \bar{u} = \text{proj}_C u_0$ .

De plus toute suite minimisante  $(u_n)$  vérifie  $\|u_0 - u_n\|_a \rightarrow \inf_{u \in C} \|u_0 - u\|_a$  et donc de Cauchy pour  $\|\cdot\|_a$  (donc aussi  $\|\cdot\|$ )

$\bar{u} \text{ sol} \Leftrightarrow \bar{u} = \text{proj}_C u_0 \Leftrightarrow (u_0 - \bar{u}|u_0 - v)_a \leq 0 \forall v \in C \Leftrightarrow a(u_0 - \bar{u}|v - u_0) \leq 0 \forall v \in C$   
 $\Leftrightarrow a(\bar{u} - u_0|\bar{u} - v) \leq 0 \forall v \in C \Leftrightarrow a(\bar{u}, \bar{u} - v) \leq a(u_0, \bar{u} - v) \Leftrightarrow a(\bar{u}, v - \bar{u}) \geq a(u_0, v - \bar{u})$   
 $\Leftrightarrow a(\bar{u}, v - \bar{u}) \geq \langle f, v - \bar{u} \rangle \forall v \in C.$   $\square$

**Remarque.** Si la contrainte  $C$  est un sous espace vectoriel fermé  $V$  de  $X$  on obtient :

$$\bar{u} \text{ minimise } \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle \text{ sur } X \Leftrightarrow a(\bar{u}, v) = \langle f, v \rangle \forall v \in V$$

Si  $V = X$  on obtient l'équation  $a(\bar{u}, w) = \langle f, w \rangle \forall w \in X$ .  $(A\bar{u}|w) = \langle f, w \rangle$  où  $A$  opérateur linéaire auto adjacent-continue de  $X$  dans  $X$ .  $\Rightarrow A\bar{u} = f$

**Rappel.**  $A \in s(X)$  ( $A^* = A$ )  $a(u, v) = (Au|v)$  bilinéaire symétrique  $|a(u, v)| \leq M\|u\|\|v\|$

**Exemple 1.** élémentaire.  $X = \{u \in L^2(0, 1) \mid u' \in L^2(0, 1)\}$   $u \in X \Leftrightarrow u \in L^2(0, 1)$  et  $\exists v \in L^2(0, 1)$  tel que :  $\int_0^1 u \varphi' dx = - \int_0^1 v \varphi dx$

$\forall f \in C^1(0, 1)$  et  $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ .

— si  $u \in C^1$  on trouve  $v = u'$

— si  $u$  est  $C$  continue,  $C^1$  par morceaux  $u = 1$  si  $x < \frac{1}{2}$  et  $-1$  si  $x > \frac{1}{2}$   $\int_0^1 u \varphi' = \int_0^{\frac{1}{2}} u \varphi' + \int_{\frac{1}{2}}^1 u \varphi' = - \int_0^1 v \varphi + (u(\frac{1}{2} + 0) - u(\frac{1}{2} - 0))\varphi(\frac{1}{2})$ .

$(u|v) = \int_0^1 (uv + u'v') dx \quad \|u\|^2 = \int_0^1 (|u|^2 + |u'|^2) dx$ .  $u \in X \Rightarrow \exists \bar{u} = u$  pp  $|\bar{u}(x) - \bar{u}(y)| \leq \|u'\|_{L^2(0,1)} \sqrt{|x - y|}$   $x < y$   $|u(x) - u(y)| = |\int_x^y u'(t) dt| \leq \sqrt{|y - x|} \sqrt{\int_0^1 |u'|^2 dt}$ .

$\inf_{v \in X} [\frac{1}{2} \int_0^1 |u'|^2 dx - \int_0^1 f v dx], f \in L^1(0, 1)$ .  
 $v(0) = v(1) = 0$

Soit  $H = \{u \in X \mid u(0) = u(1) = 0\}$ .  $u_n \xrightarrow{X} u$  uniformément sur  $[0, 1]$ . C'est un sous espace fermé de  $X$ , donc un Hilbert.

Ici  $a(u, v) = \int_0^1 u'v' \, dx$

$$- |a(u, v)| \leq \|u'\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \|u\|_H \|v\|_H$$

$$- a(u, u) = \int_0^1 |u'|^2 \, dx \geq k \|u\|_H^2. \quad u(x) = u(0) + \int_0^1 u'(t) \, dt \Rightarrow |u(x)| \leq \|u'\|_{L^2} \sqrt{x} \leq \|u'\|_{L^2} \Rightarrow \int_0^1 |u(x)|^2 \, dx \leq \|u'\|_{L^2}^2 \Rightarrow \|u\|_{L^2} \leq \|u'\|_{L^2} \text{ si } u \in H, \text{ Donc } 2 a(u, u) \geq \int_0^1 u'^2 \, dx + \int_0^1 u^2 \, dx = \|u\|_H^2.$$

$$a(u, u) \geq \frac{1}{2} \|u\|_H^2$$

$$\text{Lax Milgram} \Rightarrow \exists ! u \in H \mid \frac{1}{2} u'^2 - \int_0^1 f u' \, dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |v'|^2 - \int_0^1 f v \, dx \quad \forall v \in H.$$

$$\text{Conclusion de la schuhcnu } a(u, v) = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in H \quad \int_0^1 u'v' \, dx = \int_0^1 f v \, dx, \quad \forall v \in H (u(0) = v(1) = 0).$$

$$\text{Supposons que la sol } u \text{ est 2 fois dérivable sur } ]0, 1[ \quad \int_0^1 u'v' \, dx = [u'v]_0^1 - \int_0^1 u''v \, dx \Rightarrow - \int_0^1 u''v \, dx = \int_0^1 f x \, dx \quad \forall v \in H \Leftrightarrow -u'' = f$$

Ainsi

$$\begin{cases} -u'' = f \text{ sur } ]0, 1[ \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Posons } f(x) = \int_0^1 x f(t) \, dt \quad -u' = F(x) + \lambda. \quad u(0) = u(1) = 0 \Rightarrow \int_0^1 u'(t) \, dt = 0 \Rightarrow \lambda = - \int_0^1 F(x) \, dx. \quad u(x) = u(0) + \int_0^x u'(t) \, dt \Rightarrow u(x) = x \int_0^1 F(t) \, dt - \int_0^x F(t) \, dt.$$

## 1.4 Cas où $X$ est un Banach (non Hilbert)

On considère une topologie  $C$  sur  $X$  telle que  $\forall R \{u \in X \mid \|u\| \leq R\}$  est  $C$ -compact.

**Rappel.**  $C$  est plus faible que la topologie associée à la norme.

### 1.4.1 Cas Importantes

—  $X$  est un Banach réflexif ( $X^* = X$ )  $x \in X \rightarrow \hat{x} \in X^{**}$  ou  $\hat{x}(f) = f(x) \quad \forall f \in X^*$  (évaluation de  $f$  au point  $x$ )  $\|\hat{x}\|_{X^{**}} = \sup_{\|f\|_{X^*} \leq 1} \hat{x}(f) = \sup_{\|f\|_{X^*} \leq 1} f(x) = \|x\|_X$ . L'application  $x \in X \rightarrow \hat{x} \in X^{**}$  est une isométrie.

$C$  = topologie faible de  $X$ .  $x_n \xrightarrow{\text{faible}} x \Leftrightarrow \forall f \in X^* f(x_n) \rightarrow f(x)$

**Ex.**  $X$  Hilbert sur  $\mathbb{R}$   $(\cdot | \cdot)$ .  $f \in X^* \Rightarrow \exists y \in X \mid f(x_n) = (x_n | y)$

$$x_n \xrightarrow{\text{faible}} x \Leftrightarrow (x_n | y) \rightarrow (x | y) \quad \forall y \in X. \quad x_n \xrightarrow{\text{febi}} x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{\text{faible}} x \oplus \limsup_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \leq \|x\|.$$

On a toujours :  $x_n \xrightarrow{\text{faible}} x \Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \geq \|x\|$  La fondamentale  $F(x) = \frac{1}{2} \|x\|^2 - f(x)$  est C s.c.i. pour tout  $f \in X^*$ .

**Rappel.** Dans un Banach réflexif pour tout  $R > 0$ ,  $\{x \in X \mid \|x\| \leq R\}$  est faiblement-compact. De toute suite bornée  $(x_n)$  on peut extraire une sous-suite  $(x_{n_k})$  telle que il existe  $x \in X$  tel que  $x_{n_k} \xrightarrow{\text{faible}} x$  qd  $k \rightarrow \infty$ .

**Exercice 1.**  $X$  Hilbert  $\{e_n, n \in \mathbb{N}\}$  borne orthonormale  $\|e_n\| = 1$ .

$$\forall y \in X (e_n | y) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (y | e_n) = 0 \quad \forall y \in E_{e_n} \rightarrow 0 \text{ faiblement.}$$

**Exercice 2.**  $X = L^2(0, 1)$   $f_n(x) = \sin(2\pi nx)$

$$(f_n|g) = \int_0^1 f_n(x)g(x) \, dx \rightarrow \int_0^1 fg$$

$$|\int_0^1 g(x) \sin(2\pi nx) \, dx| = |\int_0^1 g'(x) \frac{\cos(2\pi nx)}{2\pi n} \, dx| \leq \frac{C}{2\pi n} \rightarrow 0.$$

$$\int_0^1 g(x) \sin(2\pi nx) \, dx = \frac{1}{2} \cdot \|f_n\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$L^p(\Omega) \quad \Omega \subset \mathbb{R}^N \quad u \in L^p(\Omega) \Leftrightarrow \int_{\Omega} |u|^p \, dx < +\infty. \quad \|u\|_{L^p} = (\int_{\Omega} |u|^p \, dx)^{\frac{1}{p}} \quad p \in [1, +\infty[.$$

$$L^{\infty}(\Omega) = \{u : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists k \mid |u(x)| \leq k\} \quad \|u\|_{L^{\infty}(\Omega)} = \inf\{k \mid |u(x)| \leq k \text{ p.p.}\}$$

Si  $\Omega$  est borné dans  $\mathbb{R}^N$   $L^p(\Omega) \subset L^q(\Omega)$  si  $1 \leq q \leq p \leq +\infty$ .  $u \in L^{\infty}(\Omega) \Rightarrow \|u\|_{L^{\infty}(\Omega)} = \lim_{q \rightarrow \infty} \|u\|_{L^q(\Omega)}$

$L^p(\Omega)$  est Banach séparable  $\forall p \in [1, +\infty]$ .  $L^p(\Omega)$  réflexif  $\Leftrightarrow 1 < p < +\infty$ .

$(L^p(\Omega))^* \sim L^{p'}(\Omega)$  si  $p \in [1, +\infty[$  et  $p' = \frac{p}{p-1}$  ( $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ );  $p' = \infty$  si  $p = 1$ .

$l \in (L^p(\Omega))^* \Rightarrow \exists g \in L^{p'}(\Omega) \mid l(f) = \int_{\Omega} fg \, dx \quad \forall f \in L^p(\Omega), (L^p(\Omega))^{**} \sim (L^{p'})^* \sim L^p(\Omega)$   
si  $1 < p < +\infty$ .

$L^1(\Omega)$  n'est pas réflexif  $\Omega = \mathbb{R}$   $u_n(x) = \begin{cases} n & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \|u_n\|_{L^1(\mathbb{R})} = 1. \quad u_n \rightarrow u$

faiblement dans  $L^1(\mathbb{R})$  si (définition)  $\forall v \in L^{\infty} \quad \int_0^1 u_n v \, dx \rightarrow \int_0^1 uv \, dx$ . Soit  $v$  continue sur  $[0, 1]$ .

$\int_0^1 u_n v \, dx = n \int_0^{\frac{1}{n}} v(x) \, dx$ . Donc  $\int_0^1 u_n v \, dx \rightarrow v(0)$ .  $\langle \delta_0, v \rangle = v(0)$ . Si  $u$  existe, on doit avoir  $u(0) = \int uv \, dx$ .

2eme cas important.  $X$  est le dual d'un espace de Banach séparable  $Y$ .  $X = Y^*$  (ex.  $X = L^{\infty}(\Omega), Y = L^1(\Omega)$ )(ex.  $X = M_b(\mathbb{R}), Y = C_0(\mathbb{R})$ )

On choisit pour  $C$  la topologie \*-faible Soit  $(f_n)$  suite dans  $X^*$ .

**Définition 3.**  $f_n \xrightarrow{*} f \Leftrightarrow \forall x \in X \quad f_n(x) \rightarrow f(x)$ .

**Théorème 5.**  $\|f_n\|_{X^*} \leq M \quad \forall n \Rightarrow \exists f_{n_k}, \exists f \in X \text{ tel que } f_{n_k} \xrightarrow{*} f$ .

**Exemple 1.** Soit  $(u_n)$  une suite dans  $L^{\infty}(\Omega)$  ( $\Omega$  ouvert de  $\mathbb{R}^N$ ). Telle que  $|u_n(x)| \leq M$  p.p.  $x \in \Omega, \forall n \in \mathbb{N}$ . Alors  $\exists u \in L^{\infty}(\Omega), \exists u_{n_k} \mid \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_{n_k} v \, dx = \int_{\Omega} uv \, dx \quad \forall v \in L^1(\Omega)$ .

**Exemple 2.** Soit  $(\psi_n)$  une suite de mesures positives bornées sur  $[0, 1]$ . Alors  $\exists \psi$  mesure bornée sur  $[0, 1]$  telle que  $\int_0^1 \varphi \, d\psi \rightarrow \int_0^1 \varphi \, d\psi \quad \forall \varphi$  continue sur  $[0, 1]$   $\psi_n = f_n \, dx \quad \psi = \delta_0$

$$\psi_n \xrightarrow{*} \delta_0, \psi$$