

IMAT

Analyse dp

Application mécanique, optimisation probabilités, géométrie algébrique, codage orthographique, informatique. Numérique.

imath.fr

Buchitte Guy, google scholar

1. Principes généraux en optimisation 2. Analyse convexe 3. Problèmes en dualité (en dimension infinie) 4. Application en transport optimal

Problèmes du calcul des variations.

# Chapitre 1

## Principes généraux en optimisation

### 1.1 initiation

On considère des problèmes du type :  $\inf\{F(u)|u \in X\}$ , où  $X$ —espace vectoriel (Banach de dimension infinie)  $F : u \in X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$

- Existence d'un minimisation
- Unicité?
- Conditions d'optimalisés

Nécessaire ou suffisante ou des deux. Si  $\text{dom } F \neq \emptyset$ .

*Remarque.* Il existe une suite  $(u_n)$  dans  $X$  telle que  $\lim_{n \rightarrow \infty} F(u_n) = \inf_X F$

**Notations 1.1.1.**  $\text{dom } F = \{u \in X | F(u) < +\infty\}$ .

Si  $\text{dom } F \neq \emptyset \implies \inf F < +\infty$ .  $\forall \alpha > \inf_X F \exists u \in X$  tel que  $\inf_X F \leq F(u) < \alpha$ .  $(u_n)$  est une suite minimisante.

### 1.2 Cas $X = \mathbb{R}^N$

Soit  $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  continue et  $C$  une partie fermée, non vide de  $\mathbb{R}^N$ .

**Théorème 1.**  $f$  atteint son minimum sur  $C$  sous l'une des conditions suivantes :

- (i)  $C$  est bornée
- (ii)  $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) \leq +\infty$  (coercitive)

*Démonstration.* Soit  $(x_n)$  une suite minimalé i.e.  $x_n \in C$  et  $f(x_n) \rightarrow \alpha := \inf_X f$ .

Cas i)  $x_n \in C$  compact  $\implies \exists x_{n_k}, \exists \bar{x} | x_{n_k} \rightarrow \bar{x}$ . Alors  $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\bar{x})$  par continuité de  $f$  au pt  $\bar{x}$

Cas ii) Soit  $\beta > \alpha$ . Puisque  $f(x) \rightarrow +\infty$  qd  $n\|x\| \rightarrow \infty : \exists R > 0 | f(x) > \beta \text{ si } \|x\| \geq R$ . D'autre part  $\exists N | \forall n \geq N f(x_n) \leq \beta$ . Donc on a  $\|x_n\| \leq R \forall n \geq N$  et la suite  $(x_n)$  est bornée. Donc  $\exists x_{n_k}, \exists \bar{x} \in \mathbb{R}^N | x_{n_k} \rightarrow \bar{x}$ .  $x_{n_k} \in C$  fermé et  $x_{n_k} \rightarrow \bar{x} \implies \bar{x} \in C$ . donc on a :  $\bar{x} \in C$  et  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \alpha = \inf_C f$  Bien on a :  $F : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$   $\square$

$F(x) = f(x)$  si  $x \in C$  et  $+\infty$  sinon,  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $\inf_C f = \inf_X F$ .

*Remarque.* Ici  $F$  n'est pas continue mais dans les cas i) et ii), on a  $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} F(x) = +\infty$ . En optimisation  $f$  s'appelle le critère et  $C$  est la contrainte.  $F = f + \delta_C$ . Où  $\delta_C = 0$  si  $x \in C$  et  $+\infty$  sinon.

Mais  $F$  vérifie la propriété  $x_n \rightarrow x \implies \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n) \geq F(x)$  ( $\liminf_{n \rightarrow \infty} F(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) + \delta_C(x_n)] \geq \underbrace{\liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)}_{f(x)} + \underbrace{\liminf_{n \rightarrow \infty} \delta_C(x_n)}_{\geq \delta_C(x)} \stackrel{?}{\geq} \delta_C(x)$ ).

1er cas  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \delta_C(x_n) < +\infty$ .  $\forall N \exists n > N \ x_n \in C \implies \exists x_{n_k} | x_{n_k} \in C \forall k \implies x \in C$  ( $C$  est fermé)  $\implies \delta_C(x) = 0$ . 2me cas  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \delta_C(x_n) = +\infty$  trivial.

Autre preuve.  $x \in C$ —trivial;  $x \notin C \implies \exists N | x_n \notin C \ \forall n \geq N \implies \delta_C(x_n) = +\infty \ \forall n \geq N$ .

**Définition 1.**  $F : (X, d) \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  espace métrique est SEMI-CONTINUE INFÉRIEURE au point  $x \in X$  si  $\forall \alpha < F(x) \ \exists R > 0 \mid d(x, y) < R \implies F(y) > \alpha$  (ou bien  $\exists V$  ouvert contenant  $x$  tel que  $\inf_V F > \alpha$ )

**Définition 2.**  $F$  est f.c.i sur  $X$  (f.s.c.—FERMER SEMI-CONTINUONS) si  $F$  est s.c.i. en tout point  $x \in X$ .

**Lemme 1.**  $F$  est s.c.i. sur  $X$  si et seulement si l'une des conditions suivantes est vérifié :

- $\forall R \in \mathbb{R} | \{F \leq R\}$  est un fermé de  $X$  ( $\{F \leq R\} = \{x \in X | F(x) \leq R\}$ )
- L'ensemble  $\text{epi } F = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} | F(x) \leq \alpha\}$  est fermé dans  $X \times \mathbb{R}$ .
- On a pour toute suite  $(u_n)$  dans  $X$   $u_n \rightarrow u \implies \liminf_{n \rightarrow \infty} F(u_n) \geq F(u)$

$$X = \mathbb{R} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \neq 0 \\ -1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\text{epi } F = \{(x, \alpha), F(x) \leq \alpha\}. \quad F_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0 \text{ ou } x \geq \frac{1}{n} \\ 1 - n|x|, & \text{si } 0 \leq |x| \leq \frac{1}{n} \end{cases}$$

**Théorème 2.** Soit  $F : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  où  $X$  est un e.v.n. local compact;  $F$  s.c.i. et coercive alors  $F$  atteint son minimum et l'ensemble ses solutions  $\text{Argmin } F = \{u \in X | F(u) = \inf F\}$  est un compact non vide.

*Démonstration.* Soit  $\alpha_n$  une suite de réels telle que :  $\alpha_{n+1} \leq \alpha_n$ .  $\alpha_n \rightarrow \inf_X F$ . Posons  $K_n = \{u \in X | F(u) \leq \alpha_n\}$ . On a :

- $K_n \neq \emptyset$  (car  $\alpha_n > \inf F$ )
- $K_{n+1} \subset K_n$  (car  $\alpha_{n+1} < \alpha_n$ )
- $K_n$  fermé (car  $F$  est s.c.i.)

Posons  $K = \bigcap_{n=1}^{+\infty} K_n$ . Si  $\lim_{\|u\| \rightarrow +\infty} F(u) = +\infty$ , alors  $\exists R > 0$ .  $K_n \subset \{\|u\| \leq R\}$  (c'est compact de  $X$ )  $\forall n$ . (car  $\exists R > 0 | \|u\| > r \implies F(u) > \alpha_n \forall n$ ) ( $K_n$ ) et une suite  $\searrow$  de compacts non vides :  $K_n$  est fermé borné Donc  $K = \bigcap K_n$  est donc un compact non vide. Or  $K = \{u \in X | F(u) \leq \alpha_n \forall n\} = \{u \in X | F(u) \leq \inf_X F\} = \text{Argmin } F$ .  $\square$

**Problème 1.2.1.**  $X$  Banach  $\dim X = +\infty \implies X$  non local compact; Idée : utiliser une topologie  $G$  plus faible que la topologie de la norme et telle que :

- $F$  est  $G$  s.c.i. et  $\forall \alpha | \{F \leq \alpha\}$  est  $G$ -compact.

# 1.3 Cas où $X$ est un Hilbert

*Rappel.*  $X$  Hilbert avec produit scalaire  $(u|v)$   $\|u\| = \sqrt{(u|u)}$ . Soit  $C$  convexe fermé non vide de  $X$ ;  $x \in X$   $f : y \in C \rightarrow \|x - y\|$ ;  $\inf_{y \in C} \|x - y\| = d(x, C)$  distance de  $x$  à  $C$ .

**Théorème 1.**  $\exists! x^* \in C$  tel que  $\|x - x^*\| = d(x, C) = \inf_{y \in C} \|x - y\|$ . (ici  $F(y) = \|x - y\| + \delta_C(y)$ ).

*Remarque.*  $F$  est s.c.i. et coercive. ( $\lim_{\|y\| \rightarrow +\infty} \|x - y\| = +\infty$ ) mais  $X$  n'est pas local compact.

*Démonstration.* Soit  $(y_n)$  une suite dans  $C$  telle que  $\|x - y_n\| \rightarrow \alpha = d(x, C)$ . Alors on montre que  $(y_n)$  est une suite de Cauchy en utilisant :  $\|a - b\|^2 + \|a + b\|^2 = 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2$   
 $a = \frac{x - y_n}{2}$ ,  $b = \frac{x - y_m}{2}$ . donc  $\frac{\|y_n - y_m\|^2}{4} + \|x - \frac{y_n + y_m}{2}\|^2 = \frac{\|x - y_n\|^2}{2} + \frac{\|x - y_m\|^2}{2} \rightarrow \alpha^2$  ( $C$  convexe  $\frac{y_n + y_m}{2} \in C$  et  $\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\| \geq \alpha$ )  $\square$

$x_1^*, x_2^*$  solutions  $\implies x_1^* + x_2^*/2$  solution.  $0 \leq \|x - \frac{x_1^* + x_2^*}{2}\| \leq \frac{1}{2}\|x - x_1^*\| + \frac{1}{2}\|x - x_2^*\| < \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\alpha$

$x^*$  est solution  $\iff \operatorname{Re}((x^* - x|x^* - y)) \leq 0 \ \forall y \in C$ .  $X$  espace de Hilbert sur  $\mathbb{R}$ ,  $a(u, v)$  forme bilinéaire symétrique :  $(a(u, v) = a(v, u))$ . Telle que

- $|a(u, v)| \leq C\|u\|\|v\|$  (continuité)  $\forall (a, v) \in X \times X$
- $\exists k > 0$   $a(u, u) \geq k\|u\|^2 \ \forall u \in X$
- $f$  une forme linéaire continue sur  $X$  ( $f \in X^*$ ) (notation  $\langle f, u \rangle$  au lieu de  $f(u)$ ).

**Théorème 2** (Lax-Milgram).  $\exists! u \in X$  tel que  $a(u, v) = \langle f, v \rangle \ \forall v \in X$ . De plus, si on pose  $F(u) = \frac{1}{2}a(u, u) - \langle f, u \rangle$ , on a :  $F(u) \leq F(v) \ \forall v \in X$  (i.e.  $F(u) = \min_X F$ ) et  $u$  est l'unique minimiser de  $F$ .

*Remarque.*  $F$  est continue d'après i) (exo)  $\lim_{\|u\| \rightarrow \infty} F(u) = +\infty$  d'après (ii) (exo)  $(F(u) \geq k\|u\|^2 - \langle f, u \rangle \geq k\|u\|_X^2 - \|f\|_{X^*}\|u\|_X)$   $F$  est convexe.

**Corollaire 1** (Stampacchia). Soit  $C$  un convexe fermé de  $X$  et  $E(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle$  (qui est convexe, continue, convexe sur  $X$ ) ( $F(v) = E(v) + \delta_C(v)$ ). Alors  $\exists! u \in C$  tel que  $E(u) = \inf_{v \in C} E(v)$   $u$  est caractérisée par l'inéquation :  $a(u, v - u) \geq \langle f, v - u \rangle \ \forall v \in C$ .

*Remarque.* On prenant  $C = X$ , on retrouve Lax-Milgram car  $a(u, w) \geq \langle f, w \rangle \ \forall w \in X$  ( $w = v - u$ )  $\implies a(u, w) = \langle f, w \rangle$ .

$$a : X \times X \rightarrow \mathbb{R} \ f \in X^* \ \begin{cases} a(u, v) \leq M\|u\|\|v\| \\ a(u, v) \geq k\|u\|^2 \end{cases}$$

$\inf_{u \in C} \{\frac{1}{2}a(u, u) - \langle f, u \rangle\}$   $C$  convexe fermé de  $X$ .

$\exists! \bar{u} \in C$  tel que  $\frac{1}{2}a(\bar{u}, \bar{u}) - \langle f, \bar{u} \rangle \leq \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle \ \forall v \in C$ . Alors  $a(\bar{u}, v - \bar{u}) \geq \langle f, v - \bar{u} \rangle \ \forall v \in C$ .

*Remarque.* La fonctionnelle  $F(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle$  est continue sur  $X$  (exo). Elle est convexe (même strictement convexe). Elle es coercive car  $F(v) \geq \frac{k}{2}\|v\|_X^2 - \|f\|_{X^*}\|v\|_X \implies \lim_{\|v\| \rightarrow +\infty} F(v) = +\infty$ . Si  $(u_n)$  est une suite minimisante sur  $C$ , alors  $(u_n)$  est bornée dans  $X$ . Mais on ne peut pas extraire une sous suite  $(u_{n_k})$  telle que  $u_{n_k} \rightarrow u$  dans  $X$  ( $X$  n'est pas loc compact).

*Démonstration.* (argument analogue à celui du Thm de projection dans un Hilbert)

Posons  $(u|v)_a = a(u, v)$ . C'est une forme bilinéaire symétrique positive :  $(u|u)_a \geq k\|u\|^2 > 0$  si  $u \neq 0$ . Donc c'est un produit scalaire sur  $X$ . Norme associée  $\|u\|_a = \sqrt{(u|u)_a}$ .

Les normes  $\|\cdot\|$  et  $\|\cdot\|_a$  sont équivalentes car :  $k\|u\|^2 \leq \|u\|_a^2 \leq M\|u\|^2$ . En particulier  $(X, \|\cdot\|_a)$  est un espace de Hilbert. La forme linéaire.  $L : v \in X \rightarrow \langle f, v \rangle$  est continue dans  $(X, \|\cdot\|_a)$ . D'après Riesz :

$$\exists! u_0 \in X \text{ tel que } (u_0|v)_a = \langle f, v \rangle \forall v \in X.$$

D'après le Thm de projection ( $C$  est un convexe ferme de  $(X, \|\cdot\|)$ ) :

$$\exists! \bar{u} \in C \text{ tel que } \|u_0 - \bar{u}\|_a = \inf_{u \in C} \|u_0 - u\|_a.$$

En particulier, on aura :

$$a(\bar{u} - u_0, \bar{u} - u_0) = \inf_{u \in C} a(v - u_0, v - u_0)$$

Or  $\frac{1}{2}a(v - u_0, v - u_0) = \frac{a(v, v)}{2} - a(v, u_0) + \frac{a(u_0, u_0)}{2} = \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle + \frac{a(u_0, u_0)}{2}$  d'où  $\frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle \geq \frac{1}{2}a(\bar{u}, \bar{u}) - \langle f, \bar{u} \rangle \forall v \in X$ .  $(\frac{1}{2}a(v - u_0, v - u_0) - \frac{a(u_0, u_0)}{2} \geq \frac{a(\bar{u} - u_0, \bar{u} - u_0)}{2})$

En fait on a :  $\bar{u} \in \text{Argmin}_C F \iff \bar{u} = \text{proj}_C u_0$ .

De plus toute suite minimisante  $(u_n)$  vérifie  $\|u_0 - u_n\|_a \rightarrow \inf_{u \in C} \|u_0 - u\|_a$  et donc de Cauchy pour  $\|\cdot\|_a$  (donc aussi  $\|\cdot\|$ )

$\bar{u} \text{ sol} \iff \bar{u} = \text{proj}_C u_0 \iff (u_0 - \bar{u}|u_0 - v)_a \leq 0 \forall v \in C \iff a(u_0 - \bar{u}|v - u_0) \leq 0 \forall v \in C \iff a(\bar{u} - u_0|\bar{u} - v) \leq 0 \forall v \in C \iff a(\bar{u}, \bar{u} - v) \leq a(u_0, \bar{u} - v) \iff a(\bar{u}, v - \bar{u}) \geq a(u_0, v - \bar{u}) \iff a(\bar{u}, v - \bar{u}) \geq \langle f, v - \bar{u} \rangle \forall v \in C.$   $\square$

*Remarque.* Si la contrainte  $C$  est un sous espace vectoriel fermé  $V$  de  $X$  on obtient :

$$\bar{u} \text{ minimise } \frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle \text{ sur } X \iff a(\bar{u}, v) = \langle f, w \rangle \forall w \in V$$

Si  $V = X$  on obtient l'équation  $a(\bar{u}, w) = \langle f, w \rangle \forall w \in X$ .  $(A\bar{u}|w) = \langle f, w \rangle$  où  $A$  opérateur linéaire auto adjacent-continue de  $X$  dans  $X$ .  $\implies A\bar{u} = f$

*Rappel.*  $A \in s(X)$  ( $A^* = A$ .)  $a(u, v) = (Au|v)$  bilinéaire symétrique  $|a(u, v)| \leq M\|u\|\|v\|$

**Exemple 1.** élémentaire.  $X = \{u \in L^2(0, 1) \mid u' \in L^2(0, 1)\}$   $u \in X \iff u \in L^2(0, 1)$  et  $\exists v \in L^2(0, 1)$  tel que :  $\int_0^1 u \varphi' dx = - \int_0^1 v \varphi dx$

$\forall f \in C^1(0, 1)$  et  $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ .

— si  $u \in C^1$  on trouve  $v = u'$

— si  $u$  est  $C$  continue,  $C^1$  par morceaux  $u = 1$  si  $x < \frac{1}{2}$  et  $-1$  si  $x > \frac{1}{2}$   $\int_0^1 u \varphi' = \int_0^{\frac{1}{2}} u \varphi' + \int_{\frac{1}{2}}^1 u \varphi' = - \int_0^1 v \varphi + (u(\frac{1}{2} + 0) - u(\frac{1}{2} - 0))\varphi(\frac{1}{2})$ .

$(u|v) = \int_0^1 (uv + u'v') dx \quad \|u\|^2 = \int_0^1 (|u|^2 + |u'|^2) dx$ .  $u \in X \implies \exists \bar{u} = u$  pp  $|\bar{u}(x) - \bar{u}(y)| \leq$

$\|u'\|_{L^2(0, 1)} \sqrt{|x - y|} \quad x < y \quad |u(x) - u(y)| = |\int_x^y u'(t) dt| \leq \sqrt{|y - x|} \sqrt{\int_0^1 |u'|^2 dt}$ .  $\inf_{\substack{v \in X \\ v(0) = v(1) = 0}} [\frac{1}{2} \int_0^1 |u'|^2 dx -$

$\int_0^1 f v dx]$ ,  $f \in L^1(0, 1)$ .

Soit  $H = \{u \in X \mid u(0) = u(1) = 0\}$ .  $u_n \xrightarrow{X} u \implies u_n \rightarrow u$  uniformément sur  $[0, 1]$ . C'est un sous espace fermé de  $X$ , donc un Hilbert.

Ici  $a(u, v) = \int_0^1 u'v' dx$

•  $|a(u, v)| \leq \|u'\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \|u\|_H \|v\|_H$

$$\begin{aligned}
& \bullet a(u,u) = \int_0^1 |u'|^2 dx \stackrel{?}{\geq} k \|u\|_H^2. \quad u(x) = u(0) + \int_0^1 u'(t) dt \implies |u(x)| \leq \|u'\|_{L^2} \sqrt{x} \leq \|u'\|_{L^2} \\
& \implies \int_0^1 |u(x)|^2 dx \leq \|u'\|_{L^2}^2 \implies \|u\|_{L^2} \leq \|u'\|_{L^2} \text{ si } u \in H, \text{ Donc } 2 a(u,u) \geq \int_0^1 u'^2 dx + \int_0^1 u^2 dx = \|u\|_H^2. \\
& a(u,u) \geq \frac{1}{2} \|u\|_H^2 \\
& \text{Lax Milgram} \implies \exists! u \in H \mid \frac{1}{2} u'^2 - \int_0^1 f u' dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |v'|^2 - \int_0^1 f v dx \forall v \in H. \\
& \text{Conclusion de la schuhcnu } a(u,v) = \langle f, v \rangle \forall v \in H \int_0^1 u' v' dx = \int_0^1 f v dx, \forall v \in H (u(0) = v(1) = 0). \\
& \text{Supposons que la sol } u \text{ est 2 fois dérivable sur } ]0,1[ \int_0^1 u' v' dx = [u'v]_0^1 - \int_0^1 u'' v dx \implies \\
& - \int_0^1 u'' v dx = \int_0^1 f x dx \forall v \in H \iff -u'' = f \\
& \text{Ainsi} \quad \begin{cases} -u'' = f \text{ sur } ]0,1[ \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Posons } f(x) = \int_0^1 x f(t) dt \quad -u' = F(x) + \lambda. \quad u(0) = u(1) = 0 \implies \int_0^1 u'(t) dt = 0 \implies \\
& \lambda = - \int_0^1 F(x) dx. \quad u(x) = u(0) + \int_0^x u'(t) dt \implies u(x) = x \int_0^1 F(t) dt - \int_0^x F(t) dt.
\end{aligned}$$

## 1.4 Cas où $X$ est un Banach (non Hilbert)

On considère une topologie  $C$  sur  $X$  telle que  $\forall R \{u \in X \mid \|u\| \leq R\}$  est  $C$ -compact.  
*Rappel.*  $C$  est plus faible que la topologie associée à la norme.

### 1.4.1 Cas Importantes

$$\begin{aligned}
& \text{— } X \text{ est un Banach réflexif } (X^{**} = X) \quad x \in X \rightarrow \hat{x} \in X^{**} \text{ ou } \hat{x}(f) = f(x) \forall f \in X^* \\
& (\text{évaluation de } f \text{ au point } x) \quad \|\hat{x}\|_{X^{**}} = \sup_{\|f\|_{X^*} \leq 1} \hat{x}(f) = \sup_{\|f\|_{X^*} \leq 1} f(x) = \|x\|_X. \\
& \text{L'application } x \in X \rightarrow \hat{x} \in X^{**} \text{ est une isométrie.} \\
& C = \text{topologie faible de } X. \quad x_n \xrightarrow{\text{faible}} x \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall f \in X^* f(x_n) \rightarrow f(x) \\
& \text{Ex. } X \text{ Hilbert sur } \mathbb{R} (\cdot | \cdot). \quad f \in X^* \implies \exists y \in X \mid f(x_n) = (x_n | y) \\
& x_n \xrightarrow{\text{faible}} x \iff (x_n | y) \rightarrow (x | y) \quad \forall y \in X. \quad x_n \xrightarrow{\text{febi}} x \iff x_n \xrightarrow{\text{faible}} x \oplus \limsup_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \leq \|x\|. \\
& \text{On a toujours : } x_n \xrightarrow{\text{faible}} x \implies \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \geq \|x\| \text{ La fondamentale } F(x) = \frac{1}{2} \|x\|^2 - f(x) \text{ est C s.c.i. pour tout } f \in X^*.
\end{aligned}$$

*Rappel.* Dans un Banach réflexif pour tout  $R > 0$ ,  $\{x \in X \mid \|x\| \leq R\}$  est faiblement-compact. De toute suite bornée  $(x_n)$  on peut extraire une sous-suite  $(x_{n_k})$  telle que il existe  $x \in X$  tel que  $x_{n_k} \xrightarrow{\text{faible}} x$  qd  $k \rightarrow \infty$ .

**Exercice 1.**  $X$  Hilbert  $\{e_n, n \in \mathbb{N}\}$  borne orthonormale  $\|e_n\| = 1$ .  
 $\forall y \in X (e_n | y) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} (y | e_n) = 0 \forall y \in E e_n \rightarrow 0$  faiblement.

$$\begin{aligned}
& \text{Exercice 2. } X = L^2(0,1) \quad f_n(x) = \sin(2\pi n x) \\
& (f_n | g) = \int_0^1 f_n(x) g(x) dx \rightarrow \int_0^1 f g \\
& \left| \int_0^1 g(x) \sin(2\pi n x) dx \right| = \left| \int_0^1 g'(x) \frac{\cos(2\pi n x)}{2\pi n} dx \right| \leq \frac{C}{2\pi n} \rightarrow 0. \\
& \int_0^1 g(x) \sin(2\pi n x) dx = \frac{1}{2} \cdot \|f_n\| = \frac{1}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& L^p(\Omega) \quad \Omega \subset \mathbb{R}^N \quad u \in L^p(\Omega) \iff \int_{\Omega} |u|^p dx < +\infty. \quad \|u\|_{L^p} = (\int_{\Omega} |u|^p dx)^{\frac{1}{p}} \text{ prel } \in [1, +\infty[. \\
& L^\infty(\Omega) = \{u : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \exists k \mid |u(u)| \leq k\} \quad \|u\|_{L^\infty(\Omega)} = \inf\{k \mid |u(x)| \leq k \text{ p.p.}\}
\end{aligned}$$

Sii  $\Omega$  est borne dans  $\mathbb{R}^N$   $L^p(\Omega) \subset L^q(\Omega)$  si  $1 \leq q \leq p \leq +\infty$ .  $u \in L^\infty(\Omega) \implies \|u\|_{L^\infty(\Omega)} = \lim_{q \rightarrow \infty} \|u\|_{L^q(\Omega)}$   
 $L^p(\Omega)$  est Banach séparable  $\forall p \in [1, +\infty]$ .  $L^p(\Omega)$  réflexif  $\iff 1 < p < +\infty$ .  
 $(L^p(\Omega))^* \sim L^{p'}(\Omega)$  si  $p \in [1, +\infty[$  et  $p' = \frac{p}{p-1}$  ( $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ );  $p' = \infty$  si  $p = 1$ .  
 $l \in (L^p(\Omega))^* \implies \exists g \in L^{p'}(\Omega) \mid l(f) = \int_\Omega fg \, dx \, \forall f \in L^p(\Omega)$ ,  $(L^p(\Omega))^{**} \sim (L^{p'}) \sim L^p(\Omega)$  si  $1 < p < +\infty$ .

$L^1(\Omega)$  n'est pas réflexif  $\Omega = \mathbb{R}$   $u_n(x) = \begin{cases} n & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \|u_n\|_{L^1(\mathbb{R})} = 1. \quad u_n \rightarrow u$   
faiblement dans  $L^1(\mathbb{R})$  si (définition)  $\forall v \in L^\infty \quad \int_0^1 u_n v \, dx \rightarrow \int_0^1 uv \, dx$ . Soit  $v$  continue sur  $[0, 1]$ .

$\int_0^1 u_n v \, dx = n \int_0^{\frac{1}{n}} v(x) \, dx$ . Donc  $\int_0^1 u_n v \, dx \rightarrow v(0)$ .  $\langle \delta_0, v \rangle = v(0)$ . Si  $u$  existe, on doit avoir  $u(0) = \int uv \, dx$ .

2eme cas important.  $X$  est le dual d'un espace de Banach séparable  $Y$ .  $X = Y^*$  (ex.  $X = L^\infty(\Omega)$ ,  $Y = L^1(\Omega)$ )(ex.  $X = M_b(\mathbb{R})$ ,  $Y = C_0(\mathbb{R})$ )

On choisit pour  $C$  la topologie \*-faible Soit  $(f_n)$  suite dans  $X^*$ .

**Définition 1.**  $f_n \xrightarrow{*} f \iff \forall x \in X \quad f_n(x) \rightarrow f(x)$ .

**Théorème 1.**  $\|f_n\|_{X^*} \leq M \, \forall n \implies \exists f_{n_k}, \exists f \in X \text{ tel que } f_{n_k} \xrightarrow{*} f$ .

**Exemple 2.** Soit  $(u_n)$  une suite dans  $L^\infty(\Omega)$  ( $\Omega$  ouvert de  $\mathbb{R}^N$ ). Telle que  $|u_n(x)| \leq M$  pp  $x \in \Omega$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ . Alors  $\exists u \in L^\infty(\Omega)$ ,  $\exists u_{n_k} \mid \lim_{k \rightarrow \infty} \int_\Omega u_{n_k} v \, dx = \int_\Omega uv \, dx \, \forall v \in L^1(\Omega)$ .

**Exemple 3.** Soit  $(\psi_n)$  une suite de mesures positives bornées sur  $[0, 1]$ . Alors  $\exists \psi$  mesure borne sur  $[0, 1]$  telle que  $\int_0^1 \varphi \, d\psi \rightarrow \int_0^1 \varphi \, d\psi \, \forall \varphi$  continue sur  $[0, 1]$   $\psi_n = f_n \, dx \, \psi = \delta_0$

$\psi_n \xrightarrow{*} \delta_0, \psi$

$X$  Banach  $G$  faible si  $X$  réflexif et \*-faible si  $X = Y^\perp Y$  Banach séparable. Propriété  $\|u_n\|_X \leq C \implies \exists u \in X \exists u_{n_k} \mid u_{n_k} \xrightarrow{G} u$

Notations :  $\begin{cases} u_n \rightharpoonup u \text{ faible} \\ u_n \xrightarrow{*} u \text{ *-faible} \end{cases}$

**Théorème 2.** Soit  $F : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  telle que :

1.  $F$  est  $G$  s.c.i. (et  $\exists u_0 \in X \quad F(u_0) < +\infty$ )
2.  $\lim_{\|u\| \rightarrow \infty} F(u) = +\infty$

Alors Argmin  $F$  est un  $G$ -compact non vide de  $X$ .

Démonstration. (identique au cas  $X$  local compact) □

Remarque. La propriété i) est souvent difficile à établir même si  $F$  est continue par la topologie forte de  $X$ .

**Exemple 4.**  $X = \{u \in C^0([0, 1]) \mid u(0) = u(1) = 0 \mid u' \in L^2(0, 1)\}$   $I = ]0, 1[ \quad \|u\|_X = \sqrt{\int_0^1 |u|^2 + |u'|^2 \, dx}$  ( ou bien  $\|u\| = (\int_0^1 |u'|^2 \, dx)^{\frac{1}{2}}$ ) ( $|u(x)| \leq \int_0^1 |u'(x)| \, dx \leq \|u'\|_{L^2} \implies \|u\|_{L^2} \leq \|u'\|_{L^2}$ )

$X$  est Hilbert noté  $H_0^1(I)$  (ou bien  $W_0^{1,2}(I)$ )

Choix de  $G$ .  $G$  topologie faible ( $X$  est réflexif) (ou  $G$  topologie associée à la convergence uniforme  $u_n \xrightarrow{G} u$  si  $\sup_I |u_n - u| \rightarrow 0$ )

$$u_n \rightharpoonup u \text{ faiblement} \iff \text{def} \begin{cases} u_n \rightharpoonup u \text{ } L^2\text{-faible} \\ u'_n \rightharpoonup u' \text{ } L^2\text{-faible} \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\text{Rellich}} u_n \rightarrow u \text{ uniformément. } |u_n(x) - u_n(y)| \leq \sqrt{|y-x|} \|u'_n\|_{L^2}$$

**Théorème 3** (Ascoli).  $u_n$  continue sur un compact équicontinue et  $\forall x (u_n(x))$  bornée dans  $\mathbb{R} \implies \exists u_{nk}, \exists u$  continue /  $u_{nk} \rightarrow u$  uniformément.

$$\inf_{u \in X} F(u) = \int_0^1 |1 - u'^2| dx + \int_0^1 u^2 dx$$

• On a bien que  $\lim_{\|u\|_X \rightarrow +\infty} F(u) = +\infty$

$$\begin{aligned} \int_0^1 |(u')^2 - 1| dx &\geq \int_0^1 |u'|^2 - 1 \\ &\geq \|u\|_X^2 - 1 \end{aligned}$$

•  $F$  est elle faiblement s.c.i. Soit  $\varphi$  une fonction 1-périodique de classe  $C^1$  telle que  $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$  (par exemple  $\varphi(x) = \sin 2\pi x$ ). Soit  $u_n = \frac{1}{n} \varphi(nx)$ . Alors  $u_n(0) = u_n(1) = 0$  ( $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ ).  $u'_n = \varphi'(nx)$   $\int_0^1 |u_n|^2 dx = \frac{1}{n^2} \int_0^1 |\varphi(nx)|^2 dx \leq \frac{C}{n^2}$  où  $C = \sup |\varphi|^2 \implies u_n \rightarrow 0$  uniformément et dans  $L^2(I)$ .

$$\int_0^1 |u'_n|^2 dx = \int_0^1 |\varphi'(nx)|^2 dx = \int_0^1 |\varphi'(y)|^2 dy$$

Donc  $(u_n)$  est bornée dans  $X$ . Soit  $(u_{nk})$  une sous-suite telle que  $u_{nk} \xrightarrow{G} u$  ( $G$ =faible sans  $X$ )

Alors on a  $u = 0$  d'où  $u_n \xrightarrow{G} 0$  ( $u'_n \rightarrow 0$  dans  $L^2(I)$  faible)

**Exemple 5.**  $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  1 périodique  $\int_0^1 |\psi|^2 dx < +\infty$ . Alors  $\psi_n(x) = \psi(nx)$  est une suite bornée dans  $L^2(0,1)$  et bornée dans  $L^1(0,1)$  et  $\psi_n \rightarrow c$  faiblement dans  $L^2(0,1)$  où  $c = \int_0^1 \psi(y) dy$ . En particulier si  $\psi = \varphi'$  où  $\varphi$  est 1-périodique, on a  $\psi_n \rightarrow 0$  car  $\int_0^1 \psi(y) dy = \int_0^1 \varphi'(y) dy = \varphi(1) - \varphi(0) = 0$ . Conclusion  $u_n \rightarrow 0$  faiblement dans  $X$ . Calculons :

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} F(u_n) &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |1 - (u'_n)^2|^2 dx \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |1 - \varphi^2| dy \end{aligned}$$

$$F(0) = \int_0^1 |1 - 0|^2 dx = 1$$

Si  $F$  était  $G$  s.c.i., on aurait :  $\int_0^1 |1 - (\varphi')^2| dx \geq 1$ .  $\forall \varphi$  1-périodique avec  $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ . Impossible (prendre  $\varphi = \frac{1}{2} - |\frac{1}{2} - x|$ ).

$$\bullet \inf_{u \in X} F(u) = 0$$

$u_n = \frac{1}{n} \varphi(nx)$  où  $\varphi(x) = x$  si  $x < \frac{1}{2}$  et  $1 - x$  si  $x > \frac{1}{2}$  sur la période  $[0,1]$

Alors  $F(u_n) \rightarrow 0$  qd  $n \rightarrow \infty$  car  $\int_0^1 |1 - |u'_n|| dx = 0$  et  $\int u_n^2 \rightarrow 0$ .

Puisque  $F \geq 0$ , on a donc  $\inf_X F = 0$ . L'infimum n'est pas atteint car  $F(u) = 0 \implies \int_0^1 |1 - u'^2| dx + \int_0^1 |u|^2 dx = 0 \implies u = 0$  pp et  $u' = \pm 1$  pp impossible. Donc  $F(u) > 0 \forall u \in X$ .

Raidon Théorique

**Exemple 6.**  $X = H_0^1(0,1)$   $F(u) = \frac{1}{2} \int_0^1 |u'|^2 + \int_0^1 g(u) dx$  où  $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty]$  est s.c.i.

$$G = \text{topologie faible de } X \quad (u_n \xrightarrow{G} u \implies \begin{cases} u'_n \rightharpoonup u' \text{ faible } L^2(0,1) \\ u_n \rightarrow u \text{ uniformément} \end{cases})$$

où  $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty]$  est s.c.i.

Alors  $F$  vérifie :



i  $G$  s.c.i.

ii  $\lim_{\|u\| \rightarrow +\infty} F(u) = +\infty$  ( $F(u) \geq \frac{1}{2} \|u'\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{4} \|u\|_X^2$ )

Soit  $u_n \xrightarrow{G} u$ . Alors  $u'_n \rightarrow u'$  faible  $\implies \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |u'_n|^2 \geq \int_0^1 |u'|$ . ( $\liminf \|u'_n\| \geq \|u'\|$ )  
 $\implies \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g(u_n) dx \geq \int_0^1 (\liminf_n (g(u_n))) dx \geq \int g(x) dx$  (car  $\liminf_{n \rightarrow \infty} g(u_n) \geq g(u)$ ).

**Exemple 7.**  $\Omega$  ouvert convexe et fermé de  $\mathbb{R}^d$

$k(x)$  continue :  $\bar{\Omega} \rightarrow ]0, +\infty[$ . Soit  $a, b \in \Omega$ .  $\sup\{u(b) - u(a) \mid u \in Lip(\Omega) \mid \nabla u(x) \overset{pp}{\leq} k(x) \text{ sur } \Omega\} := M_{k,\Omega}(a, b)$

Soit  $\gamma(t) : [0, 1] \rightarrow \Omega \mid \gamma(0) = a, \gamma(1) = b$

$$\begin{aligned} u(b) - u(a) &= u(\gamma(1)) - u(\gamma(0)) = u(\gamma(t))|_0^1 = \int_0^1 (u \circ \gamma)'(t) dt \\ &= \int_0^1 \nabla u(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \\ &\leq \int_0^1 k(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt \\ &\leq C \int_0^1 |\gamma'(t)| dt \\ &\leq CL(\gamma) \end{aligned}$$

où  $C = \sup_{\bar{\Omega}} k(x)$

$L(\gamma)$  = longueur de la courbe

Donc  $M_{k,\Omega}(a, b) < +\infty$  s'il existe une courbe de longueur finie joignant  $a$  à  $b$ .

On considère  $X = Lip(\Omega) = \{u \text{ continue}, u(b) = 0 \mid \nabla u \in L^\infty(\Omega)\}$

$F : u \in X \rightarrow \begin{cases} u(a) \text{ si } |\nabla u| \leq k|x| \text{ et } u(b) = 0 \\ +\infty \text{ sinon} \end{cases}$

$\inf_X F(u) = \inf\{u(a) \mid |\nabla u| \leq k \text{ pp sur } \Omega, u(b) = 0\} = -M_{k,\Omega}(a, b)$

$\|u\|_X \stackrel{\text{def}}{=} \|\nabla u\|_{L^\infty(\Omega)}$

(si  $\nabla u = 0$  pp  $\implies u = \text{const} \implies u = 0$  (car  $u(b) = 0$ ))

Choix de  $G$

$\|u_n\|_X \leq C \implies \|\nabla u_n\|_{L^\infty} \leq CL^\infty(\Omega) = (L^1(\Omega))^*$

Alors  $\forall x, |u_n(x) - u_n(y)| \leq C|x - y|$  pour  $y$  racine de  $x$

$\implies (u_n)$  est équicontinue au point  $x$

$u_n(b) = 0 \implies |u_n(x)| \leq CL(\gamma)$  où  $\varphi$  est une courbe joignant  $b$  au point  $x$ .

Alors d'après Ascoli :  $\exists u_{uk} \exists u$  continue  $\mid u_{uk} \rightarrow u$  uniformément sur  $\bar{\Omega}$   $\|\nabla u_{nk}\|_{L^\infty} \leq M$

$\implies \nabla u_{nk} \xrightarrow{*} u$  dans  $L^\infty(\Omega)$  faible.

$G =$  converge uniforme sur  $\bar{\Omega}$ .

1.  $F(u) < +\infty \implies \|u\|_X \leq \sup_{\Omega} k = M \implies \lim_{\|u\| \rightarrow \infty} F(u) = +\infty$

2.  $F$  est  $G$  s.c.i.

Soit  $(u_n)$  une suite telle que  $u_n \rightarrow u$  uniformément et telle que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} F(u_n) < +\infty$

Il faut montrer que  $\liminf F(u_n) \geq F(u)$ . Quitte à extraire une sous suite, on peut supposer que  $\liminf_n F(u_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(u_n)$ . Alors  $F(u_n)$  est majoré pour  $n$  assez grand et donc  $\sup_n \|u_n\|_X < +\infty$ . Donc on a  $u_n \rightarrow u$  uniformément  $|\nabla u_n| \leq M$ .

On a donc  $u_n(a) \rightarrow u(a)$ . Montrons que  $u \in X$  et  $|\nabla u(x)| \leq k(x)$  pp sur  $\Omega$ .

On sait que  $\nabla u_n \xrightarrow{*} \nabla u$  dans  $L^\infty(\Omega)$

$\implies \int_{\Omega} \nabla u_n \cdot v(x) \rightarrow \int_{\Omega} \nabla u(x) v(x)$

$\forall v \in (L^1(\Omega))^d$   $v(x) = z \mathbf{1}_{B(x_0, \varepsilon)}$   $z \in \mathbb{R}^2$

$\bullet B(x_0, \varepsilon)$  boule centre dans  $\Omega \implies \int_{B(x_0, \varepsilon)} (\nabla u_n(x), z) \rightarrow \int_{B(x_0, \varepsilon)} \nabla u(x), z$

$$|\int_{B(x_0, \varepsilon)} \nabla u_n(x) z| \leq \int_{B(x_0, \varepsilon)} \nabla |u_n(x)| |z| dx \leq (\int_{B(x_0, \varepsilon)} k(x) dx) |z|$$

$$\text{d'où qd } n \rightarrow \infty \quad |\int_{B(x_0, \varepsilon)} \nabla u(x) z| \leq (\int_{B(x, \varepsilon)} k(x)) |z|$$

$$\implies \frac{1}{B(x_0, \varepsilon)} |\int_{B(x_0, \varepsilon)} \nabla u_n(x) z dx| \leq \frac{1}{B(x_0, \varepsilon)} |\int_{B(x_0, \varepsilon)} k(x) dx| |z|$$

$$\text{D'après le Thm des points de Lebesgue pp } x_0 \in \Omega \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{B(x_0, \varepsilon)} \int_{B(x_0, \varepsilon)} \nabla u(x) z = \nabla u(x_0) z$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{B} \int_{B(x_0, \varepsilon)} k(x) dx = k(x_0)$$

$$\nabla u(x_0) z \leq k(x_0) z \quad \forall z \in \mathbb{R}^d \text{ pp } x_0 \in \Omega \implies |\nabla u(x_0)| \leq k(x_0) \text{ pp } x_0 \in \Omega$$

$$\text{Conclusion } u_n(a) \rightarrow u(a) \quad u_n(b) \quad \forall x \implies u(b) = 0 \quad |\nabla u| \leq k(x) \text{ pp } x \in \Omega$$

$$\text{Donc } u \in X, \text{ avec } |\nabla u| \leq k \text{ pp et } F(u) = u(a).$$

*Rappel.*  $F(u_n) = u_n(a)$ . Donc  $F(u_n) \rightarrow F(u)$   $F(u_n) \rightarrow \alpha$ ,  $\alpha < +\infty$   $u_n \rightarrow u$  uniformément  $\alpha = F(u)$

Ainsi  $F$  est  $G$  s.c.i. d'où existence d'une solution  $u \in X$ . On a :  $M_{k, \Omega}(a, b) = \sup\{u(b) - u(a) \mid |\nabla u| \leq k \text{ sur } \Omega\} = \inf\{\int_0^1 k(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt, \gamma \in Lip(0, 1, \Omega) \mid \gamma(0) = a \quad \gamma(1) = b\}$

On a déjà vu que  $u(b) - u(a) \leq \int_0^1 k(\gamma) |\gamma'(a)|$  si  $u \in X$  et  $\gamma \in Lip([0, 1], \Omega)$   $\gamma(0) = a$  et  $\gamma(1) = b \implies M_{\Omega, k}(a, b) \leq \inf\{\int_0^1 k(\gamma) |\gamma'| dt, \gamma(0) = a \quad \gamma(1) = b\}$ —distance géodésique.

$$\text{Posons } \bar{U}(x) = -\inf\{\int_0^1 k(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt \mid \gamma(0) = x \quad \gamma(1) = b\}$$

$$\text{Alors } \bar{u}(b) = 0 \quad -\bar{u}(a) = d_{\Omega, k}(a, b) \text{—distance géodésique entre } a \text{ et } b.$$

$$\text{Si } |\nabla \bar{u}| \leq k(x) \text{ pp sur } \Omega, \text{ alors}$$

$$M_{\Omega, k}(a, b) \geq -\bar{u}(a) = d_{\Omega, k}(a, b)$$

$$z \nabla \bar{u}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\bar{u}(x+tz) - \bar{u}(x)}{t}$$

$$|\bar{u}(x+tz) - \bar{u}(x)| \leq \int_0^t k(x+tz) |z| dz \implies \nabla \bar{u}(x) z \leq k(x) |z|$$

$$k(x) = k_1, k(x) = k_2$$

$$k_1 |c - a| + k_2 |b - c|$$

# Chapitre 2

# Analyse Convexe

$E$  espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$

## 2.1 Ensembles et fonctions convexes

$x, y \in E$  Notation  $[x, y] = \{x + tx + ty|t \in [0, 1]\}$   $]x, y[ = \{x + tx + ty|t \in ]0, 1[$   
 $[x, y[ = \{x + tx + ty|t \in [0, 1[$

**Définition 1.** ACE convexe si :  $\forall (x, y) \in A \times A [x, y] \subset A$

*Remarque.* A convexe  $\implies \frac{x+y}{2} \in A \forall (x, y) \in A \Leftarrow$  vrai si A est fermé ponne topologie  $G(\mathbb{R}^d)$  telle que  $t \rightarrow (1 - t) + ty(x, y \in E)$  conime de  $\mathbb{R}$  dans  $E$ .

*Remarque* (indication).  $D = \{t \in [0, 1]|(1 - t)x + y \in A\}$  D est fermé  $D \supset \{0, \frac{1}{2}, 1\} \implies D \supset \{\frac{k}{2^n}, 0 \leq k \leq 2^n\}$

Si  $E$  est un e.v.n. ( $G$  associée à la norme de  $E$ ) alors

**Lemme 1.** A convexe de E tel que  $\neq \emptyset$ . Alors  $x \in , y \in \implies [x, y[ \supset .$  De plus :  $\bar{\phantom{x}} = A$  et est convexe.

**Théorème 1** (properties). —  $(A_i)_{i \in I}$  famille de convexes  $\implies \cup_{i \in I} A_i$  est un convexe.  
 — A convexe  $\implies \begin{cases} \text{convexe} \\ A\text{convexe} \end{cases}$

**Définition 2.**  $co(A)$  enveloppe convexe de  $A = \cup_{\substack{B\text{convex} \\ B \supset A}} B$  plus petit convexe contenant A.  $\overline{co}(A) = \{\cup B|B\text{convexe ferm} B \supset A\} = co(A)$ .

Si  $\dim E < \infty$  ( $E = \mathbb{R}^N$ ) Carateodory.

A fermé  $\subset E$ .  $\overset{co(A)}{=} \{\sum_{i=1}^{N+1} \lambda_i x_i | \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{N+1} \lambda_i = 0 \ x_i \in A\}$  compinaison convexe des vecteurs  $x_1, \dots, x_{N+1}$ .

$N = 2, A = a, b, c \ \forall x \in co(A) \exists ! \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 | \lambda_1 a + \lambda_2 b + \lambda_3 c = x, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$   
 coordonnées barycentriques

## 2.2 Fonctions convexes

$f : E \rightarrow ]-\infty, +\infty]$

**Définition 1.**  $f$  convexe si  $\forall (x, y) \in E \times e \forall \lambda \in [0, 1] : f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$  (inegalite dans  $] -\infty, +\infty]$ )  $f$  est strictement convexe si de plus si l'égalité entraine que  $x = y$  ou bien  $\lambda \in \{0, 1\}$ .

Alors  $x + y \implies f(\frac{x+y}{2}) < \frac{1}{2}[f(x) + f(y)]$

**Exemple 1.**  $E$  e.v.n.  $f_p(x) = \frac{1}{p}\|x\|^p$   $1 \leq p < +\infty$  Alors  $f_p$  est convexe  $\forall p \in [1, +\infty[$  strictement convexe si  $p > 1$

- $p = 2$   $\|\frac{x+y}{2}\|^2 = \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2) - \frac{1}{2}\|x - y\|^2$
- $p = 1$   $y = 2x$   $\|\frac{x+y}{2}\| = \frac{3}{2}\|x\| \frac{1}{2}(\|x\| + \|y\|) = \frac{3}{2}\|x\|$
- $p = +\infty$   $f_\infty(x) = \begin{cases} \|x\| & \text{si } \|x\| \leq 1 \\ +\infty & \text{si } \|x\| > 1 \end{cases}$  convexe sci  $E \rightarrow [0, +\infty]$

**Lemme 1.**  $f$  convexe  $\iff \text{epi} f = \{(x, \alpha) \in E \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq \alpha\}$  est un convexe de  $E \times \mathbb{R}$  ;  
 $f$  convexe sci  $\iff \text{epi} f$  est un convexe fermé de  $e \times \mathbb{R}$ .

*Remarque.*  $f$  convexe  $\implies \forall \alpha \in \mathbb{R} \{x \in E \mid f(x) \leq \alpha\}$  est un convexe de  $e$ .  $\Leftarrow$  faux, mais vrai si  $f$  ne prend que les valeurs 0 et  $+\infty$

**Exemple 2.**  $\delta_A : x \in E \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x \in A \\ +\infty & \text{si } x \notin A \end{cases}$  (indicatrice de l'ensemble  $A$ .)  $\delta_A$  convexe  $\implies A$  convexe.  
 $(\text{epi}(\delta_A) = A \times \mathbb{R}^+)$

## 2.3 Continuité des fonctions convexes

$E$  e.v.n. sur  $\mathbb{R}$ .  $f : E \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  convexe

**Définition 1.**  $\text{dom } f = \{x \in E \mid f(x) < +\infty\}$ .

**Lemme 1.** Soit  $V$  un ouvert de  $E$  tel que  $\sup_V f < +\infty$ . Alors  $f$  est continue, localement Lipsitzienne) sur  $V$ .

*Démonstration.* Soit  $x_0 \in V$  et  $M = \sup_V f$  ( $M < +\infty$ ). Quitte à écrire fo sous la forme  $f(x) = f(x_0) + g(x - x_0)$  ; on peut supposer que  $x_0 = 0_E$  et  $f(x_0) = 0$ . •  $V$  ouvert contenant 0  $\implies \exists R > 0 \forall \|x\| \leq R. f(x) \leq M$

Alors pour tout  $x \in E$  telle que  $\|x\| < r$  (avec  $r < R$ ) on a :  $f(\frac{R}{r}x) \leq M \implies f(\frac{r}{R}(\frac{R}{r}x)) \leq \text{convexite} = \frac{r}{R}f(\frac{R}{r}x) + (1 - \frac{r}{R})f(0) \implies f(x) \leq \frac{r}{R}M$ , si  $\|x\| < r. f(x) - f(0) \leq \frac{\|x\|}{M} \cdot \frac{R}{M} \cdot \forall \|x\| < R \implies \limsup_{\|x\| \rightarrow 0} f(x) \leq 0 = f(0_E)$

Montrons que  $\liminf_{\|x\| \rightarrow 0} f(x) \geq 0$

$z = -kx$   $(1 - \lambda)x + \lambda z = 0 \implies x = \lambda(x - z) = \lambda(1 + k)x. \lambda = \frac{1}{1+k}, \lambda \in ]0, 1[$   
 $\frac{k}{1+k}x + \frac{z}{1+k} = 0 \implies f(0_e) = 0 \leq \frac{k}{1+k} + \frac{1}{1+k}f(z) \implies 0 \leq \frac{k}{1+k}f(x) + \frac{m}{1+k} \implies f(x) \geq -\frac{M}{k}$  si  $\| -kx \| \leq R \implies f(x) \geq -\frac{M}{\frac{R}{\|x\|}} = -\frac{M}{R}\|x\|$

Finalement on a obtenu :  $|f(x) - f(0_E)| \leq \frac{M}{R}\|x\|, \forall x \in B_R$ .

d'où  $\lim_{\|x\| \rightarrow 0} f(x) = f(0_E)$

□

**Corollaire 1.** 1.  $f$  convexe majorée sur toute boule de  $E \implies f$  continue sur  $E$ .

2.  $f$  est continue sur  $\overset{\circ}{\text{dom}} f$  si  $f$  est s.c.i.

$$\text{dom } f = \underbrace{\cup_{n \in \mathbb{N}} \{x \in E \mid f(x) \leq n\}}_{\text{fermée}}.$$

Baire  $\overset{\circ}{\text{dom}} f \neq \emptyset \implies \exists n_0 \mid \{x \in E \mid f(x) \leq n\} \neq \emptyset, \forall n \geq n_0$ . Alors  $x \in \overset{\circ}{\text{dom}} f \implies \exists n \mid x \in V_n = \{f \leq n\}$   $f$  majorée sur l'ouvert  $V_n \implies f$  continue au pt  $x$ .

## 2.4 Conjuguée de Fenchel

X e.v.n. sur  $\mathbb{R} \ f : X \rightarrow ]-\infty, +\infty] \text{ dom } f = \{x \mid f(x) < +\infty\} \neq \emptyset$ .

**Définition 1.**  $f^* : X^* \rightarrow \bar{\mathbb{R}} \ \forall x^* \in X^* \text{ and } f^*(x^*) = \sup\{\langle x, x^* \rangle - f(x) \mid x \in X\}$ .

*Remarque.* Si  $E$  est un Hilbert ( $X^* \sim X$ ),  $f^*$  s'appelle la conjuguée de Fenchel de  $f$ . On a :  $\forall x \in X \forall x^* \in X^* \text{ and } \langle x, x^* \rangle \leq f(x) + f^*(x^*)$  inégalité de Fenchel.

• Interprétation si  $X = \mathbb{R} \ y = f'(\bar{x})(x - \bar{x}) + f(\bar{x})$  ordonné de l'intersection avec  $x = 0$  de la tangente au graphe de  $f$  dont la pente est égale à  $x^*$  (il faut une tangente en dessous du graphe)

**Exemple 3.** — Economie  $X = \mathbb{R}^n \ f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  cout de fonction de quantités  $x_1, x_2, \dots, x_n$  de produits  $A_1, A_2, \dots, A_n$ .  $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ ,  $x_i^*$  = prix de vente unitaire de  $A_i$ .

Profit  $= x_1 x_1^* + \dots + x_n x_n^* - f(x_1, x_2, \dots, x_n)$   $f^*(x^*)$  = profit optimal.  $X$  Hilbert  $f_p(x) = \frac{1}{p} \|x\|^p \ 1 \leq p < +\infty$ .  $f_1^*(x^*) = \sup_{x \in X} (x|x^*) - \|x\| \ f^*(x^*) = t \|x^*\|^2 - t \|x^*\| \geq t \|x^*\| (\|x^*\| - 1) \ \forall t \geq 0$ .

$$f^*(x^*) = +\infty \text{ si } \|x^*\| \leq 1$$

Si  $\|x^*\| \leq 1$ , on a :  $(x|x^*) \leq \|x\| \implies (x|x^*) - \|x\| \leq 0, \forall x \in X. \implies f^*(x^*) = 0$ .

$$f_1^*(x^*) = \sup_{x \in X} ((x|x^*) - \|x\|) = \begin{cases} 0 \text{ si } \|x^*\| \leq 1 \\ +\infty \text{ si } \|x^*\| > 1 \end{cases} = f_\infty(x^*) \text{ où } f_\infty = \begin{cases} 0 \text{ si } \|y\| \leq 1 \\ +\infty \text{ si } \|y\| > 1 \end{cases} = f_\infty(x^*),$$

$$1 < p < +\infty \ f_p^+(x^*) = \sup_{x \in X} \{(x|x^*) - \frac{1}{p} \|x\|^p\} \ \forall x \in X, \exists! t \geq 0, \exists! u \in X \|u\| = 1 \text{ tel que } x = tu$$

$$(t = \|x\| \text{ et } u = \frac{x}{\|x\|})$$

$$f_p^*(x^*) = \sup_{\substack{t \geq 0 \\ \|u\|=1}} |t(u|x^*) - \frac{1}{p} t^p| = \sup_{\|u\|=1} \sup_{t \geq 0} |t(u|x^*) - \frac{1}{p} t^p|$$

$$\varphi(t) = t(u|x^*) - \frac{1}{p} t^p \ \varphi'(t) = (u|x^*) - |t|^{p-2} t$$

$$\varphi'(\bar{t}) = 0 \iff |\bar{t}|^{p-2} \bar{t} = (u|x^*)$$

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} \varphi(t) = \varphi(\bar{t}) = \bar{t}(u|x^*) - \frac{1}{p} |\bar{t}|^p = \bar{t} \bar{t} |\bar{t}|^{p-2} - \frac{1}{p} |\bar{t}|^p = |\bar{t}|^p (1 - \frac{1}{p}).$$

$$|\bar{t}|^{p-1} = |(u|x^*)| \implies |\bar{t}|^p = |(u|x^*)|^{\frac{p}{p-1}} = |(u|x^*)|^{p'} o(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1) \implies \sup_{t \in \mathbb{R}} \varphi(t) = \frac{1}{p'} |(u|x^*)|^{p'} \text{ où } p' \text{ est expression conjugué de } p.$$

$$f_p^*(x^*) = \sup_{\|u\|=1} \frac{1}{p'} |(u|x^*)|^{p'} \sup_{\|u\|=1} (u|x^*) = \|x^*\| \implies f_p^*(x^*) = \frac{1}{p'} \|x^*\|^{p'} f_p^* = f_{p'}$$

Pour  $p = 2$ , on obtient  $f_2^* = f_2$ ,  $f_p^* = f_{p'} \ \forall p \in ]1, +\infty[ \ f_1^* = f_\infty \cdot f_\infty^*$  ?

$$f_\infty^*(x^*) = \sup[(x|x^*) - f_\infty(x)] = \sup_{\|x\| \leq 1} (x|x^*) = \|x^*\| = f_1.$$

$$\text{Inégalité de Fenchel } \langle x, x^* \rangle \leq \frac{1}{p} \|x\|^2 + \frac{1}{p'} \|x^*\|^{p'} \text{ égalité } \iff x = x^{p-2} x^*.$$

—  $C$  convexe de  $E \ f = \delta_C(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x \in C \\ +\infty \text{ sinon} \end{cases} \ f^*(x^*) = \delta - C^*(x^*) = \sup_{x \in C} (x|x^*) \ \delta_C^*$  est

convexe, sous additive ( $\delta_C^*(x^* + y^*) \leq \delta_C^*(x^*) + \delta_C^*(y^*)$ ) et positivement 1-homogène :  $\delta_C^*(\lambda x^*) = \lambda \delta_C^*(x^*) \ \forall \lambda \geq 0$ .

$\delta_C^*$  est appelée fonction d'appui de  $C$ .

**Exercice 1.**  $\delta_C^*$  est une semi-norme si et seulement si  $C$  fermé et  $-C = C$ . Ce sera une norme si de plus  $0 \in C$ .

## 2.5 Biconjuguée de Fenchel

$f : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$   $f^{**} : X^* \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$  est définie par :  $f^{**}(x^*) = \sup\{\langle x, x^* \rangle - f(x) \mid x \in X\}$

**Exemple 4.**  $X$  Hilbert  $f_p = \frac{1}{p} \|x\|^p$   $1 \leq p < +\infty$   $\forall p \in [1, +\infty]$   $f_p^{**} = f_p$ ,  $f_\infty^{**} = f_\infty$ .

**Théorème 1** (properties). [de  $f^*$  et  $f^{**}$ ]

1.  $f^*$  est convexe et s.c.i. pour la topologie  $*$  faible (=faible ssi  $E$  est réflexif).
2.  $\inf_X f = -f^*(0)$   $f \leq g \implies f^* \geq g^*$
3.  $(f_i)_{i \in I}$  famille de fonctions sur  $X$   $(\inf_{i \in I} f_i)^* = \sup_{i \in I} (f_i)^*$
4.  $f^{**} \leq f$  (mais  $f^{**} = f^*$ )

*Démonstration.* 1)  $f^*(x^*) = \sup\{\langle x, x^* \rangle - f(x) \mid x \in X\}$   $g_x : x^* \in E^* \rightarrow \langle x, x^* \rangle - f(x)$  affine  $*$  faiblement continue.  $G =$  topologie faible  $g_x$  affine,  $G$ -continue. Or  $g^* = \sup_{x \in X} g_x$   $g_x$  convexe,  $G$ -s.c.i. enveloppe superior de fonctions convexes s.c.i.

$$\begin{aligned} f^*(0) &= \sup\{-f(x) \mid x \in X\} = -\inf_X f \\ f \leq g &\implies \langle x, x^* \rangle - f(x) \geq \langle x, x^* \rangle - g(x), \forall x \in X. \implies f^*(x^*) \geq g^*(x^*) \\ (\inf_{i \in I} f_i)^*(x^*) &= \sup_x |\langle x, x^* \rangle - \inf_{i \in I} f_i(x)| = \sup_x |\langle x, x^* \rangle + \sup_{i \in I} -f_i(x)| = \sup_{i \in I} \sup_x |\langle x, x^* \rangle - f_i(x)| = \sup_{i \in I} f_i^*(x^*) \end{aligned}$$

$$5) \langle x, x^* \rangle \leq f(x) + f^*(x^*) \forall x \in X, \forall x^* \in X^*$$

$$\text{Donc } \langle x, x^* \rangle - f^*(x^*) \leq f(x) \implies \underbrace{\sup_{x^*} \langle x, x^* \rangle - f^*(x^*)}_{f^{**}} \leq f(x) \quad \forall x \in X. g_x, G \quad \square$$

**Lemme 1.**  $f^{**}(x) = \begin{cases} \sup\{g(x) \mid g \text{ affine continue } g \leq f\} \\ -\infty \text{ s'il n'existe pas de tel } m \text{ minorant } g \end{cases}$

*Démonstration.* Soit  $g$  une fonction affine continue telle que  $f \geq g$ . Alors  $\exists x^* \in X^*$ ,  $\exists \beta \in \mathbb{R}$  tel que  $g(x) = \langle x, x^* \rangle - \beta$  et  $g \leq f \iff \langle x, x^* \rangle - \beta \leq f(x), \forall x \in X$   
 $\iff \sup_{x \in X} (\langle x, x^* \rangle - f(x)) \leq \beta \iff f^*(x^*) \leq \beta$  ( $\implies x^* \in \text{dom } f^*$ ). Si  $\text{dom } f^* \neq \emptyset$  ( $f^* = +\infty$ )  $\implies \exists g$  affine continue  $\leq f$ .  $\text{dom } f^* \neq \emptyset \iff \exists g$  affine continue  $\leq f$  Supposons  $\text{dom } f^* \neq \emptyset$  alors  $\sup_{g \leq f} g(x) = \sup_{(x^*, \beta) \in E^* \times \mathbb{R}} \{\langle x, x^* \rangle - \beta \mid f^*(x^*) \leq \beta\} = \sup_{x^* \in \text{dom } f^*} |\sup_{\beta \geq f^*(x^*)} \langle x, x^* \rangle - \beta| = \sup_{x^* \in \text{dom } f^*} |\langle x, x^* \rangle - f^*(x^*)| = \sup_{x \in X^*} \langle x, x^* \rangle - f^*(x^*) = f^{**}(x)$   $\square$

**Théorème 2.**  $X$  e.v.n.  $f$  convexe :  $X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  tel que  $\exists x_0 \in X \mid f(x) < +\infty$ . Alors

1.  $f$  s.c.i. sur  $X \implies f^{**} = f$
2. supposons que  $\text{dom } f^* \neq \emptyset$  alors  $f^{**} = \bar{f}$ .

où  $\bar{f}$  est la plus grande fonction s.c.i. inférieure à  $G$  ( $\bar{f}(x) = \sup\{g(x) \mid g \text{ s.c.i. } \leq f\}$ ) =  $\inf_{x_n \rightarrow x} \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{r > 0} (\inf_{B(u, r)} G)$

Remarque.  $\text{epi } \bar{f} = \overline{\text{epi } f}$

Preuve de ii).

Rappel.  $f^{**} \leq f \implies f^{**} \leq \bar{f}$   $f^{**}(x) = \sup\{g(x) \mid g \text{ affine continue} \leq f\}$

Soit  $x_0 \in X$  et  $\alpha_0 < \bar{f}(x_0)$ . Montrons que  $\alpha_0 < f^{**}(x_0)$  (alors on aura  $\bar{f}(x_0) \leq f^{**}(x_0)$ )

Il suffit de montrer  $g(x) = \langle x, x_0^* \rangle - \beta_0$  tel que  $g \leq f$  et  $\alpha_0 \leq g(x_0)$ .  $\bar{f}(x_0) > \alpha_0 \implies (x_0, \alpha_0) \notin \bar{f}$ . convexe fermé de  $X \times \mathbb{R}$ . D'après Hahn-banach  $\exists (x_0^*, \beta_0) \in X^* \times \mathbb{R}$  tel que  $\langle x_0, \alpha_0 \rangle + \alpha_0 \beta_0 < \gamma_0 = \inf\{\langle x, x_0^* \rangle + \alpha \beta_0\}$

en particulier  $\langle x_0, x_0^* \rangle + \alpha_0 \beta_0 < \langle x, x^* \rangle + \alpha \beta_0 \implies \beta_0 \leq 0$  (sinon si  $f(x) < +\infty$  on peut faire  $\alpha \rightarrow \infty$ ).

$\beta_0 < 0$  impossible car ssi  $\bar{x}$  est tel que  $f(\bar{x}) < +\infty$  alors  $\langle x_0, x_0^* \rangle + \alpha_0 \beta_0 < \langle \bar{x}, x_0^* \rangle + \alpha \beta_0 \forall \alpha > f(\bar{x})$  qd  $\alpha \rightarrow +\infty$  on obtient une contradiction. Donc  $\beta_0 \geq 0$ .

1er cas  $\beta_0 > 0$  On a :  $\langle x_0, x_0^* \rangle + \alpha_0 \beta_0 \leq \langle x, x_0^* \rangle + \beta_0 \bar{f}(x)$  ( $\alpha = \bar{f}(x)$ )  $\implies \bar{f}(x) \geq \underbrace{\langle x_0 - x, \frac{x_0^*}{\beta} \rangle + \alpha_0 g(x_0)}_{g(x) \text{ affine continue}} = \alpha_0$ . □

$f : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$ ,  $\text{epi } f = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq \alpha\}$

$\bar{f}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sup\{g(x) \mid g \text{ sci} \leq f\}$   
 $\langle x_0, x_0^* \rangle + \alpha_0 \beta_0 < \inf\{\langle x, x_0^* \rangle + \alpha \beta_0 \mid \bar{f}(x) \leq \alpha\}$

$f^{**}(x_0) \stackrel{?}{\geq} \bar{f}(x_0)$ ,  $\alpha_0 < \bar{f}(x_0)$ .

où  $f^{**}(x_0) = \sup\{g(x_0) \mid g \text{ affine continue} \leq f\}$   $\beta_0 \geq 0$

$\beta_0 > 0$  OK  $f^{**}(x_0) \leq \alpha_0 \forall \alpha_0 < \bar{f}(x_0) \implies f^{**}(x_0) \geq \bar{f}(x_0)$ .

$\beta_0 = 0$  on va montrer que  $f^{**}(x_0) = +\infty$  Par hypothese  $\exists g_0$  affine continue telle que  $g_0 \leq f$ .

Soit  $\varepsilon > 0$  et posons  $\gamma_0 = \inf\{\langle x, x_0^* \rangle + 0 \mid \bar{f}(x) \leq \alpha\}$  ( $\beta_0 = 0$ )

On soit que  $\langle x_0, x_0^* \rangle < \gamma_0$  et  $\langle x, x_0^* \rangle \geq \gamma$  si  $\bar{f}(x) < +\infty$ .

$\langle x, x_0^* \rangle + \varepsilon f(x) \geq \gamma_0 + \varepsilon g_0(x) \forall x \in \text{dom } f$  ( $\bar{f}(x) \leq f(x) < +\infty$ ).

Donc  $f(x) \geq \underbrace{g_0(x) + \frac{\gamma_0 - \langle x_0, x_0^* \rangle}{\varepsilon}}_{g_\varepsilon \text{ affine continue}}, \forall x \in X. \implies f^{**}(x_0) \geq g_\varepsilon(x_0) = g_0(x_0) + \frac{\gamma_0 - \langle x_0, x_0^* \rangle}{\varepsilon}, \forall \varepsilon > 0.$

$\gamma_0 > \langle x_0, x_0^* \rangle \implies \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} g_\varepsilon(x_0) = +\infty \implies f^{**}(x_0) = +\infty.$

$f$  convexe et admet une minimisant affine continue  $\implies f^{**} = \bar{f}$ .

Remarque.  $f$  admet minimisante affine continue  $\iff \exists x_0^* \mid f^*(x_0) < +\infty$  ( $\text{dom } f^* \neq \emptyset$ ).

Démonstration. i)  $f$  est supposée convexe s.c.i. avec  $\text{dom } f \neq \emptyset$ . Si  $f$  admet une minimisante affine continue, d'après ii), on aura  $\bar{f} = f = f^{**}$ . Montrons l'existence d'une telle minimisante.  $\text{epi } f$  est une convexe fermé de  $X \times \mathbb{R}$  (car  $f$  est convexe sci) qui est non vide car  $\exists x_0 \in X$  tel que  $f(x_0) < +\infty$ . De plus  $f(x_0) > -\infty \implies \exists \alpha_0 < f(x_0)$

$\implies (x_0, \alpha_0) \in \text{epi } f$ . D'après HB strict :  $\exists x_0^* \in X^*, \exists \beta_0 \in \mathbb{R} \mid \langle x_0, x_0^* \rangle + \alpha_0 \beta_0 < \inf\{\langle x, x_0^* \rangle + \alpha \beta_0 \mid (x, \alpha) \in \text{epi } f\}$

Alors  $\beta_0 \geq 0$ .

Si  $\beta_0 = 0$ , on doit avoir  $\langle x_0, x_0^* \rangle < \langle x, x_0^* \rangle, \forall x \in \text{dom } f$ . Pour  $x = x_0$ , on obtient une contradiction d'où  $\beta_0 > 0$ .

Donc  $\beta_0 > 0$  et pour  $\alpha = f(x)$   $x \in \text{dom } f$   $\langle x_0, x_0^* \rangle + \alpha_0 \beta_0 \leq \langle x, x_0^* \rangle + \beta_0 f(x) \implies \forall x \in \text{dom } f, f(x) \geq \langle x_0 - x, x^* / \beta \rangle + \alpha_0 \implies f \geq g_0$  où  $g_0$  affine continue  $g_0(x)$ .  $\square$

**Rappel.** H.B. analogue  $E$  espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .  $V$  sous espace vectoriel de  $E$ .  $p : E \rightarrow [0, +\infty[$  telle que  $p(x+y) \leq p(x) + p(y) \forall (x, y) \in E^2$   $p(\lambda x) = \lambda p(x), \forall \lambda \geq 0 \forall x \in E$ .

$f : V \rightarrow \mathbb{R}$  forme linéaire telle que  $f(x) \leq p(x) \forall x \in V$

Alors  $\exists \tilde{f}$  forme linéaire sur  $E$  telle que  $\tilde{f}(x) = f(x) \forall x \in V$   $\tilde{f}(x) \leq p(x) \forall x \in E$ . Si  $p(-x) = p(x)$  (semi. norme) alors  $|\tilde{f}(x)| \leq p(x) \forall x \in E$

cas  $E = \text{Hilbert}$   $f$  continue sur  $V$  fermé  $|f(x)| \leq C \|x\| \forall x \in V$   $E = V \oplus V^\perp$ .  $\tilde{f}(x) = f(P_V x)$  où  $P_V x = x^* \iff x^* \in Vx - x^* \in V^\perp$   
 $|\tilde{f}(x)| \leq C \|P_V x\| \leq C \|x\| \forall x \in E$ .

**Exemple 5.**  $C$  convexe de  $E$ .  $0_E \in C$   $j_C(x) = \inf_{t>0} \{ \frac{x}{t} \in C \}$

$$C = \{ \|x\| \leq 1 \}$$

$$\| \frac{x}{t} \| = \frac{1}{t} \|x\| \leq 1 \iff t \geq \|x\|$$

$$j_C(x) = \|x\|$$

$$\{f_C < 1\} \subset C \subset \{j_C \leq 1\}$$

$$0 < t < t' \iff \frac{x}{t} \in C \implies \frac{x}{t'} \in C?$$

$$\frac{x}{t'} = \frac{t}{t'} \frac{x}{t} + (1 - \frac{t}{t'}) 0_E.$$

$$\frac{x}{t} \in C$$

$$0 \in C \implies \frac{x}{t'} \in C$$

$$\text{Donc } \{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in C\} = [j_C(x), +\infty[ \cap [0, +\infty[ \supset [1, +\infty[$$

$$\bullet j_C(x) < 1 \implies \{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in C\} \supset [1, +\infty[ \implies x \in C \bullet x \in C \implies 1 \in \{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in C\} \implies j_C(x) \leq 1$$

$$\text{b) } j_C(x+y) \leq j_C(x) + j_C(y) \text{ Soit } j_C(x) < \alpha \text{ et } j_C(y) < \beta \text{ et montrons que } j_C(x+y) < \alpha + \beta$$

$$j_C(x) < \alpha \implies \frac{x}{\alpha} \in C \text{ et } j_C(y) < \beta \implies \frac{y}{\beta} \in C$$

$$\implies \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \frac{x}{\alpha} + \frac{\beta}{\alpha+\beta} \frac{y}{\beta} \in C \text{ (convexité de } C \text{ et } 0 < \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \leq 1) \implies \frac{x+y}{\alpha+\beta} \in C \implies j_C(x+y) \leq \alpha + \beta$$

d'où la conclusion qd  $\alpha \downarrow j_C(x)$  et  $\beta \downarrow j_C(y)$ .

$$j_C(\lambda x) = \lambda j_C(x) \text{ pour } \lambda \geq 0 \text{ est évident}$$

$$\text{c) } 0 \in \mathring{C} \iff \exists M \mid j_C(x) \leq M \|x\|, \forall x \in E \text{ (1) } \iff \text{(2) } (1) \implies (2) \text{ } 0 \in \mathring{C} \implies \exists r > 0 : \overline{B(0, r)} \subset C \implies \forall x \neq 0_E \ r \frac{\|x\|}{\|x\|} \in C \implies \forall x \neq 0_E \ \frac{x}{t} \in C \text{ si } t \geq \frac{\|x\|}{r} \implies j_C(\frac{x}{t}) < 1 \forall t \geq \|x\|/r \implies j_C(\frac{x}{t}) \leq 1 \forall t \geq \frac{\|x\|}{r} \implies j_C(x) \leq t \forall t \geq \|x\|/r \implies j_C(x) \leq \|x\| (M = \frac{1}{r}) \text{ (2) } \implies (1) \ j_C(x) \leq M \|x\| \implies j_C(x) < 1 \text{ si } \|x\| < \frac{1}{M} \implies \{ \|x\| < \frac{1}{M} \} \subset C \implies 0 \in \mathring{C}$$

$$\text{d) } C \text{ ouvert } \iff 0 \in \mathring{C} \text{ et } C = \{j_C < 1\} \text{ (1) } \iff \text{(2) } (2) \implies (1) \ 0 \in \mathring{C} \implies j_C(x) \leq M \|x\| \implies j_C \text{ convexe, } j_C \text{ continue sur toute boule } \implies \{j_C < 1\} \text{ est ouvert } \implies C \text{ ouvert.}$$

$$\bullet j_C((1-\theta)x + \theta y) \leq j_C((1-\theta)x) + j_C(\theta y) \leq (1-\theta)j_C(x) + \theta j_C(y) \implies j_C \text{ est convexe sous additif et 1 lienage}$$

$$(1) \implies (2) \ C \text{ ouvert } \implies \mathring{C} = C \text{ (donc } 0 \in C \implies 0 \in \mathring{C})$$

$$\text{On } 0 \in \mathring{C} \implies j_C \text{ continue } \implies \{j_C < 1\} \text{ est ouvert contenu dans } C. \text{ Il reste à établir que } C \subset \{j_C < 1\}. x \in C \{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in C\}$$

$$x \in C \varphi : t \mapsto \frac{x}{t} \text{ continue de } ]0, +\infty[ \text{ à valeurs dans } E \implies \varphi^{-1}(C) = \{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in C\} \text{ est un ouvert de } ]0, +\infty[ \text{ comme image réciproque de l'ouvert } C$$

$$\text{Donc } \{t > 0, \frac{x}{t} \in C\} x \in C \implies 1 \in [j_C(x), +\infty[ \implies j_C(x) < 1 \text{ Donc } C \text{ ouvert } \implies \{j_C < 1\} = C$$

$$\text{Rappel. } f \text{ convexe s.c.i. } \implies f^{**} = f.$$



**Théorème 3.** Soit  $h : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  convexe telle que  $h$  continue au point  $x = 0$ . Alors

- (i)  $h^*$  atteint son minimum sur  $X^*$  (et  $\arg \min h^*$  est  $^*$ faiblement compact dans  $X^*$ )
- (ii)  $\inf_{X^*} h^* (= \min_{X^*}) = -h(0)$

*Remarque.* variante  $h$  continue en  $x_0$ . Même résultat mais avec  $x^* \rightarrow h^*(x^*) - \langle x_0, x^* \rangle$  et  $\inf[h^*(\cdot) - \langle x_0, \cdot \rangle] = -h(x_0)$

$$\sup_x |\langle x, x^* \rangle - h(x_0 + x)| = h^*(x^*) - \langle x_0, x^* \rangle. (h(x_0 + \cdot))^* = h^* - \langle x_0, \cdot \rangle$$

*Démonstration.*  $h$  continue en 0  $\implies \exists R > 0 \exists M >$  tels que  $h(x) \leq M \forall \|x\| < R$ . Alors

$$h^*(x^*) = \sup_{x \in X} \langle x, x^* \rangle - h(x) \geq \sup_{\|x\| \leq R} |\langle x, x^* \rangle - M| \geq R \|x^*\|_{X^*} - M$$

$$\implies \lim_{\|x^*\| \rightarrow +\infty} h^*(x^*) = +\infty.$$

$\forall h^*$  est convexe sur  $X^* \forall R' \{ \|x^*\| \leq R' \}$  est  $^*$ faiblement compact  $h^*$  est  $^*$ faiblement s.c.i.

$\implies \arg \min_{X^*} h^*$  est un convexe non vide compact par la topologie faible.

$$K_n = \{h^* \leq \alpha_n\} \text{ compact } \neq \emptyset \alpha_n \downarrow \inf h^*.$$

$$\text{Alors : } \arg \min h^* = \{x^* \in X^* | h^*(x^*) \leq \inf h^*\} = \bigcap_n \{h^* \leq \alpha_n\}$$

$$\text{Preuve de ii) } \inf h^* = -(h^*)^*(0) = -\bar{h}(0) \quad h \text{ continue en } 0 \implies \bar{h}(0) = h(0) \quad \square$$

## 2.6 Differentiability of convex functions

Soit  $f : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$ .

**Définition 1.** Soit  $x \in \text{dom } f$  et  $x^* \in X^*$ . Alors  $x^*$  est dans le sous-différentiel de  $f$  au point  $x$  si  $\forall y \in X \quad f(y) \geq \underbrace{f(x) + \langle y - x, x^* \rangle}_{g(y) \text{ affine}}$ .

**Exemple 6.**  $f(x) = |x|$  sur  $\mathbb{R}$ .  $\forall x^* \in [-1, 1] x^* \in \frac{\partial}{\partial f}(x)$ .  $|y| \geq 0 + (y - 0)x^*, y \in \mathbb{R}$ .  $x^*$  est un sous-gradient de  $f$  au point  $x \quad \frac{\partial}{\partial f}(x) = \{x^* \in X^* \mid x^* \text{ sous-gradient au point } x\}$

$$f(x) = |x| \text{ au } \mathbb{R}. \quad \frac{\partial}{\partial f}(x) = \begin{cases} \{\frac{x}{|x|}\} & \text{si } x \neq 0 \\ [-1, 1] & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

**Lemme 1.** 1.  $x^* \in \frac{\partial}{\partial f}(x) \iff \langle x, x^* \rangle = f(x) + f^*(x^*)$

2. Si  $f$  est convexe s.c.i. alors  $x^* \in \frac{\partial}{\partial f}(x) \iff x \in \frac{\partial}{\partial f}^*(x^*)$

*Démonstration.*  $x^* \in \frac{\partial}{\partial f}(x) \iff f(y) \geq f(x) + \langle y - x, x^* \rangle \quad \forall y \in X \iff \langle x, x^* \rangle - f(x) \geq \langle y, x^* \rangle - f(y) \quad \forall y \in X \iff \langle x, x^* \rangle - f(x) \geq \sup_{y \in X} \langle y, x^* \rangle - f(y) \iff \langle x, x^* \rangle \geq f(x) + f^*(x^*) \iff =$

ii)  $x \in \frac{\partial}{\partial f}^*(x^*) \iff$  (i)  $f^*(x^*) + \underbrace{f^{**}(x)}_{f(x)} = \langle x, x^* \rangle$  car  $f$  convexe s.c.i.  $\square$

**Théorème 1.**  $f$  convexe  $X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  tel que  $\exists x_0 \in \text{dom } f | f$  continue en  $x_0$ . Alors  $\bigcap_{x \in \text{dom } f} \frac{\partial}{\partial f}(x)$  est une convexe compact non vide de  $X^*$  (topologie  $^*$ faible).

*Démonstration.* on applique le Thm 2 avec  $h(y) = f(x + y)$  où  $x$  est un point de continuité de  $f$  ( $f$  continue au point  $x \iff x \in \text{dom } f$  et  $\text{dom } f \neq \emptyset$ ) Alors  $h(0) = -\min h^*, h^*(x^*) = f^*(x^*) - \langle x, x^* \rangle. \implies f(x) = -\min_{X^*} [f^*(x^*) - \langle x, x^* \rangle]$   
Si  $x^*$  realise le minimum, on a :  $f(x) = -f^*(x^*) + \langle x, x^* \rangle$ . Donc  $x^* \in \argmin[f^* - \langle \cdot, x^* \rangle]$ —compact non vide.  $\square$

## 2.7 lien avec la différentialité

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  continue dérivée de  $f$  dans la direction  $h \in X$  au point  $x$  :  
 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{f(x+\varepsilon h) - f(x)}{\varepsilon} \stackrel{\text{def}}{=} f'(x, h)$ .

**Définition 1.**  $f$  est  $G$ -dérivable au point  $x$  si  $f'(x, h)$  existe et est lineaire continue par rapport à  $h$ . Notons  $f'(x)$  l'eelement de  $X^*$  associé à cette forme lineaire.

On a :  $f'(x, h) = \langle h, f'(x) \rangle \forall h \in H$ .  $f'(x)$  est la  $G$ -dérivée de  $f$  au point  $x$ .

Si  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $X$  alors  $f'(x)$  coïncide avec la différentielle de  $f$  noté  $df(x)$  ou bien  $\nabla f(x)$  si  $X$  est un Hilbert

**Exercice 2.**  $f$  classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^N$   $\nabla f(x) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N}) \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x+th) - f(x)}{t} = \langle \nabla f(x), h \rangle$

**Lemme 1.** Soit  $f : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  convexe telle que  $f$  est minorée par une fonction affine. Alors  $\forall x \in \text{dom } f$ ,  $f'(x, h)$  existe  $\forall h \in X$  et on a  $f'(x, h) \geq \langle h, x^* \rangle \forall h \in \frac{\partial f}{\partial f}(x)$ .

*Démonstration.*  $\frac{f(x+\varepsilon h) - f(x)}{\varepsilon}$  est une fonction monotone croissante de  $\varepsilon$ . Donc :  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{f(x+\varepsilon h) - f(x)}{\varepsilon} = \inf_{\varepsilon > 0} \frac{f(x+\varepsilon h) - f(x)}{\varepsilon}$ .

Soit  $x^* \in \frac{\partial f}{\partial f}(x)$  ( $x \in \text{dom } f \implies \frac{\partial f}{\partial f}(x) \neq \emptyset$ ). Alors  $f(x+\varepsilon h) \geq f(x) + \langle \varepsilon h, x^* \rangle \implies \frac{f(x+\varepsilon h) - f(x)}{\varepsilon} \geq \langle h, x^* \rangle \forall \varepsilon$ .

Donc on a  $f'(x, h) \geq \langle x^*, h \rangle \forall x^* \in \frac{\partial f}{\partial f}(x)$ .  $\square$

**Corollaire 1.** Si  $f$  est convexe,  $G$  dérivable au point  $x$ , alors  $\frac{\partial f}{\partial f}(x) = \{f'(x)\}$  où  $f'(x)$  est la  $G$  dérivée de  $f$ .

*Démonstration.*  $\langle h, f'(x) \rangle = f'(x, h) \geq \langle h, x^* \rangle \forall x^* \in \frac{\partial f}{\partial f}(x)$

Par linéarité, on a donc  $f'(x) = x^*$ .  $\square$

**Théorème 1.** Si  $f$  est convexe centre au point  $x$ . Alors  $f$  est  $G$  dérivable au point  $x \iff \frac{\partial f}{\partial f}(x)$  est réduit à un point.

## 2.8 Application de la dualité en optimisation

Soit  $f : X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$  convexe s.c.i. et  $C$  un compacte fermé de  $X$ . On considère le Pb  $\inf_{x \in C} f(x)$ .

On cherche des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité.

**Théorème 1.** On supposons que  $\exists x_0 \in c$  tel que  $f$  continue en  $x_0$ . Alors  $\bar{x}$  solution  $\iff \exists x^* \in \frac{\partial f}{\partial f}(\bar{x})$  tel que  $\langle y - \bar{x}, x^* \rangle \geq 0 \forall y \in C$ .

*Démonstration.* Soit  $F = f + \delta_C$ .  $F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in C \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}$

$f$  est convexe sci  $\text{dom } F \neq \emptyset$ . ( $F(x_0) < +\infty$ ).

$\bar{x}$  solution  $\iff F(\bar{x}) = \inf F = -F^*(0) \iff F(\bar{x}) + F^*(0) = \langle \bar{x}, 0 \rangle \iff 0 \in \frac{\partial}{\partial F}(\bar{x})$

Supposons que :  $\frac{\partial}{\partial F}(\bar{x}) = \frac{\partial}{\partial}(f + \delta_C)(\bar{x}) = \frac{\partial}{\partial f}(\bar{x}) + \frac{\partial}{\partial \delta_C}(\bar{x})$

Alors  $\bar{x}$  solution  $\iff 0 \in \frac{\partial}{\partial f}(\bar{x}) + \frac{\partial}{\partial \delta_C}(\bar{x}) \iff \exists x^* \in \frac{\partial}{\partial f}(\bar{x})$  avec  $-x^* \in \frac{\partial}{\partial \delta_C}(\bar{x})$

$-x^* \in \frac{\partial}{\partial \delta_C}(\bar{x}) \iff \underbrace{\delta_C(\bar{x}) + \delta_C^*(-x^*)}_{0} = -\langle \bar{x}, x^* \rangle \iff \sup_{y \in C} \langle y, -x^* \rangle = -\langle \bar{x}, x^* \rangle$

$\iff \forall y \in C - \langle y, x^* \rangle \leq -\langle \bar{x}, x^* \rangle \iff \langle y - \bar{x}, x^* \rangle \geq 0 \forall y \in C$ .

□

**Théorème 2.**  $f, g$  convexes s.c.i.  $X \rightarrow ]-\infty, +\infty]$   $\exists x_0 \in \text{dom } g | f$  continue au point  $x_0$ .

Alors  $\frac{\partial}{\partial}(f + g)(x) = \frac{\partial}{\partial f}(x) + \frac{\partial}{\partial g}(x)$ .

## 2.9 Kuhn-Tucker

$C = \{x \in X \mid g_i(x) \leq 0, 1 \leq i \leq N\}$  on  $g_i$  affine continue sur  $X$ . ( $C$  déterminé par  $N$  contraintes linéaires de type inégalité)

Soit  $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) \in \mathbb{R}_+^N$  et posons  $F_\lambda(x) = f(x) + \sum_{i=1}^N \lambda_i g_i(x)$

$\sup_{\lambda \geq 0} F_\lambda(x) = f(x)$  si  $x \in C$  et  $+\infty$  sinon.

On pénalise la contrainte  $C$  en remplaçant  $\delta_C$  par  $\sum \lambda_i g_i(x)$ .

**Théorème 1.** Supposons qu'il existe  $x_0 \in \text{dom } f$  tel que  $g_i(x_0) < 0 \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, N\}$

Condition de qualification SLATER) ( $x_0 \in \overset{\circ}{C}$ ).

Alors  $\bar{x} \in C$  solution  $\iff \exists \bar{\lambda} \in (\mathbb{R}_+)^N$  tel que :

1.  $F_{\bar{x}}(\bar{x}) \leq F_{\bar{x}} \forall x \in X$ . ( $\bar{x}$  réalise  $\inf_X F_{\bar{x}}$ )
2.  $\bar{\lambda}_i g_i(\bar{x})$  et  $g_i(\bar{x}) \leq 0 \forall i \in \{1, \dots, N\}$  ( $g_i(\bar{x}) < 0 \implies \bar{\lambda}_i = 0$ )

En pratique si  $g_i(x) = \langle x, x_i^* \rangle + \beta_i$  et si  $f$  est  $G$  dérivable la condition équivalent à  $F'_{\bar{x}}(\bar{x}) = 0$

$f'(\bar{x}) + \sum_{i=1}^N \bar{\lambda}_i x_i^* = 0$

$L(\bar{x}, x) \leq L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \leq L(x, \bar{\lambda}) \forall x \in X \forall \lambda \in \mathbb{R}_+^N$

# Chapitre 3

## Exercices

### 3.1 exercice 1

$\inf_{L^2(0,1)} \int_0^1 f(u, u') dx \mid u(0) = 0, u(1) = h \mid f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty]$   $X = \{u \in C^0([0, 1]) \mid u' \in L^2(0, 1)\}$   $F(u) = \int_0^1 f(u, u') dx$   
 $C = \{u \in X \mid u(0) = 0, u(1) = h\}$  convexe fermé dans  $X$   
 $\alpha|z|^2 \leq f(t, z) \leq \beta(1 + |z|^2) \implies \lim_{\|u\| \rightarrow +\infty} F(u) = +\infty$  et  $F$  est définie et continue sur  $X$ .

1. Si  $F$  est faiblement s.c.i., alors  $\exists \bar{u} \in C \mid F(\bar{u}) = \inf_X F$ . (au  $z \mapsto f(t, z)$  est convexe)  
 But : caractériser  $\bar{u}$  à l'aide d'une équation.

2. 2)  $f$  classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ,  $u, v \in X$ .

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(u + \varepsilon v) - F(u)}{\varepsilon} = ?$$

$$\int \left[ \frac{f(u + \varepsilon v, u' + \varepsilon v') - f(u, u')}{g_\varepsilon(x)} \varepsilon \right] dx$$

$$g_\varepsilon(x) \xrightarrow{PR} \frac{\partial f}{\partial t} v(x) + \frac{\partial f}{\partial z} v'(x)$$

$$|g_\varepsilon(x)| \leq h(x) \implies \int_0^1 h(x) dx < +\infty \implies \int_0^1 \left( \frac{\partial f}{\partial t} v(x) + \frac{\partial f}{\partial z} v'(x) \right) dx.$$

Supposons que  $F(\bar{u}) = \inf_C F$ .

Alors si  $v \in X$  avec  $v(0) = v(1) = 0$ , on a  $u + \varepsilon v \in C$  ( $(u + \varepsilon v)(0) = 0$ ,  $(u + \varepsilon v)(1) = u(1) = h$ )  $\forall \varepsilon > 0$ .

Donc  $F(\bar{u} + \varepsilon v) \geq F(\bar{u})$ ,  $\forall v \in X$  tel que  $v(0) = v(1) = 0 \implies F'(\bar{u}, v) = 0$ ,  
 $\forall v \in X_0 = \{v \in X \mid v(0) = v(1) = 0\}$

$$\int_0^1 \left[ \frac{\partial f}{\partial t} v + \frac{\partial f}{\partial z} v' \right] dx = 0 \quad \forall v \in X_0.$$

Supposons  $v$  de classe  $C^1$  et  $v(0) = v(1) = 0$   $\int_0^1 \left[ \frac{\partial f}{\partial t} - \left( \frac{\partial f}{\partial z} \right)' \right] v dx = 0$

$\implies \bar{u}$  vérifie l'équation (Euler),

$$-\frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial z} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = 0 \quad \mathbf{1}$$

**Exemple 1.**  $f(t, z) = \frac{|z|^2}{2} + g(t)$ ,  $g$  classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$   $-\frac{d}{dx}[(\bar{u})'] + g'(\bar{u}) = 0$   $-\bar{u}'' + g'(\bar{u}) = 0$   $g(t) = -t$   
 $\implies \bar{u}'' = -1 \implies \bar{u}(x) = -\frac{x^2}{2} + \lambda x - \Delta \bar{u} + g'(\bar{u}) = 0$

$$\inf \left\{ \frac{1}{2} \int_0^1 |u'|^2 - \int_0^1 u dx \mid u(0) = 0, u(1) = h \right\} \implies \bar{u}(x) = -\frac{x^2}{2} + \left(h + \frac{1}{2}\right)x$$

3)  $\bar{u}$  donné  $u_\varepsilon(y) = u(\psi_\varepsilon^{-1}(y))$  où  $\psi_\varepsilon : x \in [0, 1] \rightarrow x + \varepsilon \varphi(x)$  où  $\varphi$  est  $C^\infty$  et  $\text{supp } \varphi \subset ]0, 1[$

Si  $\varepsilon$  est petit  $\psi_\varepsilon$  est une bijection de  $[0, 1]$  sur  $[0, 1]$ . (qui coïncide avec l'identité dans un voisinage de 0 et 1)  $|\psi_\varepsilon(u) - 1| \leq C\varepsilon \implies \psi'_\varepsilon \geq 1 - C\varepsilon > 0$ , si  $\varepsilon < \frac{1}{C} \implies \psi_\varepsilon^{-1}$  existe.  
 $u'_\varepsilon(y) = |u'|(\psi_\varepsilon^{-1}(y))(\psi_\varepsilon^{-1})'(\psi_\varepsilon^{-1}(y)) = \frac{1}{\psi'_\varepsilon(\psi_\varepsilon^{-1}(y))}$   
 $F(u_\varepsilon) = \int_0^1 f(u_\varepsilon(y), u'_\varepsilon(y)) dy = \int_0^1 f(\bar{u}(\psi_\varepsilon^{-1}(y)), \frac{(\bar{u})'(\psi_\varepsilon^{-1}(y))}{\psi_\varepsilon^{-1}(y)}) dy$  Posons  $x = \psi_\varepsilon^{-1}(y)$   
 $(x + \varepsilon\varphi(x) = y).$

$$\int_0^1 f(\bar{u}(x), \frac{\bar{u}'(x)}{1+\varepsilon\varphi'(x)})(1 + \varepsilon\varphi'(x)) dx$$

$$F(u_\varepsilon) = \int_0^1 f(\bar{u}, \frac{\bar{u}'}{1+\varepsilon\varphi'}) dx + \varepsilon \int f(\bar{u}, \frac{\bar{u}'}{1+\varepsilon\varphi'}) \varphi' dx$$

$$\frac{F(u_\varepsilon) - F(\bar{u})}{\varepsilon} = \int_0^1 \frac{f(\bar{u}, \frac{\bar{u}'}{1+\varepsilon\varphi'}) - f(\bar{u}, \bar{u}')}{\varepsilon} dx + \int_0^1 f(\bar{u}, \frac{\bar{u}'}{1+\varepsilon\varphi'}) \varphi' dx \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(\bar{u}, \frac{\bar{u}'}{1+\varepsilon\varphi'}) - f(\bar{u}, \bar{u}')}{\varepsilon} ?$$

$$\sim \partial_z f(\bar{u}, \bar{u}') \frac{\bar{u}'(\frac{1}{1+\varepsilon\varphi'} - 1)}{\varepsilon}$$

$$\rightarrow -\partial_z f(\bar{u}, \bar{u}') \bar{u}' \varphi'$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(u_\varepsilon) - F(\bar{u})}{\varepsilon} = \int_0^1 [-\partial_z f(\bar{u}, \bar{u}') \bar{u}' \varphi' + f(\bar{u}, \bar{u}') \varphi'] dx$$

$$u_\varepsilon(0) = \bar{u}(\psi_\varepsilon^{-1}(0)) = \bar{u}(0) = 0 \quad u_\varepsilon(1) = \bar{u}(\psi_\varepsilon^{-1}(1)) = \bar{u}(1) = h$$

$$\implies F(u_\varepsilon) \geq F(\bar{u})$$

$$\text{Donc } \varphi \in C^\infty \varphi(0) = \varphi(1) = 0 \implies \int_0^1 [f(\bar{u}, \bar{u}') - \partial_z f(\bar{u}, \bar{u}')] \varphi' dx = 0$$

$$\implies \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x} (\partial_z f(\bar{u}, \bar{u}') \bar{u}' - f(\bar{u}, \bar{u}')) \varphi = 0$$

$$\implies \exists \lambda \in \mathbb{R} \mid \partial_z f(\bar{u}, \bar{u}') \bar{u}' - f(\bar{u}, \bar{u}') = \lambda$$

$$\inf_{u(1)=0}^{u(0)=h} \int_0^1 \sqrt{\frac{1+u'^2}{u}} dx$$

$$f(t, z) = \sqrt{\frac{1+|z|^2}{t}} \quad T = \int_0^1 \frac{\sqrt{1+v'^2}}{\sqrt{2g(h-v)}} dx \quad \text{problème Bernoulli en 1690 résolu par Euler}$$

en 1740 et Lagrange en 1780.

## 3.2 exercice

**Exercice 1.** (i) montrer que  $\overline{\text{epi } f} = \text{epi } (\tilde{f})$

(ii)  $\tilde{f}(x) = \lim_{r \rightarrow 0+} \inf_{B(x,r)} f = \inf_{(x_n)_{n \rightarrow \infty}} \{ \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \}$

Etape 1 :  $\exists \tilde{f} : X \rightarrow ]-\infty, +\infty] \mid \overline{\text{epi } f} = \text{epi } \tilde{f}$  ( $\tilde{f}$  est donc s.c.i.)

Etape 2 :  $\tilde{f} \leq f$  et  $g$  s.c.i.  $\leq f \implies g \leq \tilde{f} \implies \tilde{f} = f$ .

$$A \supset X \times \mathbb{R}$$

$$1. (x, \alpha) \in A \implies (x, \beta) \in A \quad \forall \beta \geq \alpha$$

$$2. \exists \tilde{f} : X \rightarrow ]-\infty, +\infty] \mid A = \text{epi } \tilde{f}.$$

$$(1) \iff (2)$$

$$x \in XI(x) = \{ \alpha \in \mathbb{R} \mid (x, \alpha) \in A \}. \text{ D'après (1). } \alpha \in I(x) \implies \beta \in I(x) \forall \beta \geq \alpha.$$

Posons  $\tilde{f}(x) = \inf \{ I(x) \}$ . On a donc  $I(x) = \begin{cases} [f(x), +\infty] \\ \mathbb{R} \text{ si } \tilde{f}(x) = -\infty \end{cases}$

$$\text{epi } \tilde{f} = \{ (x, \alpha) \mid \tilde{f}(x) \leq \alpha \}$$

**etape 1**  $\exists \tilde{f} : X \rightarrow ]-\infty, +\infty] \mid \overline{\text{epi } f} = \text{epi } \tilde{f}$  ( $\tilde{f}$  est donc s.c.i.)  $A = \overline{\text{epi } f}$  est un fermé de  $X \times \mathbb{R}$ . Soit  $(x, \alpha) \in A$  et  $\beta > \alpha$ . Alors  $\exists (x_n, \alpha_n) \in \text{epi } f \mid x_n \rightarrow x, \alpha_n \rightarrow \alpha, f(x_n) \leq \alpha_n \quad \forall n \implies f(x_n) \leq \beta$  pour  $n$  grand  $\implies (x_n, \beta) \in \text{epi } f \implies (x, \beta) \in \overline{\text{epi } f}$  donc  $(x, \beta) \in A \quad \forall \beta \geq \alpha$ .

Alors  $A = \text{epi } \tilde{f}$  où  $\tilde{f}(x) = \inf \{ \alpha \mid (x, \alpha) \in \overline{\text{epi } f} \}$

Conclusion :  $\text{epi } \tilde{f} = \overline{\text{epi } f}$  et  $\tilde{f}$  est s.c.i.

De plus  $\text{epi } f \subset \overline{\text{epi } f} = \text{epi } \tilde{f} \implies \tilde{f} \leq f$ .

Soit  $g$  s.c.i.  $\leq f$ . alors  $\text{epi } g \supset \text{epi } f$ .

$$\begin{cases} \text{epi } g \text{ fermé} \\ \text{epi } g \supset \text{epi } f \end{cases} \implies \text{epi } g \supset \overline{\text{epi } f} = \text{epi}(\tilde{f}) \implies f \leq \tilde{f}.$$

Donc on a bien  $\tilde{f}(x) = \sup\{g(x) \mid g \text{ s.c.i. } \leq f\} \stackrel{\text{def}}{=} \bar{f}(x)$ . QED i)

Preuve de ii). Posons  $h(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \inf_{B(x,r)} f = \sup_{r > 0} \inf_{B(x,r)} f$ .

Alors  $h(x) \leq f(x) \forall x$  (car  $\inf_{B(x,r)} f \leq f(x) \forall r > 0$ )

Posons  $h_n(x) = \inf_{B(x, \frac{1}{n})} f$ . Alors  $h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = \sup_n h_n(x)$

$$\inf\{f(y), \|y - x\| < \frac{1}{n}\} = h(x) \leq \alpha \implies h_n(x) \leq \alpha, \forall n.$$

$$\forall n \exists x_n \mid \|x_n - x\| \leq \frac{1}{n}, f(x_n) \leq \alpha \implies (x_n, \alpha) \in \text{epi } f \forall n \implies (x, \alpha) \in \overline{\text{epi } f}.$$

Donc  $\text{epi } h \subset \stackrel{\text{epi } f}{=} \text{epi } \tilde{f} \implies h \geq \tilde{f}$

$$(x, \alpha) \in \text{epi } \tilde{f} \implies (x, \alpha) \in \widehat{\text{epi } \tilde{f}} \implies \exists (x_n, \alpha_n) \mid f(x_n) \leq \alpha_n \text{ ex } x_n \rightarrow x, \alpha_n \rightarrow \alpha.$$

On a  $\forall r > 0 \inf_{B(x,r)} f \leq \alpha$ . En effet  $x_n \rightarrow x \implies \exists N \mid x_n \in B(x, r) \forall n \geq N \implies f(x_n) \geq \inf_{B(x,r)} f, \forall n \geq N \implies \alpha_n \geq \inf_{B(x,r)} f \forall n \geq N$ .

Donc  $h(x) \leq \alpha$  i.e.  $(x, \alpha) \in \text{epi } h$ .

Conclusion  $\text{epi } \tilde{f} \subset \text{epi } h \subset \text{epi } \tilde{f} \implies h = \tilde{f}$ .

### 3.3 exercice 2

$j_C(x) = \inf\{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in C\}$   $A$  ouvert non vide ( $0 \in A$ )  $p(x) = j_A(x)$  sous additive 1 homogène.  $x_0 \neq 0 \ V = \{tx_0, t \in \mathbb{R}\} f(tx_0) = t$

$f \leq p$  sur  $V$ ?  $f(tx_0) \leq p(tx_0)$  car  $t \leq j_A(tx_0) \iff t \leq 0$  ok

$\forall t > 0 j_A(tx_0) = t j_A(x_0) > t$  car  $j_A(x_0) > 1$  D'après HB  $\exists \tilde{f} : X \rightarrow \mathbb{R}$  lineaire telle que  $\tilde{f} = f$  sur  $V$   $\tilde{f}(x) \leq p(x) \forall x \in E$ .

Puisque  $0 \in A$  ouvert,  $\exists M > 0 \mid j_A(x) \leq M\|x\| \implies \tilde{f}(x) \leq M\|x\| \implies \tilde{f} \in X^*$ .

$\tilde{f} \leq j_A$  sur  $X \implies$

$f(x) < 1 \forall x \in A$

$A \in \{\tilde{f} \leq 1\}$   $\mathbb{R}$  espace affine fermé.  $H = \{\tilde{f} = 1\}$  hyperplan affine  $x_0 \neq 0 \ V = \{tx_0, t \in \mathbb{R}\} f(tx_0) = t$ . Donc  $f \leq p$  sur  $V$ .

$A$  ouvert convexe  $B$  convexe.  $A \cap B \neq \emptyset$ .

Posons  $C = A - B = \{a - b \mid (a, b) \in A \times B\}$

$A \cup B = \emptyset \iff 0 \notin C$ .  $A, B$  convexes  $\implies C$  est convexe  $A$  ouvert  $\implies C$  ouvert, car  $C = \cup_{b \in B} (A - \{b\})$

D'après 2) applique à  $C$  et à  $x_0 = 0$ .  $\exists f \in X^*$  tel que  $\sup_C f \leq f(0) = 0$

Or  $\sup_C f = \sup\{f(a - b) \mid (a, b) \in A \times B\} = \sup\{f(a) - f(b) \mid a \in A, b \in B\} = \sup_A f + \sup_B(-f) = \sup_A f - \inf_B f$ .

$F$  fermé,  $K$  compact  $F \cap K = \emptyset$ .  $\exists \varepsilon > 0$  tel que  $F_\varepsilon \cap K_\varepsilon = \emptyset$ .

$\exists \varepsilon > 0$  tel que  $F_\varepsilon \cap K_\varepsilon = \emptyset \iff F_\varepsilon = \{x \in X \mid d(x, F) < \varepsilon\}$  et  $K_\varepsilon = \{x \in X \mid d(x, K) < \varepsilon\}$

$F_\varepsilon$  et  $K_\varepsilon$  sont des ouverts car  $d(\cdot, F)$  et  $d(\cdot, K)$  sont continue.

$\beta = \inf_{y \in K} \|y - z\| > 2\varepsilon \implies K_\varepsilon \cap F_\varepsilon = \emptyset$ .

$x \in F_\varepsilon \cap K_\varepsilon : d(x, F) < \varepsilon \implies \exists y \in F \|x - y\| < \varepsilon$  et  $d(x, K) < \varepsilon \implies \exists y \in K \|x - y\| < \varepsilon$

$\implies \|y - z\| < 2\varepsilon$ .

$A \cap B = \emptyset \iff 0 \notin C$ .  $A, B$  convexes  $\implies C$  est convexe.  $A$  ouvert  $\implies C$  ouvert car  $C = \cup_{b \in B} (A - \{b\})$

Supposons  $\beta = 0$ . Alors  $\exists(y_n, z_n) \in K \times F$ . Tel que  $\|y_n - z_n\| \rightarrow 0$ .

$K$  compact  $\implies \exists \bar{y} \in K \exists n_k | y_{n_k} \rightarrow \bar{y} \implies z_{n_k} \rightarrow \bar{y}$

$F$  fermé  $z_{n_k} \in F \implies \bar{y} \in F$  impossible  $\varepsilon < \frac{\beta}{2} \implies K_\varepsilon \cap F_\varepsilon = \emptyset$ .

Donc  $\exists f \in X^*$  tel que  $\sup_{K_\varepsilon} f \leq \inf_{F_\varepsilon} f$ .

$K_\varepsilon = \{x + \varepsilon z \mid x \in K_\varepsilon, \|z\| \leq 1\}$   $F_\varepsilon = \{x + \varepsilon z' \mid x \in F_\varepsilon, \|z'\| \leq 1\}$

$\sup_K f = \sup_{x \in K} \{f(x) - \varepsilon f(z)\} \leq \sup_K f + \varepsilon \|f\|_{X^*}$

$\|z\| < 1$

$|\sup_{K_\varepsilon} f - \sup_K f| \leq \varepsilon \|f\|_{X^*}$   $|\sup_{F_\varepsilon} f - \sup_F f| \leq \varepsilon \|f\|_{X^*}$

$\exists \alpha \in \mathbb{R} f(x) + \varepsilon f(z) \leq \alpha \leq f(y) + \varepsilon f(z') \quad \forall x \in K \quad \forall y \in F \quad \forall \|z\| \leq 1, \forall \|z'\| \leq 1$

$\implies \forall x \in K f(x) \leq \alpha - \varepsilon \|f\| \quad \forall y \in F f(y) \geq \alpha + \varepsilon \|f\| \implies \sup_K \leq \alpha - \varepsilon \|f\| \leq$

$\alpha + \varepsilon \|f\| \leq \inf_F f \implies \sup_K f < \alpha < \inf_F f$