

- ۱- همه موارد زیر از فاکتورهای اکولوژیک کلیدی که ترکیب باکتریایی کانال ریشه نکروتیک را تعیین می‌کنند اندودانتیکس هستند بجز: (اندودانتیکس)
 - الف) مقاومت میزبان
 - ب) فشار اکسیژن
 - ج) مواد مغذی موجود
 - د) تداخلات باکتریال
- ۲- کدام یک از انواع سمان‌های شبیه استخوان داشته و بیشتر در ناحیه آپیکال ریشه دندان‌های پرمولر و مولر دیده می‌شود؟ (اندودانتیکس)
 - الف) سمان اولیه بدون سلول دارای الیاف خارجی
 - ب) سمان ثانویه دارای سلول با الیاف مختلط
 - ج) سمان ثانویه دارای سلول با الیاف داخلی
 - د) سمان بدون سلول الیاف
- ۳- بیماری با درد و تورم لوکالیزه در مخاط باکال دندان پرمولر اول مندیبل مراجعه کرده است. دندان نسبت به دق به شدت حساس بوده و به تست‌های حیاتی پاسخ نمی‌دهد. تشخیص چیست؟ (اندودانتیکس)
 - الف) Asymptomatic apical periodontitis
 - ب) Chronic apical abscess
 - ج) Symptomatic apical periodontitis
 - د) Acute apical abscess
- ۴- به دنبال آسیب طولانی مدت پالپی ناشی از عفونت‌های میکروبی، کدام تغییر در سلول‌های بنیادی اتفاق می‌افتد؟ (اندودانتیکس)
 - الف) Proliferation
 - ب) Migration
 - ج) Differentiation
 - د) Apoptosis
- ۵- تست سرما در دندان‌های قدامی نسبت به دندان‌های خلفی کارآیی دارد و تحلیل لثه حساسیت به تست سرما را می‌دهد. (اندودانتیکس)
 - الف) بیشتر - افزایش
 - ب) کمتر - افزایش
 - ج) بیشتر - کاهش
 - د) کمتر - کاهش
- ۶- وجود کانال‌های کلسیفیه در نمای رادیوگرافی و مشاهده مینای هایپومینرالیزه در نمای کلینیکی مطرح کننده کدام یک از شرایط سیستمیک می‌تواند باشد؟ (اندودانتیکس)
 - الف) دیابت نوع II
 - ب) بیماری ایدز
 - ج) آنمی داسی شکل
 - د) پلی مورفیسم ژنتیکی
- ۷- در معاینه دندان مولر اول مندیبل، آبسه محدود با تورم مختصر در لثه باکال دیده می‌شود. دندان ترمیم وسیعی داشته و به تست‌های حیاتی پاسخ نمی‌دهد، در پرپودنتال پروبینگ، یک پاکت منفرد عمیق در ریشه دیستال وجود دارد. احتمال کدام نقص بیشتر است؟ (اندودانتیکس)
 - الف) پرپودنتال اولیه با منشأ پرپودانتیک
 - ب) پرپودنتال اولیه با منشأ اندودانتیک
 - ج) پرپودنتال اولیه با منشأ اندودانتیک - پرپودانتیک
 - د) پرپودنتال اولیه اندودانتیک ثانویه
- ۸- در تزریق بی‌حسی انفیلتراسیون برای دندان مولر اول ماگزلا کدام روش بیشترین تأثیر را در افزایش طول مدت بی‌حسی دارد؟ (اندودانتیکس)
 - الف) افزایش حجم محلول بی‌حسی و تکرار آنفیلتراسیون بعد از ۶۰ دقیقه
 - ب) افزایش غلظت اپی‌نفرین و تکرار آنفیلتراسیون بعد از ۴۵ دقیقه
 - ج) افزایش غلظت اپی‌نفرین و تکرار آنفیلتراسیون بعد از ۶۰ دقیقه
 - د) افزایش حجم محلول بی‌حسی و تکرار آنفیلتراسیون بعد از ۴۵ دقیقه

بیماری با درد متوسط پس از درمان ریشه مولر دوم پایین مراجعه کرده، در تاریخچه بیمار منعی برای استفاده از ترکیبات مشابه آسپیرین وجود ندارد. کدام گزینه جهت کنترل درد بیمار توصیه می‌شود؟ (اندودانتیکس)

الف) Ibuprofen ۶۰۰-۴۰۰ + Acetaminophen ۳۲۵ mg

ب) Acetaminophen ۶۵۰ mg

ج) Acetaminophen ۳۲۵ mg + Oxycodone ۱۰ mg

د) Ibuprofen ۶۰۰-۴۰۰ mg

۹- در رادیوگرافی پری آپیکال تهیه شده از مولر دوم ماگزینا زائده زایگوماتیک سبب محو شدن آپکس ریشه‌های باکال این دندان شده است. برای جدا شدن تصویر زائده زایگوماتیک از آپکس ریشه‌ها چه تغییراتی در زاویه تیوب داده می‌شود؟ (اندودانتیکس)

الف) مزیالی با کاهش زاویه عمودی

ب) دیستالی با کاهش زاویه عمودی

ج) مزیالی با افزایش زاویه عمودی

د) دیستالی با افزایش زاویه عمودی

۱۰- سطح مقطع کدام فایل با بقیه متفاوت است؟ (اندودانتیکس)

الف) Large K-File

ب) Flex-R

ج) Large K-Flex

د) Large K-Reamer

۱۱- به ترتیب حرکت فایل‌ها هنگام آماده سازی دستی کانال به ترتیب از چپ به راست چگونه است؟ (اندودانتیکس)

الف) Twiddling, Reaming, Withdrawal

ب) Twiddling, Withdrawal, Reaming

ج) Reaming, Twiddling, Withdrawal

د) Reaming, Withdrawal, Twiddling

۱۲- **Radix entomolaris** چه نوع تنوع آناتومیکی محسوب می‌شود و مربوط به کدام دندان است؟ (اندودانتیکس)

الف) کانال اضافه در مزیال مولر مندیبل

ب) ریشه اضافه در مور مندیبل

ج) ریشه اضافه در پرمولر مندیبل

د) کانال اضافه در مولر ماگزینا

۱۳- در کدام تکنیک آماده سازی کانال ابتدا از ابزارهای بزرگ تر و سپس از ابزارهای کوچکتر استفاده می‌شود؟ (اندودانتیکس)

الف) Standard technique

ب) Step- back technique

ج) Pssive step-back technique

د) Differentiation

گزینه ج صحیح است.

۱۴- دلیل اصلی شکستگی عمودی ریشه کدام است؟ (اندودانتیکس)

الف) پر کردن کانال با تکنیک تراکم جانبی

ب) سمان کردن پست داخل کانال

ج) قالبگیری از کانال برای ساخت پست

د) آماده سازی کانال با وسایل چرخشی

۱۵- استفاده از کدام مورد، قابل پیش‌بینی‌ترین (most predictable) روش برای حذف خمیرهای سخت از داخل کانال می‌باشد؟ (اندودانتیکس)

الف) پی‌زوریمر

ب) فایل C+

ج) گیتس گلیدن

د) اولتراسونیک

۱۶- در کدام گزینه امکان بروز شکستگی در هر دو بعد مزیدیستالی و فاسیولینگوالی وجود دارد؟ (اندودانتیکس)

الف) Split tooth

ب) Fractured cusp

ج Craze line

د tooth Cracked

۱۷- ضخامت مناسب برای رابردم کدام است و به چه علت توصیه می‌شود؟ (ارتودانتیکس)

الف) ضخیم / تطابق مناسب‌تر با لبه لثه

ب) نازک / تطابق مناسب‌تر با لبه لثه

ج) متوسط / کنار زدن مناسب‌تر بافت

د) خیلی ضخیم / عدم پاره شدن هنگام استفاده

۱۸- در صورتی که دندان با آپکس نابالغ دارای علائم پالپیت برگشت پذیر حین برداشت پوسیدگی اکسپوز شود کدام درمان مناسب‌تر است؟ (ارتودانتیکس)

الف) Revascularization

ب) Apexogenesis

ج) MTA plug

د) Full pulpectomy

۱۹- در کدام دو آسیب زیر، مدت زمان اسپیلینت مشابه است؟ (ارتودانتیکس)

الف) Avulsion یا Replantation در زمان کمتر از ۱ ساعت - Lateral luxation

ب) Avulsion یا Replantation در زمان کمتر از ۱ ساعت - Extrusion

ج) Avulsion یا Replantation در زمان بیشتر از ۱ ساعت - Subluxation

د) Avulsion یا Replantation در زمان بیشتر از ۱ ساعت - Extrusion

۲۰- کدام یک از دندان‌های زیر بیشترین تغییر در تعداد را در گونه‌های مختلف از پستانداران اولیه (Basic Mammalian) تا انسان‌های امروزی به خود اختصاص می‌دهند؟ (ارتودانتیکس)

الف) انسیزور

ب) کانین

ج) پره مولر

د) مولر

۲۱- کدام یک از مناطق آناتومیک زیر کمترین نواحی رشد مزانشیمال را داراست؟ (ارتودانتیکس)

الف) کاسه سر

ب) کرانیال بیس

ج) ماگزایلا

د) مندیبل

۲۲- کدام یک از گزینه‌های زیر، سن دندان‌های شکل شماتیک زیر را نشان می‌دهد؟ (ارتودانتیکس)

الف) ۶

ب) ۸

ج) ۹

د) ۱۰

۲۳- بر اساس مطالعات انجام شده درباره الگوی تنفسی و پیدایش مال اکلون کدام مورد صحیح است؟ (ارتودانتیکس)

الف) تنفس از راه دهان باعث ایجاد الگوی Long face می‌شود.

ب) در اکثر افراد long face، شواهدی از انسداد بینی وجود ندارد.

ج) روش تشخیصی تنفس دهانی، بررسی lip incompetency می‌باشد.

د) چند سال متعاقب آدنوئیدکتومی، ارتفاع صورت به حد افراد نرمال کاهش می‌یابد.

۲۴- در ارتباط با تأثیرات ژنتیک پر مال اکلون کدام گزینه صحیح می‌باشد؟ (ارتودانتیکس)

الف) تأثیر اختلاط نژادی multiplicative (تصادفی) است.

ب) کمترین توارث پذیری در مشخصات دندان‌ها، مربوط به اوربایت است.

ج) دیپ بایت اسکلتال، رتبه اول میزان توارث پذیری را دارد.

د) میزان توارث پذیری صفات دندان‌ها با افزایش سن کاهش می‌یابد.

۲۵- بر اساس آنالیز اجزای متقابل انلو (Enlow's counterpart Analysis) کدام دو جزء ذکر شده، متقابل هم هستند؟ (ارتودانتیکس)

الف) طول کرانیال فوسای میانی - عرض راموس مندیبل

- (ب) طول ماگزینا - مجموع طول تنه و عرض راموس مندیبل
(ج) طول کرانیا فوسای قدامی - مجموع طول تنه و عرض راموس مندیبل
(د) طول کرانیال فرسای میانی - طول ماگزینا

۲۶- در صورتی که به جای استفاده از پلن فرانکفورت معمول از پلن SN برای ترسیم پلن فرانکفورت در سفالومتری جانبی استفاده کنیم، **Accuracy و Reliability** به ترتیب از راست به چپ چه تغییری می‌کند؟ (ارتودانتیکس)

- (الف) کاهش - کاهش
(ب) کاهش - افزایش
(ج) افزایش - افزایش
(د) افزایش - کاهش

۲۷- بر اساس نظر پروفیت روش ارجح برای اصلاح پلن اکلوزال در بیمار ۱۱ ساله **Class II/short face** (دفی شنسی مندیبل) با کرواسی عمیق، کدام است؟ (ارتودانتیکس)

- (الف) اینتروژن واقعی قدامی‌های مندیبل با دستگاه ثابت
(ب) اکستروژن واقعی دندان‌های خلفی با الاستیک‌ها
(ج) دستگاه فانکشنال ثابت مانند Herbs
(د) دستگاه فانکشنال ثابت مانند Herbst

۲۸- موقعیت مناسب انسیزورهای ماگزینا و میزان زاویه مناسب پلن مندیبل با فرانکفورت (**FMA**) برای درمان بیمار با نقصان رشدی ماگزینا با استفاده از **Reverse Headgear** به ترتیب از راست به چپ چیست؟ (ارتودانتیکس)

- (الف) پروتروژن - کاهش یافته
(ب) رتروژن - کاهش یافته
(ج) پروتروژن - افزایش یافته
(د) رتروژن - افزایش یافته

۲۹- کدام یک از پدیده‌های بیولوژیک زیر در کنترل حرکت ارتودنتیک دندان‌ی دیده نمی‌شود؟ (ارتودانتیکس)

- (الف) Convection current
(ب) streaming potential
(ج) conduction current
(د) Reverse piezoelectric effect

۳۰- بهترین روش و زمان مناسب تشخیص برای بیماران مستعد به تحلیل ریشه لوکالیزه شدید تحت درمان ارتودنسی ثابت چیست؟ (به ترتیب از راست به چپ) (ارتودانتیکس)

- (الف) گرفتن تاریخچه دقیق از بیمار - قبل از شروع درمان
(ب) انجام تست‌های ژنتیکی - ۶ تا ۹ ماه پس از شروع درمان
(ج) ارزیابی میزان تحلیل ریشه در پانورامیک - ۶ تا ۹ ماه پس از شروع درمان
(د) ارزیابی مورفولوژی ریشه در پانورامیک - قبل از شروع درمان

۳۱- تصمیم مناسب برای کانین دائمی اکتوپیک فک بالا که با ریشه لترال دائمی اورلپ دارد و باعث ایجاد تحلیل در آن شده است چیست؟ (ارتودانتیکس)

(الف) follow up به مدت شش ماه

- (ب) خارج کردن دندان کانین شیری و follow up به مدت سه ماه
(ج) جراحی اکسپوژر کانین دائمی و هدایت آن با نیروی ارتودنسی
(د) خارج کردن دندان کانین شیری و follow up به مدت شش ماه

۳۲- در بیماری با آسیمتری و نقص رشدی در سمت چپ صورت، می‌خواهیم دستگاه فانکشنال هیبرید بسازیم، کدام گزینه مشخصه دستگاه را درست بیان نموده است؟ (ارتودانتیکس)

- (الف) باکال شیلد در سمت راست پلاک قرار داده می‌شود.
(ب) لینگوال شیلد در سمت چپ پلاک قرار داده می‌شود.
(ج) بایت بلاک خلفی بین دندان‌های سمت چپ قرار داده می‌شود.
(د) جهت جبران آسیمتری، باید میزان جلوآوردن فک در سمت راست بیشتر باشد.

۳۳- بنابر عقیده پروفیت، در کدام یک از مال اکلوزن‌های دندان‌ی زیر، دستگاه ثابت **whip spring** فک بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (ارتودانتیکس)

الف) Anterior Crossbite

ب) Posterior Crossbite

ج) Midline Diastema

د) Anterior Openbite

۳۴- در یک کودک ۹ ساله به علت تروما، دندان سانتالال راست بالا دچار جابه‌جایی لبیو لینگوآلی شده است. اقدام درمانی صحیح برای وی کدام است؟ (ارتودانتیکس)

الف) با فشار انگشت، دندان را به محل صحیح هدایت کرده و ۷ تا ۱۰ روز اسپلینت می‌کنیم.

ب) با حرکت ارتودنتیک، دندان را به محل صحیح هدایت کرده و یک هفته فیکس می‌کنیم.

ج) ده روز اسپلینت کرده و سپس با دستگاه‌های ارتودنسی، موقعیت آن را اصلاح می‌کنیم.

د) کانال ریشه را با کلسیم هیدروکساید پر کرده و سپس اسپلینت می‌کنیم. پس از follow up با دستگاه ارتودنسی موقعیت آن را اصلاح می‌کنیم.

۳۵- بیماری ۱۰ ساله با مشکل missing دو طرفه لترال‌های ماگزایلا، مال اکلوزن دندانی کلاس دو همراه با پروتروژن مختصر سانتالال‌های بالا و دیاستم وسیع مراجعه کرده است. بهترین درمان برای بیمار مربوطه کدام است؟ (ارتودانتیکس)

الف) بستن دیاستم و کشیدن انتخابی دندان‌های شیری برای رویش مزیالی سایر دندان‌ها.

ب) بستن دیاستم و تلاش برای باز کردن فضا جهت جایگذاری دندان‌های لترال با ایمپلنت.

ج) تعویق درمان تا رویش تمام دندان‌های دائمی و استفاده از TAD برای حرکت مزیالی دندان‌ها.

د) بستن دیاستم و تلاش برای رویش مزیالی کانین دائمی و حفظ کانین شیری در محل دندان پره مولر.

۳۶- کدام‌یک از تغییرات زیر پس از درمان growth modification با face mask اتفاق می‌افتد؟ (ارتودانتیکس)

الف) افزایش اوربایت

ب) کاهش زاویه SNA

ج) چرخش forward در پلن مندیولار

د) چرخش downward در خلف ماگزایلا

۳۷- پسر ۱۲ ساله‌ای با اورجت ۱۰ میلی‌متری تحت درمان با دستگاه فانکشنال است. در صورت ایجاد پاسخ مناسب پس از چند ماه نیاز به ساخت دستگاه جدید وجود دارد؟ (ارتودانتیکس)

الف) ۴ تا ۸

ب) ۶ تا ۱۲

ج) ۴ تا ۶

د) ۱۲ تا ۱۴

۳۸- علت اولیه ریلیس دندان‌ها پس از درمان ارتودنسی چیست؟ (ارتودانتیکس)

الف) رشد افتراقی فکین

ب) بازگشت الاستیک الیاف لثه

د) بازگشت الاستیک الیاف لثه

۳۹- کدام‌یک از موارد زیر در پسرها، در مرحله سوم رشدی بلوغ دیده نمی‌شود؟ (ارتودانتیکس)

الف) شروع رویش مو روی لب بالا

ب) شروع جهش در رشد عضلانی

ج) شروع رویش مو در زیر بغل

د) افزایش توزیع چربی زیر جلدی

۴۰- کدام‌یک از مهم‌ترین عوارض طولانی مدت هرپس زوستر می‌باشد؟ (بیماری‌های دهان و فک و صورت)

الف) نورالژی پست هرپتیک

ب) تب

ج) لنفادنوپاتی

د) هیپرپیگمانتاسیون

۴۱- شایع‌ترین مکان بروز زخم اثوزینوفیلیک در مخاط دهان بزرگسالان کدام گزینه می‌باشد؟

الف) کام نرم

ب) خلفی طرفی زبان

ج) وینترال زبان

د) عمق وستیبول

۴۲- بیمار خانم ۴۰ ساله با ضایعات زخمی تاولی متعدد در دهان و چشم مراجعه کرده است. در بررسی میکروسکوپی تاول زیر اپی تلیالی دیده شده است، اولین تشخیص کدام است؟

الف) پمفیگوییید بولوز

ب) پمفیگوییید غشای مخاطی

ج) پمفیگوس ولگاریس

د) پمفیگوس پارانتوپلاستیک

۴۳- پسر بچه ۶ ساله‌ای با ضایعات دهانی دردناک و متعدد به دنبال تب، آبریزش بینی و سوزش گلو که از دو روز پیش آغاز شده ارجاع شده است و ضایعات دهانی منتشر به صورت تاول‌های ریز و در بعضی جاها زخم‌های کوچک، همراه با التهاب لبه آزاد لثه می‌باشد. لنفادنوپاتی ناحیه تحت فکی دو طرفه در بیمار مشاهده می‌شود. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

الف) منونوکلئوز عفونی

ب) هرپانژین

ج) افت هرپتی

د) هرپس سیمپلکس اولیه

۴۴- همه گزینه‌ها در مورد خط اول درمان نورالژی بعد از زونا صحیح می‌باشد به جز:

الف) لیدوکانین موضعی

ب) گاباپنتین

ج) ضد درد اپیوئیدی

د) کاسایسین موضعی

۴۵- مرد ۴۵ ساله‌ای با شکایت از زخم‌های دهانی در گونه و مخاط لب، کونژیکتویت و آرتریت زانوها مراجعه کرده است، بهترین تشخیص کدام است؟

الف) پمفیگوس پارانتوپلاستیک

ب) سندرم بهجت

ج) پمفیگوییید سیکاتریکال

د) اریتم مولتی فرم

۴۶- خانمی با عفونت دندانی تحت درمان با آموکسی سیلین و مترونیدازول می‌باشد. وی به علت قرمزی منتشر همراه با سوزش سطح دورسال زبان و گلو به شما مراجعه می‌کند. تشخیص چیست؟

الف) کاندیدیازیس با غشای کاذب

ب) کاندیدیازیس اریتماتو

ج) گلوسیت لوزی شکل میانی

د) استوماتیت جغرافیایی

۴۷- برای بیمار مبتلا به دنچر استوماتیت که نیستاتین دریافت می‌کند. جهت ضد عفونی کردن دنچر، کدام محلول توصیه نمی‌شود؟

الف) نرمال سالین

ب) کلرهگزین

ج) آلکالین پراکسیداز

د) آلکالین هیپوکلریت

۴۸- در کدام یک از ضایعات احتمال تغییرات بدخیمی مطرح شده است؟

الف) پیوژنیک گرانولوما

ب) ژانت سل گرانولوما

ج) اپولیس فیشوراتوم

د) فیبروما

۴۹- آقای ۲۴ ساله به دلیل برجستگی کوچک روی زبان که از دو ماه پیش به وجود آمده است، مراجعه کرده است. همه موارد در فهرست تشخیص افتراقی ضایعه قرار می‌گیرد به جز:

الف) پیوژنیک گرانولوما

ب) فیبروم تحریکی

ج) اسکواموس پاپیلوما

د) ژانت سل گرانولوما

- ۵۰- نام خانم ۲۵ ساله با ضایعه برجسته متصل به لثه چسبنده مجاور دندان کانین فک بالا، به ابعاد کوچکتر از یک سانتی متر همرنگ مخاط، بدون خونریزی و سطح صاف و قاعده پهن مراجعه کرده است. بهترین تشخیص کدام است؟
- الف) پیوژنیک گرانولوما
ب) ژانت سل محیطی
ج) فیبروم اسیفیه محیطی
د) اسکواموس پاپیلوما
- ۵۱- احتمال ایجاد سیالومتاپلازی نکروزانت در کدام ناحیه دهان کمتر می باشد؟
- الف) لب
ب) رترومورلارید
ج) گونه
د) لثه
- ۵۲- کدام مورد از علل بالا بودن احتمال تشکیل سنگ در غده بزاقی تحت فکی نیست؟
- الف) ترشح سروزی بیشتر
ب) پر پیچ و خم بودن مجرا
ج) موقعیت آناتومیک غده
د) میزان کلسیم و فسفات بزاق
- ۵۳- حداکثر INR قابل قبول برای کشیدن دندان در بیماری که وارفارین مصرف می کند چقدر است؟
- الف) ۳/۵
ب) ۳
ج) ۲/۵
د) ۲
- ۵۴- پروفیلاکسی با آنتی بیوتیک در فرد مستعد اندوکاردیت عفونی برای کدام درمان زیر ضروری است؟
- الف) تزریق بیحسی انفیلتره در یک بافت غیر عفونی
ب) تنظیم پلاک متحرک ارتودنسی
ج) ترمیم کلاس دو عمیق دندان مولر فک پایین
د) انجام رادیوگرافی پری آپیکال دندان
- ۵۵- بیمار با سابقه ابتلا به دیابت که روزانه دو عدد قرص متفورمین و یک عدد قرص گلی بن کلامید مصرف می کند با درد دندان مولر سمت راست پایین مراجعه نموده است. پس از انجام پالپوتومی کدام یک از داروهای زیر بهترین گزینه برای کنترل درد بیمار است؟
- الف) آسپرین
ب) دیکلوفناک
ج) مفنامیک اسید
د) استامینوفن
- ۵۶- همه عوارض متعاقب مصرف پروپیل تیواوراسیل گزارش شده است به جز:
- الف) آگرانولوسیتوز
ب) تشکیل سنگ غده بزاقی
ج) لکونی
د) هیپرگلیسمی
- ۵۷- بیماری که به علت آرتريت روماتوئید هر صبح ۵ میلی گرم پردنیزولون مصرف می کند، برای کشیدن دندان مولر اول مراجعه کرده است. کدام اقدامات درمانی برای پیشگیری از بحران آدرنال ضروری نیست؟
- الف) افزایش دوز پردنیزولون به دو برابر
ب) کنترل فشار خون حین درمان
ج) انجام درمان در صبح
د) تجویز بی حسی طویل الاثر
- ۵۸- تجویز کدام داروی ضد درد در سه ماهه سوم بارداری منع مصرف مطلق دارد؟
- الف) ایبوپروفن
ب) اکسی کدون

(ج) هیدروکدون

(د) استامینوفن

۵۹- کدام گزینه در مورد تظاهرات دهانی – دندانی در نارسایی مزمن کلیوی نادرست است؟

(الف) عفونت پاروتید

(ب) اکیموز مخاطی

(ج) هیپولازی مینایی

(د) افزایش پوسیدگی

آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت

۶۰- کدام گزینه با میکروگلوکسی ارتباط دارد؟

(الف) سندرم داون

(ب) هیپوپلازی مندیبل

(ج) آنژیوادم

(د) لنفانژیوم

۶۱- شایع‌ترین تظاهر بالینی عفونت اولیه HSV (ویروس هرپس سیمپلکس) کدام است؟

(الف) فارنژیوگلوکسیت

(ب) ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد

(ج) ضایعات وزیکولار پوستی

(د) ضایعات وزیکولار در قدام و خلف دهان

۶۲- در کلیه بیمای‌های زیر **pulp stone** مشاهده می‌شود به جز:

(الف) regional odontodysplasia

(ب) dentin dysplasia type II

(ج) dentin dysplasia type Id

(د) denionogenesis imperfecta I

۶۳- برای شناسایی کدام ضایعه می‌توان از رنگ آمیزی «ماسون تری کروم» استفاده کرد؟

(الف) لیومیوسارکوما

(ب) لیپوسارکوما

(ج) نوروفیبروسارکوما

(د) آنژیوسارکوما

۶۴- احتمال مشاهده کدام یک از علائم بدخیمی میکروسکوپی در **Ancient schwannoma** بیشتر است؟

(الف) Atypical mitosis

(ب) Hemodiderin deposit

(ج) Nuclear atypia

(د) Infiltrative behavior

۶۵- کدام یک از موارد زیر در پیش‌بینی **occult cervical lymph node metastasis** مهم است؟

(الف) Presence of extracapsular spread

(ب) number of positive nodes

(ج) tumor thickness

(د) tumor grade

۶۶- ملانوسیت‌های دندریتیک خوش‌خیم متعدد در سراسر ضخامت اپی‌تلیوم، در نمای هیستوپاتولوژیکی کدام ضایعه دیده می‌شود؟

(الف) Oral melanoacanthoma

(ب) Oral melanitic macule

(ج) lentigo simplex

(د) Ephelis

۶۷- کدام نوع آفت بعد از بلوغ آغاز می‌شود و بعد از گذشت زمان ممکن است اسکار آن به میزان قابل ملاحظه‌ای رسیده و در موارد نادر باعث

محدودیت در باز کردن دهان شود؟

الف) مینور

ب) ماژور

ج) هرپتی فرم

د) ساده

۶۸- مکان شایع بروز زخم‌های دهانی در بیماری نوتروپنی کدام است؟

الف) لثه

ب) کام

ج) زبان

د) کف دهان

۶۹- موکوپیدرموئید کارسینوما در کدام مورد بدترین پیش‌آگهی را دارد؟

الف) نوع داخل استخوانی

ب) غده بزاقی تحت فکی

ج) غده بزاقی پاروتید

د) غدد بزاقی مینور

۷۰- رنگ آمیزی PTAH جهت تشخیص کدام یک از تومورهای غدد بزاقی مفید خواهد بود؟

الف) pleomorphic adenoma

ب) canalicular adenoma

ج) oncocytoma

د) انکوسیتوما (اکسیفیلیک ادنوما)

۷۱- کدام تغییر در بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات بزاقی سندرم شوگرن مشاهده می‌شود؟

الف) تخریب واحدهای آسینار ناشی از ارتشاح سلول‌های لنفوسیت

ب) هیپرتروفی سلول‌های آسینار، ۲ تا ۳ برابر اندازه نرمال

ج) تجمع گرانول‌های زیموژن در سیتوپلاسم سلول‌های آسینار

د) ساختارهای داکتال پوشیده از سلول‌های مکعبی

۷۲- در نمای هیستوپاتولوژیک بیماری پاژه، تراکول‌های استخوانی چه شکلی بخود می‌گیرند؟

الف) حروف چینی

ب) کروی لایه لایه هم مرکز

ج) ریشه زنجبیلی

د) طرح موزاییکی

۷۳- دختری ۹ ساله با علائم دفورمیتی استخوان‌های دراز، آسیمتری صورت و میگزوم داخل عضله مراجعه نموده است. ابتلا به کدام سندرم

محتمل است؟

الف) Jaffe-Lichtenstein

ب) MC Cune_Albright

ج) Polyostotic Fibrous Dysplasia

د) Mazabraud

۷۴- مشاهده نواحی اپک در رادیوگرافی آملوبلاستومای نوع دسموپلاستیک ناشی از چیست؟

الف) مواد شبه ندانی

ب) متاپلازی اوستوس

ج) استخوان راکتیو

د) مواد مینرالیزه توسط تومور

۷۵- بیشترین شباهت کیست ادنتوژنیک ارتوکاتینیزه با در نظر گرفتن یافته‌های بالینی و رادیوگرافیکی با کدام گزینه زیر است؟

الف) ادنتوژنیک کرانوسیست

ب) دنتی چروس کیست

ج) کیست ادنتوژنیک کلسیفیه

د) لترال پریدنتال کیست

۷۶- در رابطه با ماهیت سلول‌های شبحی در Calcifying odontogenic cyst همه مکانیسم‌های زیر مطرح می‌باشد، به جز:

الف) نکروز انعقادی

(ب) تجمع پروتئین‌های مینایی

(ج) کراتینیزاسیون اپیتلیالی

(د) تأثیر القایی اپیتلیوم مزانشیم

۷۷- «بدشکلی دستکش مانند انگشتان» از علائم کدام بیماری است؟

(الف) پمفیگوس ولگاریس

(ب) پمفیگوئید بولوز

(ج) اپیدرمولایزیس بولوزا

(د) پمفیگوئید غشای مخاطی

۷۸- «تراکم تونوفیلمنت‌های کراتین در ناحیه اطراف هسته سلول‌های لایه‌های سطحی اپی‌تلیوم» در بررسی میکروسکوپی کدام ضایعه دیده می‌شود؟

(الف) Hereditary benign intraepithelial dyskeratosis

(ب) White sponge nevus

(ج) Dyskeratosis congenita

(د) Hereditary mucoepithelial dysplasia

۷۹- «دندان‌های نهفته متعدد با فضا‌های فولیکولی مشخص» با کدام بیماری همراه است؟

(الف) Gaucher disease

(ب) Tay sacks disease

(ج) Niemann pick disease

(د) Mucopolysaccharidosis

پروتزهای دندانی

۸۰- علت irritation hyperplasia در استفاده کنندگان از دنچر چیست؟

(الف) inflammation

(ب) Malignancy

(ج) Vitamine Deficiency

(د) Low grade Truma

۸۱- کدام روش زیر برای انتخاب ساینز دندان‌های پروتز کامل استفاده می‌شود؟

(الف) pair comparison - بیمار مورد را که ترجیح می‌دهد انتخاب می‌کند.

(ب) pair comparison - بیمار موردی را که نمی‌پسندد مشخص می‌کند.

(ج) rejection decision making - بیمار مورد را که ترجیح می‌دهد انتخاب می‌کند.

(د) rejection decision making - بیمار موردی را که نمی‌پسندد مشخص می‌کند.

۸۲- در کدام نوع از چیدمان دندانی می‌توان از آرتیکولاتور ساده استفاده نمود؟

(الف) اکلوزن لینگوالیزه

(ب) منوپلن با رمپ

(ج) منوپلن صفر درجه

(د) منوپلن با قوس جبرانی

۸۳- ریلیف کدام قسمت از دنچر فک بالا جهت اصلاح تغییرات ناشی از پخت اغلب ضروری است؟

(الف) سطح طرفی توبروزیته

(ب) ناحیه سیل خلفی

(ج) ناحیه روگما

(د) فرنوم لبیال

۸۴- کدام گزینه در رابطه با جویدن و عمل بلع در سنین پیری صحیح است؟

(الف) بیشتر شدن جابه‌جایی عمودی فک پایین

(ب) ایجاد اختلال حرکتی در عضله ماستر

(ج) اختلال قابل ملاحظه در بلع

(د) کاهش زمان جویدن

۸۵- دهن کجیکردن (grimace): در ثبت کدامیک از قسمت‌های ریج بی‌دندانی فک پایین مؤثر است؟

الف) شکاف ماستر

ب) شکاف هامولار

ج) رترومولرپد

د) باکال شلف

۸۶- کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های سمان گلاس آینومر محسوب می‌شود؟

الف) خاصیت باکتریوسیدی

ب) ایجاد حساسیت دندانی

ج) نفوذ اسید سمان در توبولهای دندانی

د) حساسیت به رطوبت حین سخت‌شدن

۸۷- کدامیک در مورد نقش trestle design در فریم ورک پروتز ثابت صحیح‌تر است؟

الف) هنگامی که عرض ناحیه بی‌دندانی کم باشد توصیه می‌شود.

ب) ضخامت کافی پرسن در ایمیزور باکال را تأمین می‌کند.

ج) استفاده از آن استحکام کانکتور را کاهش می‌دهد.

د) هنگامی که ضخامت باکولینگوال زیاد باشد توصیه می‌شود.

۸۸- کدام مورد از معایب رزین‌های بیس اکریلیک کامپوزیت (Bis Acrylic Composite resin) در ساخت رستوریشن موقتی محسوب می‌شود؟

الف) وجود منومر آزاد

ب) تغییرات حجمی بالا

ج) تطابق لبه‌ای نامناسب

د) عدم امکان پرداخت مناسب

۸۹- کدام تماس پیشرس سیب شیفت لینگوالی فک پایین نمی‌شود؟

الف) تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپ‌های پالاتال بالا

ب) تماس پیشرس بر روی شیب پالاتالی کاسپ‌های پالاتال بالا

ج) تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپ‌های باکال پایین

د) تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپ‌های لینگوال پایین

۹۰- کدام مشکل در اثر انفیلتریشن گلاس اضافی بر روی کور آلومینوس اکساید ایجاد می‌شود؟

الف) افزایش کروما

ب) افزایش استحکام فشاری

ج) افزایش ترانسلوسیتی

د) کاهش استحکام فشاری

۹۱- لق شدن دنچر فک بالا حین خمیازه کشیده ناشی از چیست؟

الف) ضخیم بودن فلنچ دیستوباکال دنچر بالا

ب) گسترش بیش از حد فانچ در ناحیه دیستال باکال ناچ

ج) گسترش بیش از حد سیل خلفی کامی

د) کوتاه بودن فلنچ دیستوباکال دنچر بالا

۹۲- انتخاب دندان‌های مصنوعی قدامی پروتز کامل در چه مرحله انجام می‌شود؟

الف) قبل از قالب‌گیری اولیه

ب) بعد از تنظیم بیس و ریم

ج) قبل از قالب‌گیری نهایی

د) بعد از قالب‌گیری نهایی

۹۳- کدامیک از موارد زیر از مزایای قالب‌گیری به روش دیجیتالی نیست؟

الف) امکان ارسال سریع اطلاعات به لابراتوار

ب) عدم نیاز به ساخت رستوریشن موقتی

ج) امکان ویرایش قالب در حضور بیمار

د) وجود راهنمای صوتی هنگام اسکن کردن

۹۴- در مواردی که کمتر از نیمی از عاج باقی مانده ولی بیمار مشکل مالی دارد کدام یک از درمان‌های زیر اندیکاسیون دارد؟

الف) کابازیت رزین

ب) آمالگام کمپلکس

ج) کراون

د) انله فلزی

۹۵- بیماری دندان‌های سانترال، لترال و کانین سمت چپ فک پایین را از دست داده است. در صورتی که وضعیت پرپودنتال مناسب باشد طرح درمان انتخابی کدام است؟

الف) بریج ثابت با پایه‌های پرمولرهای همان سمت و سانترال و لترال سمت دیگر

ب) بریج ثابت با یک پایه پرمولر همان سمت و سانترال و لترال سمت دیگر

ج) بریج ثابت با یک پایه پرمولر همان سمت و سانترال سمت مقابل

د) امکان ساخت پروتز ثابت نیست و پروتز پارسیل درمان انتخابی است.

۹۶- کدام یک از جملات زیر در مورد بیشترین مقدار **Disclusion** در دندان‌های خلفی صحیح‌تر است؟

الف) بیشترین میزان آن در سمت کارگر دیده می‌شود.

ب) بیشترین مقدار آن در سمت بالانسینگ دیده می‌شود.

ج) بیشترین مقدار آن همان فضایی است که **buffer space** نامیده می‌شود.

د) بسته به شیب کندیلی بیشترین مقدار می‌تواند در سمت کارگر با بالانس رخ دهد.

۹۷- کدام یک از جملات زیر در مورد انتخاب رنگ صحیح‌تر است؟

الف) تفاوت اصلی در گروه‌های چهارگانه نمونه رنگ ویتا کلاسیک در ولیو است.

ب) هرگاه بین نمونه رنگ روشن‌تر و تیره‌تر تردید داشتیم نمونه روشن‌تر را انتخاب می‌کنیم.

ج) ولیو مشخص کننده بعد کروماتیک کره مانسل است.

د) رنگ B_1 کمترین ولیو را در بین نمونه‌های ویتا کلاسیک دارد.

۹۸- در پروتزهای ثابت پنج واحدی با اباتمنت **Pier** محل مناسب برای قراردهی **key** کدام است؟

الف) دیستال پونتیک دیستالی

ب) دیستال پونتیک مزیالی

ج) مزیاال پونتیک مزیالی

د) مزیاال پونتیک دیستالی

۹۹- میزان تیپر دیواره‌ها در تراش کراون در جهت فاسیولینگوالی کدام دندان از سایرین بیشتر است؟

الف) مولر مندیبل

ب) پرمولر ماگزایلا

ج) پرمولر مندیبل

د) مولر ماگزایلا

۱۰۰- کدام یک از رستوریشن‌های زیر را نمی‌توان به عنوان **RPD abutment** استفاده کرد؟

الف) **partial coverage crown**

ب) **MOD onlay**

ج) **complex amalgam**

د) **all ceramic crown**

۱۰۱- کدام گزینه به جهت شیار استوارت از فوسای مرکزی مولر ماگزایلا اشاره دارد؟

الف) دیستوباکالی

ب) دیستولینگوالی

ج) مزیوبا کالی

د) مزیو لینگوالی

۱۰۲- در کدام یک از انواع پروتزهای پارسیل متحرک از بالانس اکلوزن در حرکات خارج مرکزی استفاده می‌شود؟

الف) پروتز پارسیل انتهای آزاد یک طرفه ماگزایلا

ب) پروتز پارسیل کلاس IV ماگزایلا

ج) پروتز پارسیل انتهای آزاد یک طرفه مندیبل

د) پروتز پارسیل انتهای آزاد دو طرفه ماگزایلا

۱۰۳- کدام مورد از ویژگی‌های رست اکلوزالی توسعه یافته می‌باشد؟

- الف) رست باید بیش از یک سوم عرض مزودیستالی دندان باشد.
- ب) رست باید بیش از یک دوم عرض با کولینگوالی دندان باشد.
- ج) رست همیشه جهت ساپورت بیشتر باید به فرم آنله باشد.
- د) حداقل ضخامت فلز در ناحیه رست باید یک میلی‌متر باشد.

۱۰۴- به کدام یک طبق نظریه گراتوچویل در طراحی اسکلت پروتز پارسیل صحیح‌تر می‌باشد؟

- الف) رست مجاور ناحیه بی‌دندانی از فشرده شدن غذا بین پروتز و دندان پایه جلوگیری می‌کند.
- ب) رست مجاور ناحیه بی‌دندانی شعاع چرخش عمودی تری به بیس می‌دهد.
- ج) با انتقال رست اکلوزالی به قدام شعاع چرخش بیس کوچکتر می‌شود.
- د) با انتقال رست اکلوزالی به قدام، نیرو در سطح وسیع‌تری توزیع می‌شود.

۱۰۵- اتصال دهنده اصلی Anterior-posterior strap بیشتر در کدام کلاس از انواع بی‌دندانی تجویز می‌گردد؟

الف) I, III

ب) II, III

ج) II, IV

د) استرپ

۱۰۶- میزان ریلیف مورد نیاز در زیر اتصال دهنده اصلی فک بالا در کلاس I کندی به تفاوت حرکت بین کدام بافت‌های پوشاننده بستگی دارد؟

- الف) خط وسط کام و بافت پوشاننده ریچ باقیمانده
- ب) خط وسط کام و بافت پوشاننده ناحیه روگا
- ج) خط وسط کام و بافت پوشاننده دامنه‌های طرفی کام
- د) قله ریچ باقیمانده در دو سمت

۱۰۷- بهترین محل قرار دادن نگهدارنده غیر مستقیم در پروتز پارسیل مندیبل بیماری که دندان‌های مولر یک طرف را از دست داده است، کدام است؟

- الف) سینگولوم دندان‌های لترال
- ب) سینگولوم دندان‌های سانترال
- ج) سطح مزیواکلوزال پره مولر اول
- د) سطح مزیواکلوزال پره مولر دوم

۱۰۸- هدف از ساخت Interim obturator در ماگزایلا چیست؟

- الف) جدایی ارتباط بینی و دهان
- ب) ایجاد توانایی جویدن غذا
- ج) نگهداری پانسما جراحی
- د) نگهداری پیوند پوستی

۱۰۹- در مقایسه ویژگی‌های اتچمنت داخل تاجی نسبت به خارج تاجی کدام یک صحیح است؟

- الف) ساپورت ورتیکال بهتری ایجاد می‌کند.
- ب) نیازی به ثبات خارج تاجی اضافی نیست.
- ج) در دندان‌های کوتاه مؤثرترند.
- د) در انواع پروتز پارسیل قابل استفاده‌اند.

جراحی دهان و فک و صورت

۱۱۰- برای تسریع در کاهش تورم بعد از عمل جراحی دهان، استفاده از گرما از چه زمانی می‌تواند شروع شود؟

- الف) در روز عمل
- ب) یک روز بعد عمل
- ج) دو روز بعد از عمل
- د) سه روز بعد عمل

۱۱۱- کدام مرحله از ترمیم زخم به عنوان فاز lag نامیده می‌شود؟

- الف) التهابی
- ب) فیبروبلاستیک

(ج) بلوغ زخم

(د) ریمودلینگ

۱۱۲- حداقل زمان مورد نیاز جهت بیشترین اثر «تنگ کنندگی عروق» اپی نفرین قبل از شروع جراحی چقدر است؟

(الف) ۳ دقیقه

(ب) ۵ دقیقه

(ج) ۷ دقیقه

(د) ۹ دقیقه

۱۱۳- بهترین منبع داخل دهانی کورتیکو – کنسلوس جهت پیوند استخوان اتوژن چیست؟

(الف) راموس

(ب) توبروزیته

(ج) کام

(د) سمفیز

۱۱۴- حداقل تعداد گلبول سفید و پلاکت در میلی متر مکعب خون جهت انجام درمان های معمول دندانپزشکی در بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار گرفته اند به ترتیب از (راست به چپ) کدام است؟

(الف) ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰

(ب) ۳۰۰۰ – ۳۰۰۰

(ج) ۱۰۰۰ – ۴۰۰۰

(د) ۲۰۰۰ – ۵۰۰۰

۱۱۵- خانمی با تشخیص angular cheilitis تحت درمان کلوتریمازول قرار گرفته است بعد از ۳ روز علائم بیماری دیده نمی شود. ادامه درمان چگونه است؟

(الف) ادامه دارو برای ۴ روز دیگر

(ب) ادامه دارو برای ۷ روز دیگر

(ج) ادامه دارو برای ۱۱ روز دیگر

(د) قطع داروی کلوتریمازول

۱۱۶- درمان کدام ضایعه، رزکسیون از انواع marginal و یا parital است؟

(الف) Ameloblastic odontoma

(ب) Osteoblastoma

(ج) Ameloblastic fibroma

(د) Ameloblastic fibro-odontoma

۱۱۷- کودکی ۹ ساله به دنبال تروما دچار شکستگی کنذیل سمت راست و جابه جایی مختصر استخوان در ناحیه شکستگی شده است. درمان مناسب کدام است؟

(الف) فیکساسیون بین فکی به مدت ۱۴-۱۰ روز

(ب) فیکساسیون بین فکی به مدت دو تا سه هفته

(ج) فیکساسیون بین فکی به مدت یک ماه

(د) جابجایی باز همراه با فیکساسیون داخلی

۱۱۸- در کدام یک از آسیب های دندانی ناشی از تروما، زمان فیکساسیون دندان آسیب دیده کوتاه تر است؟

(الف) دندان لق (mobile)

(ب) جابه جایی دندان (Displacement)

(ج) شکستگی ریشه (root fracture)

(د) دندان replant شده با آپکس باز

۱۱۹- در جراحی خارج کردن سنگ غده بزاقی ساب مندیبولار کدام اقدام اشتباه است؟

(الف) قرار دادن بخیه دور مجرا، پروکسیمال نسبت به سنگ

(ب) ایجاد برش طولی در مجرا

(ج) بخیه کردن دوباره جدار مجرا

(د) سیالودو کوپلاستی

۱۲۰- کدام یک از گزینه های زیر درباره subapical osteotomy در مندیبل صحیح می باشد؟

الف) این تکنیک از جراحی‌های شایع در فک پایین می‌باشد.

ب) استئوتومی عمودی، استخوان آلوئول را تا بوردر تحتانی در بر می‌گیرد.

ج) جایگزین مناسبی برای جراحی عقب بردن فک پایین می‌باشد.

د) در مواردی که جلوزدگی صرفاً مربوط به ناحیه دنتوآلوئومر باشد، انجام می‌شود.

۱۲۱- به جز همه گزینه‌ها در ارتباط با نشانه‌های رادیوگرافی **osteoarthritis** مفصل تمپورومندیولار صحیح است به جز؟

الف) افزایش فضای مفصل

ب) اروژن سطح مفصلی

ج) استیوفیت‌ها

د) صاف شدن سر کندیل

۱۲۲- در صورتی که روکش دندانی توسط بیمار آسپره شده باشد و بیمار علائم انسداد راه هوایی داشته باشد؛ اولین اقدام کدام گزینه است؟

الف) انجام رادیوگرافی طرفی گردن

ب) برونکوسکوپی

ج) مانور هایملیخ

د) کریکوتا پروتومی

۱۲۳- داروی جایگزین آتروپین، در موقعیت برادیکاردی علامت‌دار کدام است؟

الف) Epinephrine

ب) Lidocaine

ج) Isoproterenol

د) Verapamil

۱۲۴- کدام جمله در رابطه با **Criothyronay** صحیح است؟

الف) بهترین روش برای کودکان ۳ تا ۵ سال است.

ب) معمولاً با خونریزی زیاد همراه است.

ج) ریسک آسیب به مری در آن پایین است.

د) ترمیم محل جراحی طولانی است.

۱۲۵- کدام گزینه مهم‌ترین سد آناتومیک در برابر انتشار داروی بی‌حسی موضعی می‌باشد؟

الف) اندونوروپوم

ب) پری نوریوم

ج) اپی‌نوریوم

د) غلاف اپی‌نورال

۱۲۶- در رابطه با تکنیک بی‌حسی موضعی **Vazirani-Akinosi** همه گزینه‌های زیر صحیح هستند به جز:

الف) اعصاب حسی زودتر از حرکتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

ب) در مواردی که کانال مندیبل دو شاخه است موفقیت دارد.

ج) در موارد تریسموس، به باز شدن دهان کمک می‌کند.

د) در حین تزریق، سوزن فاقد تمامی استخوانی است.

۱۲۷- مهم‌ترین فاکتور قابل اعتماد برای انجام آسپیراسین صحیح، کدام است؟

الف) طول سوزن

ب) گیج سوزن

ج) روش تزریق

د) محل تزریق

۱۲۸- کدام علت دوبینی بعد از بلوک عصب ماگزیلاری از طریق **Greatoer palatine canal** می‌باشد؟

الف) بلوک منطقه‌ای عصب ابدوسنس

ب) بلوک احتمالی عصب اپتیک

ج) احتمال خونریزی رتروپولبار

د) افزایش حجم محتویات اربیت

۱۲۹- مهم‌ترین ایراد اینترسپتال آلوئولوپلاستی کدام گزینه می‌باشد؟

الف) تشدید تحلیل استخوان

ب) کاهش ارتفاع استخوان

(ج) کاهش عرض استخوان

(د) عدم ثبات جراحی

پریودانتیکس

۱۳۰- اولین و شایع ترین علامتی که بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن فکر می کند کدام است؟

الف) سرخی لثه

ب) خونریزی از لثه

ج) درد لثه

(د) خارش و سوزش لثه

۱۳۱- در رادیوگرافی بیماری رادیولوسنسی با حدود مشخص در قسمت لترال سطح ریشه دندان سانترال بالا دیده می شود. این نما می تواند دال بر

چه مشکلی باشد؟

الف) آبسه پریودنتال

ب) پریودنتیت مزمن

ج) پریودنتیت لوکالیزه مهاجم

(د) ترامای ناشی از آکلوزن

۱۳۲- در یک بیمار با شکایت درد دندان حین سرما در رادیوگرافی افزایش پهنای پریودنتال لیگامنت نیز دیده می شود. امکان رویت کدام یک از

ضایعات زیر در کلینیک بیشتر است؟

الف) ablation

ب) abrasion

ج) abfraction

(د) erosion

۱۳۳- در بیماران مبتلا به پریودنتیت مهاجم (Aggressive periodontitis) معمولاً دندان هایی که از همه دیرتر از دست می روند کدامند؟

الف) کانین و پره مولر اول پایین

ب) کانین و مولرهای بالا

ج) مولر دوم و پره مولرهای پایین

(د) مولر دوم و پره مولرهای بالا

۱۳۴- در فرد مبتلا به پریودنتیت، اگر تحلیل آشکار (visible recession) در باکال کانین معادل ۳ میلی متر و موقعیت واقعی لثه (actual

position of gingival) در ۵ میلی متری cement enamel junction باشد، عمق پروپ چند میلی متر خواهد بود؟

الف) ۲

ب) ۳

ج) ۵

(د) ۸

۱۳۵- در صورتی که پاپیلا و مارژین دندان دچار افزایش حجم لثه شده باشد در کدام Grade از افزایش حجم لثه قرار می گیرد؟

الف) . grade

ب) grade I

ج) grade II

(د) grade III

۱۳۶- پاکت های مارپیچی در کدام ناحیه بیشتر دیده می شوند؟

الف) دیستولینگوال مولر اول پایین

ب) ناحیه انشعاب ریشه

ج) مزو پالاتال مولر دوم بالا

(د) مزولینگوال اولین مولر پایین

۱۳۷- در کدام مرحله از ژنژیویت تغییر در نمای پوست پرتقالی دیده می شود؟

الف) initial

ب) early

ج) established

advanced (د)

۱۳۸- لاکونای تحلیلی توسط کدام یک از انواع سمنتوم پر می شود؟

الف) Acellular Afibrillar cementum

ب) Acellular Extrinsic fiber cementum

ج) Cellular intrinsic fiber cementum

د) Cellular Mixed Stratified Cementum

۱۳۹- منظور از **dentogingival unit** ترکیب کدام یک از نواحی زیر است؟

الف) اپی تلیوم سالکولار و الیاف لثه‌ای

ب) اپی تلیوم جانکشنال و الیاف لثه‌ای

ج) اپی تلیوم جانکشنال و الیاف پریودنتال

د) اپی تلیوم سالکولار و الیاف پریودنتال

۱۴۰- در پاکت‌های پریودنتال عمیق میزان کدام عنصر در جرم دندانی افزایش می‌یابد؟

الف) سدیم

ب) فسفر

ج) پتاسیم

د) منیزیم

۱۴۱- تغییر در کانتور لثه (**gingival contour**) به طور اولیه مرتبط با کدام یک از حالات یا بیماری‌های لثه‌ای است؟

الف) enlargement

ب) recession

ج) desquamation

د) pigmentation

۱۴۲- برای بیماری که با التهاب ژنرالیزه لثه پایی‌های **crater like** با غشا کاذب بر روی آن و **punched out** به شما مراجعه کرده است، کدام یک

از موارد زیر جزو اقدامات اولیه درمانی می‌باشد؟

الف) تجویز سیستمیک آموکسی سیلین و مترونیدازول

ب) کشیدن آرام رول پنبه مرطوب شده به منظور تمیز کردن ناحیه

ج) جرم‌گیری کامل به منظور کاهش التهاب

د) تجویز موضعی آسیکلوویر و مسکن

۱۴۳- در فردی مبتلا به آبسه حاد پریودنتال که دارای پاکت پریودنتال غیر قابل دسترس می‌باشد؛ کدام مورد درمانی انتخاب می‌شود؟

الف) درناژ از طریق پاکت

ب) جراحی فلپ

ج) آنتی بیوتیک سیستمیک

د) کشیدن دندان

۱۴۴- خمیردندان‌های با خصوصیت **tartar control** دارای کدام ماده موثره می‌باشد؟

الف) اکسید آلومینیوم

ب) اکسید سیلیکن

ج) پیروفسفات

د) گرانولار پلی وینیل کلوراید

۱۴۵- کدام روش مسواک زدن فقط حرکت **Vibration** دارد؟

الف) Stillman

ب) Scrub

ج) Fones

د) Leonard

۱۴۶- کدام یک به عنوان افتراق بین آبسه پریودنتال و پالپال می‌باشد؟

الف) وجود درد

ب) فیستول ترکت

ج) حساسیت به دق

د) تحلیل استخوان انگولار

۱۴۷- اولین قدم درمانی در فاز یک درمان‌های پریدنتال کدام است؟

الف) برداشت جرم‌ها

ب) برداشت پوسیدگی‌ها

ج) آموزش کنترل پلاک

د) برداشت اورهنگ ترمیم‌ها

۱۴۸- مهم‌ترین ریسک فاکتور محیطی در پیشرفت بیماری پریدنتال کدام است؟

الف) دیابت

ب) سیگار

ج) ژنتیک

د) استرس

۱۴۹- دندان پرمولر دوم فک بالا در کدام مورد پروگنوز بهتری دارد؟

الف) در فرد مسن‌تر، با عمق پروب ۵ میلی‌متر و تحلیل استخوان ۲ میلی‌متر

ب) در فرد جوان‌تر، با عمق پروب ۵ میلی‌متر و تحلیل استخوان ۲ میلی‌متر

ج) در فرد مسن‌تر، با عمق پروب ۲ میلی‌متر و تحلیل استخوان ۲ میلی‌متر

د) در فرد جوان‌تر، با عمق پروب ۲ میلی‌متر و تحلیل استخوان ۲ میلی‌متر

دندانپزشکی کودکان

۱۵۰- بر اساس مقیاس رتبه‌بندی رفتاری فرانکل، کوکی با شواهدی از نگرش منفی حالت اخمو و گوشه‌گیر (sithdrawn-sullen) در کدام یک از

چهار گروه این طبقه‌بندی جای دارد؟

الف) رتبه ۲ - بی‌میلی به قبول درمان

ب) رتبه ۱ - بی‌میلی به قبول درمان

ج) رتبه ۲ - ترس و وحشت از درمان

د) رتبه ۱ - ترس و وحشت از درمان

۱۵۱- احتمال وجود دندان‌های ناتال و نئوناتال در کدام سندرم زیر بیشتر است؟

الف) سندرم داون

ب) سندرم پیر - رابین

ج) سندرم گاردنر

د) سندرم کلید و کرانیال دیسپلازی

۱۵۲- بر اساس مطالعه متا آنالیز انجام شده توسط Lin و همکارانش اولین ماده انتخابی برای پالپوتومی دندان‌های شیری کدام گزینه می‌باشد؟

الف) Ferric sulfate

ب) MTA

ج) Calcium Hydroxide

د) Formocresol

۱۵۳- برای دو کودک ۲ ساله و ۵ ساله کدامیک از روش‌های مسواک زدن زیر (به ترتیب از راست به چپ)، پلاک دندان‌های بیشتری حذف می‌کند؟

الف) Roll-Horizontal scrubbing

ب) charters-Horizontal scrubbing

ج) Horizontal Scrubbing _Horizontal scrubbing

د) Horizontal scrubbing)Modified Stillman

۱۵۴- ریسک سرطان کشنده در اثر رادیوگرافی تشخیصی در کدام مورد بیشتر است؟

الف) رادیوگرافی full mouth با فیلم سرعت F و rectangular collimation در بیمار ۴ ساله

ب) رادیوگرافی full mouth با فیلم سرعت D و circular collimation در بیمار ۸ ساله

ج) رادیوگرافی full mouth با فیلم سرعت F و circular collimation در بیمار ۶ ساله

د) رادیوگرافی full mouth با فیلم سرعت D و circular collimation در بیمار ۱۲ ساله

۱۵۵- برای کودکی ۸ ساله با ناتوانی ذهنی که دندان‌های پایه زیادی ندارد. به دنبال ترومای Avulsion دندان سانترال ماگزایلا، چه اسپلینتی

توصیه می‌شود؟

الف) براکت و آرچ وایر

(ب) رزین باند شونده و سیم

(ج) رزین باند شونده و بخیه

(د) رزین کامپوزیت باند شونده

۱۵۶- برای کودکی با سابقه لوسمی که تحت درمان شیمی درمانی است. کدام یک از درمان‌های دندانپزشکی قابل انجام است؟

(الف) کشیدن دندان

(ب) پالپکتومی دندان شیری

(ج) آپکوژنز دندان دائمی

(د) پالپوتومی دندان شیری

۱۵۷- در مبتلایان به کدام یک از بیماری‌های زیر، برای عادت کردن بیمار به محیط دندانپزشکی ممکن است نیاز به چندین جلسه ملاقات باشد؟

(الف) سندرم X شکننده

(ب) اوتیسم

(ج) ناتوانی ذهنی

(د) اختلال الککل جنینی

۱۵۸- کدام یک از دهان باز کن‌های زیر به صورت قیچی معکوس عمل کرده و احتمال آسیب به دندان‌ها در صورت عدم استفاده صحیح وجود دارد؟

(الف) Molt Mouth prop

(ب) Open wide mouth prop

(ج) بایت پلاک Mckesson

(د) آپسلانگ پوشش پلر

۱۵۹- طبق جدول kronfeld & logan آخرین دندان مولر شیری که کلسیفیکاسیون مینای آن کامل می‌شود کدام است؟

(الف) مولر دوم ماگزیلا

(ب) مولر دوم مندیبل

(ج) مولر اول ماگزیلا

(د) مولر اول مندیبل

۱۶۰- در حین ارتباط با کودک، استفاده از جمله «تو خیلی آرام و بی حرکت نشسته‌ای» بیانگر استفاده از کدام یک از تکنیک‌های هدایت رفتاری می‌باشد؟

(الف) Euphemism

(ب) Attending

(ج) Distraction

(د) Retraining

۱۶۱- جهت انجام ترمیم در سانترال راست بالا، برغم انجام سوپرایرپوستیال موفق، بیمار درد دارد. چه تزریقی لازم است؟

(الف) تکرار تزریق سوپرایرپوستیال

(ب) اینفراربییتال

(ج) نازو پالاتین

(د) Gow gates

۱۶۲- کدام یک از موارد زیر به صورت مشترک به دنبال استفاده هر یک از مواد فرموکرزول، MTA و سولفات فربک در درمان پالپ زنده دیده می‌شود؟

(الف) انسداد کانال

(ب) ثابت کنندگی

(ج) کمک به التیام

(د) آگلوتینه کردن خون

۱۶۳- برای کودک ۶ ساله با شکایت از دندان درد شبانه که در معاینه دهان کودک پوسیدگی عمیق در دندان مولر دوم شیری مندیبل دیده می‌شود و نمای رادیوگرافیک تنها وسیع شدن PDL را نشان می‌دهد. درمان مورد نیاز برای این دندان چیست؟

(الف) پالپوتومی

(ب) کشیدن دندان

(ج) direct pulp cap

(د) پالپکتومی

۱۶۴- ویژگی اصلی تکنیک Hall در کنترل پوسیدگی دندان‌های مولر شیری کودکان، کدام گزینه زیر می‌باشد؟

الف) باز کردن تماس پوسیدگی بین دندانی

ب) سیل کردن بدون برداشت پوسیدگی

ج) برداشت نسبی پوسیدگی و ترمیم

د) ایجاد FACING در SSC قدامی

۱۶۵- زمان اچ برای مینای غنی از فلوروهیدروکسی آپاتیت و دندان شیری نسبت به مینای طبیعی دندان دائمی به ترتیب (از راست به چپ) چگونه است؟

الف) کمتر - بیشتر

ب) کمتر - کمتر

ج) بیشتر - بیشتر

د) بیشتر - کمتر

۱۶۶- در کودکی ۴ ساله و مبتلا به هیپوفسفاتازیا کدام ویتامین و به چه دلیل در سرم وی افزایش پیدا می‌کند؟

الف) B^۶ - نقص فعالیت آلکالین فسفاتاز

ب) D^۳ - کمبود کلسیم در بدن

ج) C- نقص ارثی پیش ساز این ویتامین

د) B^۱ - کمبود فسفو اتانول آمین

۱۶۷- مقدار فلوراید بلعیده شده در حین فلوراید تراپی با وارنیش فلوراید، نسبت به کاربرد موضعی ژل فلوراید، حدوداً چقدر است؟

الف) یک دوم تا یک پنجم

ب) یک پنجم تا یک دهم

ج) یک دهم تا یک بیستم

د) یک بیستم تا یک سی‌ام

۱۶۸- در بیماران مبتلا به بولمیا کدام یک از عوارض زیر با شیوع بیشتری دیده می‌شود؟

الف) هیپوکالمی

ب) التهاب مری

د) اختلال مایعات و الکترولیت

۱۶۹- در مورد خصوصیات مورفولوژیک کانین‌های شیری ماگزیلا و مندیبل، کدام گزینه صحیح است؟

الف) طول تاج کانین مندیبل بلندتر از طول تاج کانین ماگزیلا است.

ب) طول ریشه کانین ماگزیلا حدود ۲ میلی‌متر بلندتر از کانین مندیبل است.

ج) طول ریشه کانین ماگزیلا بیش از ۱/۵ برابر طول تاج خودش است.

د) ناحیه اپیکال ریشه کانین ماگزیلا، تمایل مزیالی دارد.

ترمیمی

۱۷۰- کدام گزینه در مورد جهت لاملاهای مینایی صحیح است؟

الف) از درون عاج به طرف مینا

ب) از سطح مینا به درون عاج

ج) از DEJ به درون عاج

د) از DEJ به طرف سطح مینا

۱۷۱- در صورت حساسیت پایین در یک آزمون تشخیصی چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

الف) بیمار دارای نتیجه مثبت از آزمون تشخیصی با احتمال بیشتری بیمار نمی‌باشد.

ب) دندانپزشک اطمینان بیشتری دارد که وضعیت تشخیص داده شده همانی است که در واقع وجود دارد.

ج) بسیاری از افراد که نتیجه آزمون آنها منفی است، در واقع بیمارانی بوده‌اند که سالم قلمداد شده‌اند.

د) افراد بدون بیماری به احتمال زیاد طی آزمون، منفی قلمداد خواهند شد.

۱۷۲- حجم کلی تخلخل در کدام ناحیه پوسیدگی اولیه مینایی بیشتر است؟

الف) Surface

ب) Body

ج) Dark

د) Translucent

۱۷۳- با توجه به منحنی Stephan، کدام گزینه در مورد تغییرات pH در پوسیدگی درست است؟

- الف) در افراد با فعالیت پوسیدگی متوسط، پس از اکسپوژر، به سوکروز، pH به مدت ۱ ساعت کمتر از ۵/۵ می ماند.
ب) در افراد با فعالیت پوسیدگی شدید، پس از اکسپوژر به سوکروز، pH پس از ۱ ساعت به بالای ۵/۵ می رسد.
ج) در افراد با فعالیت پوسیدگی متوسط، پس از اکسپوژر به سوکروز، pH پس از ۲۰ دقیقه به بالای ۵/۵ می رسد.
د) در افراد با فعالیت پوسیدگی شدید، پس از اکسپوژر به سوکروز، pH پس از ۲۰ دقیقه به بالای ۵/۵ می رسد.

۱۷۴- زاویه Cavosurface سطح ریشه، در کدام مورد bevel می شود؟

الف) ترمیم آمالگام

ب) ترمیم کامپوزیت

ج) ترمیم پرسلن

د) ترمیم فلزی ریختگی داخل تاجی

۱۷۵- کدام یک از محلول های زیر که برای کنترل خونریزی پالپ در درمان Direct pulp capping استفاده می شوند درد افزایش یافته ای را پس از درمان؛ در مطالعات کلینیکی نشان می دهد؟

الف) هیپوکلریت سدیم ۱/۲۵ درصد

ب) هیپوکلریت سدیم ۵/۲۵ درصد

ج) کلر هگزیدین ۲ درصد

د) مواد هموستاتیک حاوی سولفات آهن

۱۷۶- کدام قلم کارور برای برداشت اورهنگ (overhang) آمالگام از کانتور ترمیم های کاملاً ست (set) شده مناسب است؟

الف) کارور Wall ۳

ب) کارور داسی شکل ۱۴L

ج) کارور هولنباخ (Hollenback)

د) کارور کلونید - دیسکوئید (Cleoid- Discoid)

۱۷۷- کدام آلیاژ آمالگام نیاز به جیوه کمتری برای مخلوط شدن دارد؟

الف) آمالگام با ذرات مخلوط (admixed)

ب) آمالگام با ذرات نامنظم (irregular)

ج) آمالگام با ذرات براده ای (lathe-cut)

د) آمالگام با ذرات کروی (spherical)

۱۷۸- کدام عبارت در مورد اناملوپلاستی صحیح است؟

الف) در شیار دارای پوسیدگی پیش از یک سوم مینا، مناسب است.

ب) زاویه کاووسرفیس حفره بیش از ۱۰۰ درجه خواهد شد.

ج) زاویه ترمیم آمالگام کمتر از ۸۰ درجه خواهد شد.

د) تغییری در outline حفره اولیه ایجاد نخواهد شد.

۱۷۹- در تعیین تعداد پین مورد نیاز برای ترمیم های آمالگام کدام عامل نقش کمتری دارد؟

الف) ساختار دندانی از دست رفته

ب) میزان عاج موجود

ج) میزان گیر مورد نیاز

د) نوع تجاری پین

۱۸۰- در صورتی که حفره کلاس دو وسیع آمالگام نیازمند شیارهای گیردار باشد و ارتفاع دیواره اگزیاال کمتر از ۲ میلی متر باشد، میزان امتداد عمودی شیارهای گیردار چقدر خواهد بود؟

الف) نیمه ارتفاع اگزوپالپال

ب) سه چهارم ارتفاع دیواره اگزیاال

ج) تا لاین انگل اگزوپالپال

د) اکلوزالی تر از لاین انگل اگزوپالپال

۱۸۱- در ترمیم دندان های قدامی فرد مبتلا به فلوروزیس کدام گزینه باید مدنظر قرار بگیرد؟

الف) افزایش غلظت ماده اچینگ به علت تغییر ترکیب شیمیایی مینا

ب) افزایش زمان اچینگ به علت تغییر ترکیب شیمیایی مینا

ج) افزایش غلظت ماده اچینگ به علت ضخامت بیشتر مینا

(د) افزایش زمان اچینگ به علت ضخامت بیشتر مینا

۱۸۲- بهترین pH برای ادهزیو یونیورسال جهت کاربرد همراه سمان رزینی سلف کیور کدام است؟

(الف) ۰/۵ تا ۱

(ب) ۱ تا ۱/۵

(ج) ۱/۵ تا ۲/۵

(د) ۲/۲ تا ۳/۲

۱۸۳- کدام گزینه در استحکام باند سیستم‌های باندینگ رزینی به عاج اهمیت کمتری دارد؟

(الف) زمان اچینگ

(ب) ضخامت لایه هیبرید

(ج) نوع خشک کردن بعد از اچینگ

(د) کیفیت عاج

۱۸۴- اچ کردن سطح تراش قبل از به کارگیری ادهزیو سلف اچ دو مرحله‌ای چه اثراتی بر مینا و عاج دارد؟

(الف) کاهش میکرولیکیج در مینا - تقویت باند در عاج

(ب) کاهش میکرولیکیج در مینا - تضعیف باند در عاج

(ج) افزایش میکرولیکیج در مینا - تقویت باند در عاج

(د) افزایش میکرولیکیج در مینا - تضعیف باند در عاج

۱۸۵- حضور کدام عامل در کامپوزیت‌های سیلوران، منجر به کاهش انقباض پلیمریزاسیون می‌گردد؟

(الف) سایلوکسان

(ب) اکسیژان

(ج) اسیدهای دایمر

(د) واحدهای photochleavagable

۱۸۶- در یک حفره وسیع کلاس III با دسترسی لینگوالی، ترتیب قرار دادن لایه‌های کامپوزیت از راست به چپ به چه صورت است؟

(الف) لببیل - ژنژیوال - پالاتال

(ب) ژنژیوال - لببیل - پالاتال

(ج) اینسایزال - ژنژیوال - پالاتال

(د) ژنژیوال - اینسایزال - لببیل

۱۸۷- شکل زیر نمایانگر چه نواع سایشی در ترمیم‌های کامپوزیت خلفی می‌باشد؟

(الف) ابرژن

(ب) اتریشن

(ج) ایفرکشن

(د) اروژن

۱۸۸- در رابطه با تکنیک Snowplow جمله صحیح کدام است؟

(الف) اختصاص به ترمیم کامپوزیت دندان‌های قدامی دارد.

(ب) قبل از قراردادن کامپوزیت ترمیمی، گلاس یونومر قرار داده می‌شود.

(ج) قبل از قراردادن کامپوزیت ترمیمی، کامپوزیت فلو قرار داده و کیور می‌شود.

(د) سبب کاهش ریزش ژنژیوالی می‌شود.

۱۸۹- در ترمیم‌های کامپوزیت قدامی کدام یک از رنگ‌های جانبی زیر (accessory shades) برای ایجاد translucent incisal effect استفاده می‌شوند؟

(الف) رنگ آجری (ochreshade)

(ب) رنگ سفید

(ج) رنگ آبی با خاکستری

(د) رنگ زرد

زبان انگلیسی

Part A. General English Vocabulary. Choose the best answer (A to D) in the following sentences.

۱۹۱. For patients with known allergies, the importance of avoidance of allergies to prevent attacks should be ...

- A) underscored
- B) underspent
- C) underestimated
- D) understated

۱۹۲. Patients with asthma, who are medicated over the long term with systemic corticosteroids, may require for major surgical procedures if their health is poor.

- A) administration
- B) determination
- C) supplementation
- D) transcription

۱۹۳. Contaminated wounds can become infected if not properly

- A) addressed
- B) confessed
- C) progressed
- D) traversed

۱۹۴. Microvascular disease adversely affects the blood supply of healing tissue, thereby delaying wound healing, diabetics susceptible to wound infection.

- A) tending
- B) rendering
- C) Paving
- D) bearing

۱۹۵. One drawback with all the high-strength core ceramic systems is that none of them is acid etching to produce micromechanically retentive surface.

- A) appreciable
- B) attributable
- C) applicable
- D) amenable

Part B. Dental Terminology. Choose the correct dental term (A to D) in the following sentences.

۱۹۶. Elastic modulus is a measure of the relative of a material.

- A) stiffness
- B) strength
- C) toughness
- D) hardness

۱۹۷. Current research and clinical observations show variations in biologic measurements amongst individuals and teeth, and the ۳-mm distance is the minimum necessary to avoid periodontal breakdown around subgingival restorative margin.

- A) length
- B) width
- C) depth
- D) height

۱۹۸. The crest of an implant body is that portion designed to retain the prosthetic component in a two-piece implant system.

- A) model
- B) analog
- C) module
- D) coping

۱۹۹. The most numerous pulpal cells, form a dispersed but interconnecting network through their cytoplasmic extensions.

- A) odontoblasts
- B) fibroblasts
- C) macrophages

D) lymphocytes

٢٠٠. To circumvent problems for tensile testing of cylinders, it is possible to compress the sides of a cylinder and introduce stresses equivalent to tension. This variation of tension is called tension.

- A) diathermal
- B) diametral
- C) shear
- D) loading

PART C. Reading Comprehension

Read the following passages carefully and answer the comprehension questions. Base your answers on the information given in the text "ONLY".

The goals of segmental osteotomies are to preserve healthy teeth, periodontium, and alveolar bone; to establish an ideal environment for dental restoration and occlusal reconstruction; to optimize cost effectiveness; to maintain abutments in patients who are not candidates for implants; and to minimize edentulous spaces. One solution to malpositioned healthy teeth and alveolar bone that obstruct dental restorative procedures has been extraction and needed alveotomies, particularly in cases of supereruption of teeth and hyperplastic alveoli. This procedure has provided short-term solutions but in many cases has created long-term problems. The geriatric population is growing rapidly, particularly those living longer, active lives. Thus the short-term solution of the past, extraction of the teeth, eventually presents very complex and costly problems over the long term. Replacement of resorbed or surgically removed alveolar bone can be performed; however, without dental stimulation, resorption and degeneration continue. Hindsight shows that maintenance of healthy teeth and alveolar bone is the most cost-effective method of long-term treatment. Surgery to correct dental and jaw deformities has long been considered by dentistry to involve major surgical procedures. With rapidly developing techniques and continuing biologic and scientific refinement, segmental surgical techniques are improving. Many procedures are now done in the office. Over years the techniques have been refined to the point at which they are widely accepted, with a low complication rate.

٢٠١. after replacing resorbed alveolar bone, resorptive processes.....in theof dental stimulation.

- A) increase presence
- B) cease, absence
- C) proceed, presence
- D) proceed, absence

٢٠٢. The advantages of segmental osteotomy its disadvantages.

- A) outweigh
- B) outfit
- C) outline
- D) outpace

٢٠٣. Rapid technical advances have osteotomy techniques.

- A) shown the inefficacy of
- B) optimized
- C) decreased the frequency of
- D) negated the need for

٢٠٤. According to the reading passage, the number of old people with active lives is

- A) on the increase
- B) declining
- C) dwindling
- D) plummeting

٢٠٥. Alveotomy in cases of malpositioned healthy teeth preventing restorative procedures.

- A) is the best solution
- B) is not a proper choice
- C) yields proper long-term results
- D) gives rise to problems in the long

In ٢٠٠٤, a female patient was hospitalized in Seattle for a brain aneurysm. What followed was a tragedy, made worse by the fact that it needn't have occurred at all. This and similar incidents inspired authorities to initiate a mission to improve

patient safety. Many different policies have been tried to date, but few with widespread success. Financial incentives are widely used, but recent evidence suggests that they have little effect. There is a danger that they tend to encourage effort substitution. In other words, people concentrate on the areas that are being incentivized, neglecting other areas. It's not even necessarily conscious neglect. People have only limited time, so it is inevitable they focus on measured and rewarded areas.

In ۲۰۰۳, a study evaluated the use of surgical checklists in hospitals to reduce complications and deaths during surgery. The research found that those checklists may have little impact, and sometimes might even make things worse. The checklists also reinforced the hierarchies - nurses had to try to get surgeons to do certain tasks, but the surgeons used the situation as an opportunity to display their power. The research team spent time in hospitals to try to understand which systems were in place and how they were used. Not only did they find differences in approaches between hospitals, but between unit and between shifts. Standardization and harmonization are two of the most urgent issues to tackle.

۲۰۶. Which of the following can be the best title for the above reading passage?

- A) Initiatives to Improve Patient Safety
- B) Strategies for the Betterment of the Healthcare System
- C) Communicative Approaches for Medical Centers
- D) Mortality Rate Considerations in Care Centers

۲۰۷. The female patient, who was admitted to the hospital was

- A) treated successfully
- B) properly taken care of
- C) discharged from the hospital
- D) improperly treated

۲۰۸. Based on the research team's findings, the checklists were quite in relation to decreasing postoperative complications.

- A) effective
- B) incontrovertible
- C) counterproductive
- D) indispeccibel

۲۰۹. Checklists are

- A) sometimes forgotten to be completed
- B) intended to decrease intraoperative mortality rate
- C) welcomed by nurses and doctors
- D) means of encouraging equality between staff

۲۱۰. "effort substitution" refers to

- A) focus on areas benefiting them
- B) unnecessary diversion of monetary funds
- C) unwisely spent energy and time on related issues
- D) people taking care of tasks they have no information about

رادیولوژی دهان و فک و صورت

۲۱۱- کدام عامل بر کیفیت اشعه تأثیر گذار می باشد؟

- الف) زمان تابش
- ب) جریان تیوب
- ج) فاصله متبع اشعه تا بیمار
- د) میزان فیلتراسیون

۲۱۲- مفهوم **Does limit** در کدام مورد کاربرد دارد؟

- الف) قانون (as low as reasonably achievable)
- ب) انتخاب وسایل و تجهیزات رادیوگرافی
- ج) محدودیت دوز تابش به پرسنل دندانپزشکی
- د) محدودیت دوز تابش به بیماران

۲۱۳- کدام یک از عوارض رادیوتراپی در ناحیه حفره دهان ممکن است تا آخر عمر باقی بمانند؟

الف) تریسموس - موكوزیت

ب) تریسموس - کاهش بزاق

ج) موكوزیت - استئورادیونکروز

د) کاهش چشایی - استئورادیونکروز

۲۱۴- کدام مورد موجب افزایش شارپنس (sharpness) تصویر می شود؟

الف) افزایش سایر فوکل اسپات

ب) کاهش فاصله جسم و فیلم

ج) کاهش فاصله فوکل اسپات و جسم

د) عدم استفاده از long cylinder

۲۱۵- مشکل استفاده از گیرنده تصویر CCD با آرایش خطی و یک پرتو اشعه X به صورت slit shaped در سفالومتری چیست؟

الف) کاهش کنتراست تصویر

ب) کاهش دانسیته تصویر

ج) افزایش زمان اکسپوزر

د) نیاز به افزایش کیلوولتاژ

۲۱۶- هنگام تهیه رادیوگرافی پری آپیکال از دندان مولر اول مندیبل، کدام مورد سبب ایجاد راحتی بیشتر برای بیمار خواهد شد؟

الف) قرار دادن رول پنبه بین بایت بلاک و دندان مورد نظر

ب) بیشتر باز کردن دهان توسط بیمار

ج) شیفت مندیبل به سمت ناحیه تصویربرداری

د) قرار دادن گیرنده تصویر نزدیک به دندان

۲۱۷- در تکنیک پانورامیک، کدام گزینه مشخص تصاویر شبی (ghost image) است؟

الف) محل ساختار آناتومیک بین منبع اشعه و مرکز چرخش است.

ب) پایین تر از موقعیت واقعی جسم دیده می شوند.

ج) به صورت تصاویر دوتایی دیده می شوند.

د) وضوح آنها مشابه با تصاویر واقعی است.

۲۱۸- در رادیوگرافی پانورامیک، تصویر نازوفارونکس و کام نرم به ترتیب چگونه دیده می شوند؟

الف) رادیولوسنت - رادیولوسنت

ب) رادیولوسنت - رادیوپاک

ج) رادیوپاک - رادیوپاک

د) رادیوپاک - رادیولوسنت

۲۱۹- Metal artifact ناشی از پرکردگی آمالگام در کدام یک از تصویربرداری های زیر کمتر است؟

الف) CT

ب) MDCT

ج) CBCT

د) MRI

۲۲۰- کدام یک از حالات پاتولوژیک زیر در فکین شایع تر است؟

الف) کیست ها

ب) آنومالی های دندان

ج) تومورها

د) ضایعات التهابی

۲۲۱- ایجاد نمای گرانولار در جمجمه از علائم کدام دسته از بیماری ها است؟

الف) هایپر پاراتیروئیدیسم - تالاسمی

ب) هایپر پاراتیروئیدیسم - استئوپتروز

ج) تالاسمی - استئوپتروز

د) استئوپروز - بیماری سلولهای لانگرهانس

۲۲۲- مشاهده کدام یافته رادیولوژیک به افتراق اسیفاینگ فایبروما و فیبروز دیسپلازی کمک می کند؟

الف) فیبروز دیسپلازی کانال من بیل را به سمت بالا جابجا می کند.

ب) اسیفاینگ فابروما در صورت درگیری سینوس ماگزلا شکل دیواره ها را تغییر نمی دهد.

ج) فیروز دیسپلازی حدود مشخص دارد.

د) اکسپنشن کورتکس در فیروز دیسپلازی به صورت متحدالمرکز ایجاد می شود.

۲۲۳- در رادیوگرافی فکین بیماری، نازک شدن بوردرهای کورتکس مندیبل همراه با افزایش فضاهای مغز استخوان مشاهده می گردد. ریشه دندان های کوتاه و ترایکولها بزرگ شده اند. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) هیپرپاراتیروئیدیسم

ب) تالاسمی

ج) استئومالاسی

د) استئوپروز

۲۲۴- اختصاصی تین و تشخیصی تری یافته رادیوگرافیک جهت تشخیص **Calcifying epithelial odontogenic tumor** کدام است؟

الف) اکسپنشن

ب) رادیو اباسیته های نزدیک تاج دندان

ج) تحلیل ریشه دندان های مجاور

د) جابه جایی شدید دندان های مجاور

۲۲۵- پسر بچه ای ۸ ساله به دلیل درد و تورم و لقی یکطرفه دندان در فک پایین در مراجعه کرده است . در نمای پانورامیک رادیولوژیک با حدود نامشخص مشاهده می شود. واکنش پریوستال **sun ray** در کورتکس تحتانی مشهود است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) chondrosarcoma

ب) Osteosarcoma

ج) metastatic carcinoma

د) Ewing sarcoma

۲۲۶- در نمای پانورامیک خانمی ۲۰ ساله که فاقد علائم کلینیکی می باشد، رادیولوژیک پری کروئال با حدود مشخص در ارتباط با دندان مولر سوم نهفته مندیبل مشاهده می شود. قطر ضایعه حدود ۳ سانتی متر و فضای داخل فولیکولی حدود ۱/۵ سانتی متر می باشد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) کیست کلسیفیه ادنتوژنیک

ب) فولیکول هایپرپلاستیک

ج) کیست دنتی ژورس

د) مورال آملوبلاستوما

۲۲۷- نمای رادیوگرافیک ضایعات التهابی حاد در مراحل اولیه کدام است؟

الف) رادیولوسنت

ب) رادیوپاک

ج) رادیولوسنت - رادیوپاک

د) فاقد علامت رادیوگرافیک

۲۲۸- ایجاد نمای **Tapered** در ریشه دندان ها از ویژگی های کدام ضایعه می باشد؟

الف) آملوبلاستوما

ب) تالاسمی

ج) سنترال جاینت سل گرانولوما

د) هایپرپاراتیروئیدیسم

۲۲۹- اولین ناحیه درگیری مندیبل در بیماری چروبیسم کدام است؟

الف) گردن کندیل

ب) زاویه کندیل

ج) ناحیه میانی راموس

د) ناحیه دندان های مولر سوم

۲۳۰- نمای **well - defined and non - corticated borders** از خصوصیات رادیوگرافیک کدام یک می باشد؟

الف) استئوسارکوما

ب) کندروسارکوما

ج) مالتیپل میلوما

سلامت دهان و دندان

۲۳۱- «هر نوع محدودیت یا فقدان توانایی انجام یک فعالیت که برای انسان انجام آن عادی تلقی می‌شود» تعریف کدام مورد است؟

الف) نقص

ب) معلولیت

ج) ناتوانی

د) بیماری

۲۳۲- فردی با اورجت بیش از ۹ میلی‌متر در کدام دسته از نیاز درمانی بر اساس شاخص IOTN قرار می‌گیرد؟

الف) ۱ (عدم نیاز به درمان)

ب) ۲ (نیاز متوسط به درمان)

ج) ۴ (نیاز زیاد به درمان)

د) ۵ (نیاز بسیار زیاد به درمان)

۲۳۳- در رابطه با انواع نیاز به خدمات سلامت کدام گزینه صحیح است؟

الف) نیاز هنجاری زیر مجموعه نیاز احساس شده است.

ب) نیاز احساس شده زیر مجموعه نیاز بیان شده است.

ج) نیاز احساس شده زیر مجموعه نیاز هنجاری است.

د) نیاز بیان شده زیر مجموعه نیاز احساس شده است.

۲۳۴- اگر ارزش پیشگویی مثبت یک تست غربالگری $0.8/0.8$ (۸۰ درصد) باشد، به چه معناست؟

الف) اگر تست بر روی ۱۰۰ فرد بیمار انجام شود، در ۸۰ مورد نتیجه مثبت می‌شود.

ب) اگر تست بر روی ۱۰۰ فرد سالم انجام شود، در ۸۰ مورد نتیجه منفی می‌شود.

ج) اگر نتیجه تست برای فردی مثبت باشد به احتمال ۸۰ درصد آن فرد بیمار است.

د) اگر نتیجه تست برای فردی منفی باشد به احتمال ۸۰ درصد آن فرد سالم است.

۲۳۵- «ارائه خدمات» و «پاسخگویی» به ترتیب جزء کدام مشخص‌های نظام سلامت است؟

الف) اهداف - کارکردها

ب) کارکردها - اهداف

ج) اهداف - اهداف

د) کارکردها - کارکردها

۲۳۶- برای ارزیابی تست‌های تشخیصی کدام نوع مطالعه مناسب‌تر است؟

الف) آینده نگر

ب) موردی شاهدهی

ج) متا آنالیز

د) موارد سریالی

۲۳۷- کدام رویکرد آموزش سلامت دهان جامعه با تصویب قوانین سعی در حفظ سلامت دهان جامعه دارد؟

الف) آموزشی

ب) خدماتی

ج) فردی

د) نظارتی

۲۳۸- کدامیک از مدل‌ها و تئوری‌های تغییر رفتار به توضیح نقش و عملکرد باورها و عقاید انسان در تصمیم‌گیری می‌پردازد و رفتار بهداشتی

خاص را پیشگویی می‌کند؟

الف) اعتقاد سلامتی

ب) رفتار برنامه‌ریزی شده

ج) مراحل تغییر

د) خود تعیین کنندگی

۲۳۹- تعیین اولویت‌ها در کدام مرحله از چرخه مدیریت انجام می‌شود؟

الف) برنامه‌ریزی

(ب) ارزیابی

(ج) سازماندهی

(د) اجرا

۲۴۰- اینکه «طراحی مطالعه برای رسیدن به اهداف تحقیق مناسب بوده است یا خیر» مربوط به ارزیابی نقادانه کدام بخش مقاله است؟

(الف) مقدمه

(ب) روش

(ج) نتایج

(د) بحث

مواد دندان

۲۴۱- Modulus of Resilience با کدام یک از پارامترهای زیر نسبت عکس دارد؟

(الف) Yield stress

(ب) Elastic Modulus

(ج) Proportional Limit

(د) Plastic Defomation

۲۴۲- کدام گزینه در مورد Glass Transition Temperature (Tg) سرامیک، درست است؟

(الف) دمایی است که در آن شیب تغییرات حجم ویژه افزایش می یابد و تنها در سرامیک های کریستالی دیده می شود.

(ب) دمایی است که در آن شیب تغییرات حجم ویژه کاهش می یابد و تنها در سرامیک های آمورف دیده می شود.

(ج) پایین تر از دمای Tg تغییرات حجم ویژه تدریجی و بالای دمای Tg شیب افزایش تغییرات حجم ویژه سریع تر می شود.

(د) پایین تر از دمای Tg تغییرات حجم ویژه تدریجی و بالای دمای Tg شیب افزایش تغییرات حجم ویژه کندتر می شود.

۲۴۳- هدف از Heat treatment به وسیله قرار دادن در آب جوش در فرآیند تولید پودر آمالگام Lathe-cut چیست؟

(الف) افزایش سرعت واکنش با جیوه و در نتیجه افزایش سرعت واکنش setting

(ب) کاهش سرعت واکنش با جیوه و در نتیجه کند شدن واکنش setting

(ج) کاهش اندازه ذرات پودر آمالگام

(د) یکنواخت شدن اندازه ذرات پودر آمالگام

۲۴۴- کدام یک از انواع فایبرها در Fiber-reinforced composites برای ساخت رستوریشن های long span به کار می روند؟

(الف) Mesh

(ب) weave

(ج) Colloidal

(د) Unidirectional

۲۴۵- کدام یک از ترکیبات زیر در Bottle دوم Two - stage self - etching primer (Clearfil SE Bond) وجود دارد؟

(الف) ۴-methacryloxy ethyl trimellitate anhydride (۴-META)

(ب) Bisphenol-A Glycidylmethacrylate (Bis-GMA)

(ج) Urethane dimethacrylate (UDMA)

(د) Glycerophosphoric acid dimethacrylate (GPDM)

۲۴۶- کدام یک از موارد زیر در مقایسه خصوصیات مواد قالبگیری درست نیست؟

(الف) مواد قالبگیری سیلیکون افزایشی و تراکمی غیر آبدوست هستند و Tear strength پایینی دارند.

(ب) مواد قالبگیری سیلیکون تراکمی تغییر شکل دائمی پایینی دارند و به راحتی ضد عفونی می شوند.

(ج) مواد قالبگیری پلی سولفاید Tear strength و Wettability پایین دارند.

(د) ماده قالبگیری پلی اتر Tear strength پایین و تغییر شکل دائمی بالا دارند.

۲۴۷- گروه های فانکشنال موجود در ترکیب Metal p rimers کدام یک هستند؟

(الف) گروه های Methacryl در یک طرف برای باند به رزین و گروه Siloxane برای باند به فلز Base metal

(ب) گروه های Methacryl در یک طرف برای باند به رزین و گروه Thiol باند به فلز Noble

(ج) گروه های Mercapto methacryl در یک طرف برای باند به رزین و گروه Thiol برای باند به فلز Base metal

(د) گروه های Mercapto methacryl در یک طرف برای باند به رزین و گروه Thiol برای باند به فلز Noble

۲۴۸- در یک metal –ceramic restoration باند سرامیک به کدام یک از آلیاژهای زیر مناسب نیست؟

(الف) Au-Pd

ب) Ni-Cr-Mo

ج) cpTi

د) High –Palladium

۲۴۹- خواص مکانیکی گلاس – سرامیک‌ها تحت تأثیر کدام یک از موارد زیر نیست؟

الف) تفاوت در Elastic modulus بین فازهای کریستالین و گلاس

ب) تفاوت در انبساط حرارتی بین فازهای کریستالین و گلاس

ج) تفاوت در Viscosity بین فازهای کریستالین و گلاس

د) Volume fraction فاز کریستالین

۲۵۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد نقش عناصر فلزی در آلیاژهای طلا درست نیست؟

الف) پالادیوم (Pd) باعث افزایش استحکام و کاهش نقطه ذوب می‌گردد.

ب) روتنیوم (Ru) به عنوان Nucleating site حین جامد شدن عمل می‌کند.

ج) مس (cu) موجب کاهش نقطه ذوب و افزایش استحکام می‌گردد.

د) روی (Zn) موجب بهبود Cast ability می‌شود.