

# 1993 年数学(一) 真题解析

## 一、填空题

(1) 【答案】  $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ .

【解】 由  $F'(x) = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$  得  $x = \frac{1}{4}$ , 当  $0 < x < \frac{1}{4}$  时  $F'(x) < 0$ ,

故  $F(x)$  的单调减区间为  $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ .

(2) 【答案】  $\left\{0, \frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right\}$ .

【解】 旋转曲面方程为  $\Sigma: 3x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$ ,

法向量为  $\mathbf{n} = \{6x, 4y, 6z\}_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = \{0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}\}$ ,

所求的单位法向量为  $\mathbf{n}^0 = \left\{0, \frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right\}$ .

(3) 【答案】  $\frac{2\pi}{3}$ .

【解】  $b_3 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 3x \, dx = 2 \int_0^{\pi} x \sin 3x \, dx$   
 $= -\frac{2}{3} \int_0^{\pi} x \, d(\cos 3x) = -\frac{2}{3} x \cos 3x \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{3} \int_0^{\pi} \cos 3x \, dx = \frac{2\pi}{3}$ .

(4) 【答案】  $\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ .

【解】  $\text{grad } u = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} = \left\{ \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \right\}$ ,

则  $\text{div}(\text{grad } u) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$   
 $= \frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} + \frac{x^2 + z^2 - y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} + \frac{x^2 + y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$   
 $= \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ .

(5) 【答案】  $\mathbf{X} = k(1, 1, \dots, 1)^T$  ( $k$  为任意常数).

【解】 因为  $r(\mathbf{A}) = n - 1$ , 所以  $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$  的基础解系含一个线性无关的解向量,

又因为  $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$ , 所以  $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$  的通解为  $\mathbf{X} = k(1, 1, \dots, 1)^T$  ( $k$  为任意常数).

## 二、选择题

(1) 【答案】 (B).

【解】 由  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \cdot \sin(\sin^2 x)}{3x^2} = \frac{1}{3}$  得  $f(x) \sim \frac{1}{3}x^3$ ,

又  $g(x) \sim x^3$ , 故  $f(x)$  是  $g(x)$  的同阶但非等价的无穷小, 应选(B).

(2) 【答案】 (A).

【解】 双纽线  $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$  的极坐标方程为  $r^2 = \cos 2\theta$ ,

由对称性得双纽线所围成的面积为

$$A = 4 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta,$$

应选(A).

(3) 【答案】 (C).

【解】 直线  $L_1$  的方向向量为  $s_1 = \{1, -2, 1\}$ ,

直线  $L_2$  的方向向量为  $s_2 = \{1, -1, 0\} \times \{0, 2, 1\} = \{-1, -1, 2\}$ ,

设两直线的夹角为  $\theta$ , 由  $\cos \theta = \frac{|s_1 \cdot s_2|}{|s_1| \cdot |s_2|} = \frac{1}{2}$  得  $\theta = \frac{\pi}{3}$ , 应选(C).

(4) 【答案】 (B).

【解】 令  $P(x, y) = [f(x) - e^x] \sin y$ ,  $Q(x, y) = -f(x) \cos y$ ,

由  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ , 得  $f'(x) + f(x) - e^x = 0$ , 即  $f'(x) + f(x) = e^x$ ,

解得  $f(x) = \left[ \int e^x \cdot e^{\int dx} dx + C \right] e^{-\int dx} = \left( \frac{1}{2} e^{2x} + C \right) e^{-x}$ ,

再由  $f(0) = 0$  得  $C = -\frac{1}{2}$ , 故  $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ , 应选(B).

(5) 【答案】 (C).

【解】 由  $PQ = O$  得  $r(P) + r(Q) \leq 3$ , 当  $t \neq 6$  时  $r(Q) = 2$ , 则  $r(P) \leq 1$ ,

再由  $P$  为非零矩阵得  $r(P) \geq 1$ , 故  $r(P) = 1$ , 应选(C).

三、

$$\begin{aligned} (1) \text{ 【解】 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left[ 1 + \left( \sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1}} \right\}^{x \cdot \left( \sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t + \cos t - 1}{t}} = e^2. \end{aligned}$$

(2) 【解】 方法一

$$\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = \int \frac{x d(e^x - 1)}{\sqrt{e^x - 1}} = 2 \int x d(\sqrt{e^x - 1}) = 2x \sqrt{e^x - 1} - 2 \int \sqrt{e^x - 1} dx,$$

令  $\sqrt{e^x - 1} = t$ , 即  $x = \ln(1 + t^2)$ , 则

$$\begin{aligned} \int \sqrt{e^x - 1} dx &= \int t \cdot \frac{2t}{1 + t^2} dt = 2 \int \left( 1 - \frac{1}{1 + t^2} \right) dt = 2t - 2 \arctan t + C \\ &= 2 \sqrt{e^x - 1} - 2 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C, \end{aligned}$$

$$\text{故 } \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = (2x - 4) \sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C.$$

方法二 令  $\sqrt{e^x - 1} = t$ , 则  $x = \ln(1 + t^2)$ ,  $dx = \frac{2t}{1 + t^2} dt$ ,

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx &= \int \frac{\ln(1 + t^2) \cdot (1 + t^2)}{t} \cdot \frac{2t}{1 + t^2} dt \\ &= 2 \int \ln(1 + t^2) dt = 2t \ln(1 + t^2) - 2 \int \frac{t \cdot 2t}{1 + t^2} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2t \ln(1+t^2) - 4t + 4 \arctan t + C \\
&= (2x-4) \sqrt{e^x-1} + 4 \arctan \sqrt{e^x-1} + C.
\end{aligned}$$

(3)【解】 将方程  $x^2 y' + xy = y^2$  化为  $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}y^2$ ,

$$\text{令 } u = y^{-1}, \text{ 则 } \frac{du}{dx} - \frac{1}{x}u = -\frac{1}{x^2},$$

$$\text{解得 } u = \left[ \int \left(-\frac{1}{x^2}\right) e^{\int -\frac{1}{x} dx} dx + C \right] e^{-\int -\frac{1}{x} dx} = \left(\frac{1}{2x^2} + C\right)x, \text{ 即 } \frac{1}{y} = \left(\frac{1}{2x^2} + C\right)x,$$

$$\text{由 } y(1) = 1 \text{ 得 } C = \frac{1}{2}, \text{ 故满足条件的特解为 } y = \frac{2x}{1+x^2}.$$

四、【解】 由  $\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{2-x^2-y^2}$  得  $x^2+y^2=1$ ,

曲面  $\Sigma$  所围成的几何体  $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2+y^2 \leq 1, \sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq \sqrt{2-x^2-y^2}\}$ ,  
由高斯公式得

$$\begin{aligned}
\iiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy &= \iiint_{\Omega} (2z + z - 2z) dv = \iiint_{\Omega} z dv \\
&= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z dz = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x^2-y^2) dx dy \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r-r^3) dr = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

五、【解】 令  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n$ ,

$$\text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1 \text{ 得级数 } \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n \text{ 的收敛半径为 } R = 1.$$

当  $x = \pm 1$  时级数发散, 故级数的收敛域为  $(-1, 1)$ .

$$\begin{aligned}
\text{由 } S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n = x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\
&= x^2 \left( \sum_{n=2}^{\infty} x^n \right)'' + \frac{1}{1-x} = x^2 \left( \frac{x^2}{1-x} \right)'' + \frac{1}{1-x} = \frac{1-2x+3x^2}{(1-x)^3},
\end{aligned}$$

$$\text{故 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = S\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{22}{27}.$$

六、【证明】 (1)  $f(x) - f(0) = f'(\xi)x \quad (0 < \xi < x)$ ,

由  $f'(x) \geq k > 0$  得  $f(x) > f(0) + kx$ , 于是  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

再由  $f(0) < 0$  得  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内至少有一个零点,

因为  $f'(x) \geq k > 0$ , 所以  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上严格递增, 故零点是唯一的.

(2)  $a^b > b^a$  等价于  $b \ln a - a \ln b > 0$ .

令  $f(x) = x \ln a - a \ln x$ ,  $f(a) = 0$ ,

$$f'(x) = \ln a - \frac{a}{x} > 0 \quad (x > a),$$

由  $\begin{cases} f(a) = 0, \\ f'(x) > 0 \quad (x > a), \end{cases}$  得  $f(x) > 0 \quad (x > a)$ ,

由  $b > a$  得  $f(b) > 0$ , 故  $a^b > b^a$ .

七、【解】 令  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$ ,  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ,  $f = X^T A X$ ,

显然矩阵  $\mathbf{A}$  的特征值为  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$ ,

由  $|\mathbf{A}| = 10$  得  $9 - a^2 = 5$ , 解得  $a = 2$ , 即  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ .

由  $\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  得  $\lambda_1 = 1$  对应的特征向量为  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ;

由  $2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  得  $\lambda_2 = 2$  对应的特征向量为  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ;

由  $5\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  得  $\lambda_3 = 5$  对应的特征向量为  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,

规范化得  $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,

故正交矩阵为  $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ .

八、【证明】 显然  $r(\mathbf{AB}) = n$ ,

由  $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A}), r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{B})$  得  $r(\mathbf{A}) \geq n, r(\mathbf{B}) \geq n$ .

因为矩阵的秩不超过其行数及列数, 所以  $r(\mathbf{A}) \leq n, r(\mathbf{B}) \leq n$ , 于是  $r(\mathbf{B}) = n$ .

因为矩阵的秩与矩阵的行向量组的秩、列向量组的秩都相等, 所以矩阵  $\mathbf{B}$  的列向量组的秩为  $n$ , 故矩阵  $\mathbf{B}$  的列向量组线性无关.

九、【解】 轨迹如右图所示. 设在时刻  $t$ ,  $B$  位于点  $(x, y)$  处, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1+vt) - y}{-x}.$$

上式两边对  $x$  求导, 得

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = -v \frac{dt}{dx}.$$

由于


$$2v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \cdot \frac{dx}{dt},$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2v} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2},$$

将上式代入 (\*) 式, 得到所求的微分方程为

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = 0,$$

其初值条件为  $y|_{x=-1} = 0, y'|_{x=-1} = 1$ .



九题图

## 十、填空题

(1) 【答案】  $\frac{1}{6}$ .

【解】 设  $A_1 = \{\text{第一次取到正品}\}$ ,  $A_2 = \{\text{第一次取到次品}\}$ ,  $B = \{\text{第二次取到次品}\}$ ,

$$P(A_1) = \frac{10}{12}, \quad P(A_2) = \frac{2}{12}, \quad P(B|A_1) = \frac{2}{11}, \quad P(B|A_2) = \frac{1}{11}, \text{ 则}$$

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

$$= \frac{10}{12} \times \frac{2}{11} + \frac{2}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

(2) 【答案】 
$$\begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【解】  $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$ ,

当  $y < 0$  时,  $F_Y(y) = 0$ ;

当  $y \geq 4$  时,  $F_Y(y) = 1$ ;

$$\text{当 } 0 \leq y < 4 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} dy = \frac{\sqrt{y}}{2},$$

$$\text{即 } F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{\sqrt{y}}{2}, & 0 \leq y < 4, \\ 1, & y \geq 4, \end{cases} \text{ 故 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

十一、【解】 (1)  $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0$ ,

$$\text{由 } E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2, \text{ 得}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2.$$

$$(2) \text{Cov}(X, |X|) = E(X|X|) - E(X) \cdot E(|X|),$$

$$\text{由 } E(X|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|f(x)dx = 0, \text{ 得 } \text{Cov}(X, |X|) = 0, \text{ 即 } X \text{ 与 } |X| \text{ 不相关.}$$

(3) 设  $F(x, y)$  为  $(X, |X|)$  的联合分布函数,

$$F(1, 1) = P\{X \leq 1, |X| \leq 1\} = P\{-1 \leq X \leq 1\} = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{e},$$

$$F_X(1) = P\{X \leq 1\} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^1 e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{2e},$$

$$F_{|X|}(1) = P\{|X| \leq 1\} = \int_0^1 e^{-|x|} dx = 1 - \frac{1}{e},$$

因为  $F(1, 1) \neq F_X(1) \cdot F_{|X|}(1)$ , 所以  $X$  与  $|X|$  不相互独立.