

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica

Fisciano, 7/1/2016

Esercizio 1 La centrale operativa dell'Ufficio di Protezione Civile delle province di Avellino e Salerno può ricevere richieste d'intervento dalle città di Salerno, Avellino, Atripalda e Mercato San Severino. La richiesta d'intervento di ciascuna città è indipendente da quella delle altre. La probabilità che la centrale riceva richieste di intervento (nell'intervallo di tempo di un minuto) dalla città di Salerno è 0,8, da Mercato San Severino 0,3, da Avellino 0,5 ed infine da Atripalda 0,05.

- (i) Qual è la probabilità che la richiesta d'intervento arrivi esattamente da una città nell'intervallo di tempo di un minuto?
- (ii) Qual è la probabilità che la richiesta d'intervento arrivi da non più di due città nell'intervallo di tempo di un minuto?
- (iii) Sapendo che la centrale operativa ha ricevuto la richiesta d'intervento da esattamente una città, qual è la probabilità che sia giunta dalla città di Mercato San Severino?

Esercizio 2 Sette terminali numerati di un sistema interattivo sono collegati da una linea di comunicazione ad un computer centrale. Di questi, esattamente quattro sono pronti a trasmettere un messaggio (stato **ON**), e la distribuzione di tali quattro terminali tra i sette è uniforme. Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di terminali interrogati (in ordine dal n.1 al n.7) prima di trovare il primo terminale nello stato **ON**.

- (i) Ricavare la distribuzione di probabilità di X .
- (ii) Determinare la funzione di distribuzione $F(x) = P(X \leq x)$, mostrandone l'andamento grafico.
- (iii) Calcolare valore medio e varianza di X .
- (iv) Posto $Y = 1/X$, determinare $E(Y)$.

Esercizio 3 Si consideri la variabile aleatoria doppia (X, Y) avente la seguente funzione di probabilità congiunta

| $x \backslash y$ | 0 | 1 | 2 |
|------------------|-------|-----------|------------|
| 0 | $1/8$ | $1/2 - p$ | $p - 1/8$ |
| 1 | 0 | $1/8$ | $2p - 1/8$ |

- (i) Determinare i valori ammissibili di p .
- (ii) Stabilire se X e Y sono indipendenti.
- (iii) Calcolare $Cov(X, Y)$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica

Fisciano, 27/1/2016

Esercizio 1 Un vettore booleano di lunghezza 6 contiene 3 bit pari a **1** e 3 bit pari a **0**, distribuiti a caso. Un algoritmo esamina i bit del vettore uno per volta, e si ferma in corrispondenza del secondo bit pari a **1**.


- (i) Qual è la probabilità che l'algoritmo si fermi al passo k -esimo ($2 \leq k \leq 5$)?
- (ii) Qual è la probabilità che il bit successivo al secondo **1** sia pari a **0**, sapendo che l'algoritmo si ferma al passo k -esimo ($2 \leq k \leq 5$)?
- (iii) Qual è la probabilità che il bit successivo al secondo **1** sia pari a **0**?

Esercizio 2 Sia X una variabile aleatoria continua avente funzione di distribuzione

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}(3-x), & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

- (i) Ricavare la densità di probabilità di X , mostrandone l'andamento grafico.
- (ii) Determinare il valore atteso $\mu = E(X)$.
- (iii) Calcolare $P(X > 1 \mid X > 1/2)$.
- (iv) Calcolare $P(Z > 1 \mid Z > 1/2)$, dove Z è una variabile aleatoria normale standard.

Esercizio 3 Si consideri il seguente grafo, dove ciascuno dei 4 nodi è attivo o non attivo con probabilità $1/2$, indipendentemente dagli altri. Sia X il numero di nodi attivi, e sia Y il numero di archi del grafo che insistono su 2 nodi entrambi attivi.



- (i) Calcolare la distribuzione congiunta $P(X = x, Y = y)$.
- (ii) Stabilire se X e Y sono indipendenti.
- (iii) Calcolare $P(X = Y)$ e $E[(X - Y)^2]$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica

Fisciano, 10/2/2016

Esercizio 1 Si consideri una sequenza di n bit casuali, con $n \geq 2$, tali che ognuno indipendentemente dagli altri assuma valore **1** o **0** con probabilità $1/2$. Poniamo

$A = \{\text{almeno 1 bit assume valore } \mathbf{1}\},$

$B = \{\text{i primi 2 bit assumono stesso valore}\}.$

- (i) Calcolare $P(A)$, $P(B)$, $P(\bar{A} \cap B)$ e $P(A \cap B)$.
- (ii) Stabilire se esiste un valore di $n \geq 2$ per cui A e B sono indipendenti.
- (iii) Calcolare $P(A \cup B)$ e $P(\bar{A} \cup B)$.

Esercizio 2 Sia X una variabile aleatoria continua avente funzione densità di probabilità

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} - cx & \text{per } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- (i) Determinare il valore della costante c .
- (ii) Ricavare la funzione di distribuzione di X , mostrandone l'andamento grafico.
- (iii) Determinare $E(X)$.
- (iv) Calcolare

$$P\left(X > \frac{1}{4} \mid X \leq \frac{1}{2}\right).$$

Esercizio 3 Si consideri l'esperimento che consiste nell'effettuare 3 estrazioni (senza reinserimento) da un'urna contenente 3 biglie bianche e 3 biglie nere. Sia X il numero di volte che esce una biglia nera, e sia Y la variabile aleatoria così definita:

$$Y = \begin{cases} k & \text{se esce una biglia bianca per la prima volta all'estrazione } k\text{-esima} \\ 0 & \text{se non esce mai una biglia bianca.} \end{cases}$$

- (i) Ricavare la funzione di probabilità congiunta $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$.
- (ii) Calcolare la covarianza di (X, Y) e commentare il risultato ottenuto. In particolare, cosa si può dire sull'indipendenza di (X, Y) ?
- (iii) Determinare $P(X = x \mid Y = 1)$ per $x = 0, 1, 2, 3$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica

Fisciano, 5/4/2016

Esercizio 1 Da un'urna che contiene 5 biglie numerate da 1 a 5 si effettuano 3 estrazioni con reinserimento. Denotando con w_1 , w_2 e w_3 i numeri estratti,

- (i) calcolare la probabilità che sia $w_1 < w_2 < w_3$;
- (ii) calcolare la probabilità che sia $w_1 = k$ (per $k = 1, 2, 3$) sapendo che $w_1 < w_2 < w_3$;
- (iii) verificare che la somma delle 3 probabilità calcolate al punto (ii) è 1.

Esercizio 2 Sia X una variabile aleatoria continua che descrive il tempo di completamento di una procedura, avente funzione di distribuzione

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x}{x+1}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- (i) Determinare la densità $f(x)$, mostrandone l'andamento grafico.
- (ii) Supponiamo che si consegua una vincita pari a $V(X) = X + 1$ se il tempo di completamento della procedura è minore di 1, altrimenti non si vince nulla, ossia $V(X) = 0$. Valutare la vincita attesa $E[V(X)]$.
- (iii) Stabilire per quali valori di $x \geq 0$ sussiste la seguente relazione:

$$P(X > 2x | X > x) \geq P(X > x).$$

Esercizio 3 Nell'esperimento che consiste nel generare a caso una sequenza di 4 bit, sia X il numero di bit pari a 1, e sia $Y = 1$ se la sequenza è palindroma, $Y = 0$ altrimenti.

- (i) Determinare la funzione di probabilità congiunta $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$.
- (ii) Stabilire se X e Y sono indipendenti.
- (iii) Calcolare il coefficiente di correlazione di (X, Y) .
- (iv) Valutare $P(X + Y \leq 1 | X + Y \leq 3)$.