

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 7/1/2016

Esercizio 1 Consideriamo gli eventi $T_1 = \{\text{la centrale riceve richieste d'intervento dalla città di Salerno}\}$, $T_2 = \{\text{la centrale riceve richieste d'intervento dalla città di Avellino}\}$, $T_3 = \{\text{la centrale riceve richieste d'intervento dalla città di Atripalda}\}$ e $T_4 = \{\text{la centrale riceve richieste d'intervento dalla città di Mercato San Severino}\}$. Dai dati del problema risulta $P(T_1) = 0,8$, $P(T_2) = 0,5$, $P(T_3) = 0,05$ e $P(T_4) = 0,3$. Sia poi $E_k = \{\text{la richiesta d'intervento arriva esattamente da } k \text{ città}\}$ ($k = 1, 2, 3, 4$), ed $F = \{\text{la richiesta d'intervento arriva da non più di due città}\}$.

(i)

$$\begin{aligned} P(E_1) &= P(T_1 \cap \bar{T}_2 \cap \bar{T}_3 \cap \bar{T}_4) + P(\bar{T}_1 \cap T_2 \cap \bar{T}_3 \cap \bar{T}_4) + P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2 \cap T_3 \cap \bar{T}_4) \\ &+ P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2 \cap \bar{T}_3 \cap T_4) = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 0,95 + 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 0,95 \\ &+ 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 0,05 + 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,5 \cdot 0,95 = 0,3645. \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned} P(F) &= 1 - P(E_3) - P(E_4) = 1 - P(T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap \bar{T}_4) - P(T_1 \cap T_2 \cap \bar{T}_3 \cap T_4) \\ &- P(T_1 \cap \bar{T}_2 \cap T_3 \cap T_4) - P(\bar{T}_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4) - P(T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4) \\ &= 1 - [0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,7 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,95 \cdot 0,3 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,3 \\ &+ 0,2 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,3 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,3] = 0,8585. \end{aligned}$$

(iii)

$$P(T_4 | E_1) = \frac{P(T_4 \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2 \cap \bar{T}_3 \cap T_4)}{P(E_1)} = \frac{0,2 \cdot 0,5 \cdot 0,95 \cdot 0,3}{0,3645} = 0,0781.$$

Esercizio 2 Lo spazio campionario S è formato dalle sequenze binarie di lunghezza 7 con esattamente 4 cifre uguali ad uno. Risulta pertanto $|S| = \binom{7}{4} = 35$.

(i) La distribuzione di probabilità di X è data da

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= \frac{\binom{6}{3}}{35} = \frac{20}{35}, & P(X = 2) &= \frac{\binom{5}{3}}{35} = \frac{10}{35} \\ P(X = 3) &= \frac{\binom{4}{3}}{35} = \frac{4}{35}, & P(X = 4) &= \frac{1}{35}. \end{aligned}$$

(ii) La funzione di distribuzione di X è

$$\begin{aligned} F(x) &= 0 \text{ per } x < 1, \\ F(x) &= 20/35 \text{ per } 1 \leq x < 2, \\ F(x) &= 30/35 \text{ per } 2 \leq x < 3, \\ F(x) &= 34/35 \text{ per } 3 \leq x < 4, \\ F(x) &= 1 \text{ per } x \geq 4. \end{aligned}$$

(iii)

$$E(X) = 1 \cdot \frac{20}{35} + 2 \cdot \frac{10}{35} + 3 \cdot \frac{4}{35} + 4 \cdot \frac{1}{35} = \frac{56}{35} = 1,6$$

$$E(X^2) = 1 \cdot \frac{20}{35} + 4 \cdot \frac{10}{35} + 9 \cdot \frac{4}{35} + 16 \cdot \frac{1}{35} = \frac{112}{35} = 3,2$$

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 112/35 - (56/35)^2 = \frac{16}{25} = 0,64.$$

(iv)

$$E(Y) = 1 \cdot \frac{20}{35} + \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{35} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{35} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{35} = \frac{319}{420} = 0,7595.$$

Esercizio 3 (i) Dovendo essere $p(x, y) \geq 0 \forall x, y$, e $\sum_{x=0}^1 \sum_{y=0}^2 p(x, y) = 1$ si deduce la condizione $p = 1/4$. Si ottiene quindi

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	1/8	1/4	1/8	1/2
1	0	1/8	3/8	1/2
$p_X(x)$	1/8	3/8	1/2	1

(ii) Si ha $p(0, 0) = 1/8 \neq p_X(0) \cdot p_Y(0) = 1/16$, quindi X e Y non sono mai indipendenti.

(iii) La covarianza è data da

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = 3/16,$$

essendo

$$E(X \cdot Y) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{8},$$

$$E(X) = \frac{4}{8}, \quad E(Y) = \frac{3}{8} + \frac{8}{8} = \frac{11}{8}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 27/1/2016

Esercizio 1 Un vettore booleano di lunghezza 6 contiene 3 bit pari a **1** e 3 bit pari a **0**, distribuiti a caso, quindi lo spazio campionario ha cardinalità $|S| = \binom{6}{3} = (6 \cdot 5 \cdot 4) / (3 \cdot 2) = 20$. Un algoritmo esamina i bit del vettore uno per volta, e si ferma in corrispondenza del secondo bit pari a **1**. Sia $A_k = \{\text{l'algoritmo si ferma al passo } k\text{-esimo}\}$, con $2 \leq k \leq 5$.

(i) Risulta:

$$P(A_2) = \frac{\binom{2}{2}\binom{4}{1}}{\binom{6}{3}} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}, \quad P(A_3) = \frac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}\binom{3}{1}}{\binom{6}{3}} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10},$$
$$P(A_4) = \frac{\binom{3}{1}\binom{1}{1}\binom{2}{1}}{\binom{6}{3}} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}, \quad P(A_5) = \frac{\binom{4}{1}\binom{1}{1}\binom{1}{1}}{\binom{6}{3}} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}.$$

Sia $B = \{\text{il bit successivo al secondo } \mathbf{1} \text{ è pari a } \mathbf{0}\}$.

(ii) Si ricava:

$$P(B|A_2) = \frac{3}{4}, \quad P(B|A_3) = \frac{2}{3}, \quad P(B|A_4) = \frac{1}{2}, \quad P(B|A_5) = 0.$$

(iii) Pertanto, per la formula delle alternative, la probabilità che il bit successivo al secondo **1** sia pari a **0** è

$$P(B) = \sum_{k=2}^5 P(B|A_k)P(A_k) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + 0 \cdot \frac{1}{5} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 2 Sia X una variabile aleatoria continua avente funzione di distribuzione

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}(3-x), & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

(i) La densità di probabilità di X è

$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x\left(1 - \frac{x}{2}\right), & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(ii) Il valore atteso di X è:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^2 x \frac{3}{2}x \left(1 - \frac{x}{2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{2} - \frac{3}{16}x^4 \right]_0^2 = \frac{8}{2} - 3 = 1.$$

(iii) Si ha

$$P(X > 1 | X > 1/2) = \frac{P(\{X > 1\} \cap \{X > 1/2\})}{P(X > 1/2)} = \frac{P(X > 1)}{P(X > 1/2)} = \frac{1 - F(1)}{1 - F(1/2)},$$

quindi

$$P(X > 1 | X > 1/2) = \frac{1 - F(1)}{1 - F(1/2)} = \frac{1 - 1/2}{1 - 5/32} = \frac{16}{27} = 0,5926.$$

(iv) Analogamente, se Z è una variabile aleatoria normale standard, si ha

$$P(Z > 1 | Z > 1/2) = \frac{1 - F_Z(1)}{1 - F_Z(1/2)} = \frac{1 - \Phi(1)}{1 - \Phi(1/2)} = \frac{1 - 0,8413}{1 - 0,6915} = \frac{0,1587}{0,3085} = 0,5144.$$

Esercizio 3 Risulta

ω	X	Y	ω	X	Y	ω	X	Y	ω	X	Y
0000	0	0	0100	1	0	1000	1	0	1100	2	1
0001	1	0	0101	2	1	1001	2	1	1101	3	3
0010	1	0	0110	2	0	1010	2	1	1110	3	2
0011	2	0	0111	3	1	1011	3	2	1111	4	4

(i) Quindi la distribuzione congiunta di (X, Y) e le distribuzioni marginali di X e Y sono

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	$p_X(x)$
0	1/16	0	0	0	0	1/16
1	4/16	0	0	0	0	4/16
2	2/16	4/16	0	0	0	6/16
3	0	1/16	2/16	1/16	0	4/16
4	0	0	0	0	1/16	1/16
$p_Y(y)$	7/16	5/16	2/16	1/16	1/16	1

(ii) X e Y non sono indipendenti: ad esempio $p(0, 0) = 1/16 \neq p_X(0) \cdot p_Y(0) = (1/16)(7/16)$.

(iii) Si ha

$$P(X = Y) = \sum_{k=0}^4 p(k, k) = \frac{1}{16} + 0 + 0 + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16},$$

$$E[(X - Y)^2] = \sum_{k=0}^4 \sum_{h=0}^4 (k - h)^2 p(k, h) = \frac{3}{16} \cdot 0 + \frac{10}{16} \cdot 1 + \frac{3}{16} \cdot 4 = \frac{11}{8} = 1,375.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 10/2/2016

Esercizio 1 (i) Si ha $P(\bar{A}) = P(\{\text{nessun bit ha valore } \mathbf{1}\})$, e quindi

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad P(B) = P(\mathbf{00}) + P(\mathbf{11}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2},$$

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad P(A \cap B) = P(B) - P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

(ii) Risulta $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ per ogni $n \geq 2$, quindi A e B non sono indipendenti.

(iii) Si ha

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1,$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \left[\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Esercizio 2 (i) Essendo X una variabile aleatoria continua avente densità

$$f(x) = \frac{1}{2} - cx \quad \text{per } 0 < x < 1$$

si ha $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ per

$$1 = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - cx\right) dx = \left[\frac{x}{2} - c\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - c\frac{1}{2}$$

ossia per $c = -1$, e in tal caso $f(x) \geq 0$ per ogni x reale.

(ii) Per la funzione di distribuzione $F(x) = P(X \leq x)$ si ha:

$F(x) = 0$ per $x < 0$;

$$F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{2} + t\right) dt = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} \quad \text{per } 0 \leq x < 1;$$

$F(x) = 1$ per $x \geq 1$.

(iii)

$$E(X) = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x \left(\frac{1}{2} + x\right) dx = \left[\frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{7}{12} = 0,58\bar{3}.$$

(iv)

$$P\left(X > \frac{1}{4} \mid X \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{P\left(\frac{1}{4} < X \leq \frac{1}{2}\right)}{P\left(X \leq \frac{1}{2}\right)} = \frac{F(1/2) - F(1/4)}{F(1/2)} = \frac{1/4 + 1/8 - 1/8 - 1/32}{1/4 + 1/8} = \frac{7}{12}.$$

Esercizio 3 (i) La funzione di probabilità congiunta $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$ si ricava notando che

$$\begin{aligned}
 P(X = 0, Y = 1) &= P(BBB) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{1}{20} \\
 P(X = 1, Y = 1) &= P(BBN) + P(BNB) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 3}{6 \cdot 5 \cdot 4} + \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{6}{20} \\
 P(X = 2, Y = 1) &= P(BNN) = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{20} \\
 P(X = 1, Y = 2) &= P(NBB) = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{20} \\
 P(X = 2, Y = 2) &= P(NBN) = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{20} \\
 P(X = 2, Y = 3) &= P(NNB) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 3}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{20} \\
 P(X = 3, Y = 0) &= P(NNN) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{1}{20}
 \end{aligned}$$

$x \backslash y$	0	1	2	3	$p_X(x)$
0	0	1/20	0	0	1/20
1	0	6/20	3/20	0	9/20
2	0	3/20	3/20	3/20	9/20
3	1/20	0	0	0	1/20
$p_Y(y)$	1/20	10/20	6/20	3/20	1

(ii) Essendo

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{x=0}^3 x p_X(x) = \frac{9}{20} + \frac{18}{20} + \frac{3}{20} = \frac{3}{2} \\
 E(Y) &= \sum_{y=0}^3 y p_Y(y) = \frac{10}{20} + \frac{12}{20} + \frac{9}{20} = \frac{31}{20} \\
 E(X \cdot Y) &= \sum_{x=0}^3 \sum_{y=0}^3 x y p(x, y) = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} + \frac{6}{20} + \frac{12}{20} + \frac{18}{20} = \frac{48}{20}
 \end{aligned}$$

La covarianza di (X, Y) è

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = \frac{48}{20} - \frac{3}{2} \cdot \frac{31}{20} = \frac{3}{40} = 0,075 > 0$$

quindi X e Y sono positivamente correlate, e dunque non sono indipendenti.

(iii) Si ha $P(X = x | Y = 1) = p(x, 1)/p_Y(1) = 2 \cdot p(x, 1)$ per $x = 0, 1, 2, 3$ e pertanto
 $P(X = 0 | Y = 1) = 1/10$,
 $P(X = 1 | Y = 1) = 6/10$,
 $P(X = 2 | Y = 1) = 3/10$,
 $P(X = 3 | Y = 1) = 0$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 5/4/2016

Esercizio 1 Definiamo i seguenti eventi: $A = \{w_1 < w_2 < w_3\}$ e $B_k = \{w_1 = k\}$; risulta:

(i)

$$P(A) = \frac{\binom{5}{3}}{5^3} = \frac{10}{125} = \frac{2}{25} = 0,08$$

(ii)

$$P(B_1 | A) = \frac{P(B_1 \cap A)}{P(A)} = \frac{\binom{1}{1} \binom{4}{2} / 5^3}{\binom{5}{3} / 5^3} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$P(B_2 | A) = \frac{P(B_2 \cap A)}{P(A)} = \frac{\binom{1}{1} \binom{3}{2} \binom{1}{0} / 5^3}{\binom{5}{3} / 5^3} = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$P(B_3 | A) = \frac{P(B_3 \cap A)}{P(A)} = \frac{\binom{2}{0} \binom{1}{1} \binom{2}{2} / 5^3}{\binom{5}{3} / 5^3} = \frac{1}{10} = 0,1$$

(iii)

$$\sum_{i=1}^3 P(B_i | A) = \frac{6 + 3 + 1}{10} = 1.$$

Esercizio 2 (i) Si ha

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{per } x \geq 0$$

e $f(x) = 0$ altrimenti.

(ii) Risulta

$$E[V(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} V(x) f(x) dx = \int_0^1 (x+1) \frac{1}{(x+1)^2} dx = \ln(x+1) \Big|_0^1 = \ln 2 = 0,6931.$$

(iii) Poiché per $x \geq 0$ risulta

$$P(X > x) = 1 - F(x) = 1 - \frac{x}{x+1} = \frac{1}{x+1},$$

$$P(X > 2x | X > x) = \frac{P(X > 2x)}{P(X > x)} = \frac{1/(2x+1)}{1/(x+1)} = \frac{x+1}{2x+1},$$

si ha

$$P(X > 2x | X > x) \geq P(X > x) \iff \frac{x+1}{2x+1} \geq \frac{1}{x+1} \iff x^2 + 2x + 1 \geq 2x + 1$$

e quindi la condizione è soddisfatta per ogni $x \geq 0$.

Esercizio 3

ω	X	Y	ω	X	Y
0 0 0 0	0	1	1 0 0 0	1	0
0 0 0 1	1	0	1 0 0 1	2	1
0 0 1 0	1	0	1 0 1 0	2	0
0 0 1 1	2	0	1 0 1 1	3	0
0 1 0 0	1	0	1 1 0 0	2	0
0 1 0 1	2	0	1 1 0 1	3	0
0 1 1 0	2	1	1 1 1 0	3	0
0 1 1 1	3	0	1 1 1 1	4	1

(i) Quindi

$x \backslash y$	0	1	$p_x(x)$
0	0	1/16	1/16
1	4/16	0	4/16
2	4/16	2/16	6/16
3	4/16	0	4/16
4	0	1/16	1/16
$p_Y(y)$	3/4	1/4	1

(ii) Essendo

$$p(0,0) = 0 \neq p_X(0)p_Y(0) = \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{4},$$

si ha che X e Y non sono indipendenti.

(iii) X ha distribuzione binomiale, quindi

$$E(X) = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2.$$

Inoltre

$$E(Y) = \frac{1}{4}, \quad E(XY) = 2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{16} + 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{2}.$$

Pertanto

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{4} = 0,$$

da cui segue che il coefficiente di correlazione di (X, Y) è nullo.

(iv) Si ha

$$P(X + Y \leq 1 | X + Y \leq 3) = \frac{P(X + Y \leq 1)}{P(X + Y \leq 3)} = \frac{\frac{1}{16} + \frac{4}{16}}{\frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{4}{16} + \frac{2}{16} + \frac{4}{16}} = \frac{1}{3}.$$