

1.4 Disposizioni e combinazioni

Quanti insiemi di r oggetti si possono formare a partire da n oggetti distinti?

Per risolvere questo problema va specificato se gli insiemi da formare sono *ordinati* (in cui l'ordine è rilevante) o *non ordinati* (dove l'ordine non è rilevante).

Nel caso di insiemi *ordinati* le sequenze da formare si dicono **disposizioni semplici** se non sono ammesse ripetizioni, altrimenti si dicono **disposizioni con ripetizioni**.

Per il principio fondamentale del calcolo combinatorio

– il numero di disposizioni semplici di n oggetti raggruppati in r classi è

$$D_{n,r} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} = (n)_r$$

dove $(n)_r := n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$ è detto *fattoriale discendente*;

– il numero di disposizioni con ripetizioni di n oggetti raggruppati in r classi è

$$D'_{n,r} = n \cdot n \cdot n \cdots n = n^r.$$

Esempio. Quante parole di lunghezza 2 si possono formare da un alfabeto di 4 lettere

(a) se le lettere non possono ripetersi?

(b) se le lettere possono ripetersi?

Soluzione. (a) Si tratta di disposizioni semplici di $n = 4$ oggetti raggruppati in $r = 2$ classi, quindi $D_{4,2} = (4)_2 = 4 \cdot 3 = 12$.

$(ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc)$

(b) Si tratta di disposizioni con ripetizioni di $n = 4$ oggetti raggruppati in $r = 2$ classi, quindi $D'_{4,2} = 4^2 = 16$.

$(aa, ab, ac, ad, ba, bb, bc, bd, ca, cb, cc, cd, da, db, dc, dd)$

Esempio. Da un'urna che contiene n biglie numerate da 1 a n si effettuano k estrazioni a caso tenendo conto dell'ordine di apparizione. Quante sono le sequenze distinte ottenibili se le estrazioni

(a) si effettuano senza reinserimento?

(b) si effettuano con reinserimento?

Soluzione. (a) $(n)_k = n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)$; (b) n^k .

(★★) **Esempio.** Quante sono le operazioni distinte definite su 2 variabili booleane?

Soluzione. Essendo $x_1 \in \{0, 1\}$ e $x_2 \in \{0, 1\}$, vi sono 4 coppie (x_1, x_2) distinte. Ad ognuna di queste si può assegnare valore 0 o 1. Si tratta quindi di determinare il numero di disposizioni con ripetizioni di 2 oggetti (i valori 0 e 1) in quattro classi (le coppie (x_1, x_2)); vi sono pertanto $D'_{2,4} = 2^4 = 16$ operazioni distinte.

x_1	x_2	0	$x_1 \wedge x_2$	$x_1 \wedge \overline{x_2}$	x_1	$\overline{x_1} \wedge x_2$	x_2	$x_1 \oplus x_2$	$x_1 \vee x_2$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

x_1	x_2	$\overline{x_1} \wedge \overline{x_2}$	$\overline{x_1 \oplus x_2}$	$\overline{x_2}$	$x_1 \vee \overline{x_2}$	$\overline{x_1}$	$\overline{x_1} \vee x_2$	$\overline{x_1} \vee \overline{x_2}$	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

(\wedge = AND, \vee = OR, \oplus = OR ESCLUSIVO)

Consideriamo il problema di determinare quanti insiemi non ordinati di r oggetti si possono formare a partire da n oggetti distinti.

Nel caso di insiemi *non ordinati* le sequenze si dicono **combinazioni semplici** se non sono ammesse ripetizioni, altrimenti si dicono **combinazioni con ripetizioni**.

In generale, dato che $(n)_r = n(n-1) \cdots (n-r+1)$ rappresenta il numero di scelte di r oggetti tra n , tenendo conto dell'ordine nel quale questi vengono selezionati, e dato che ogni insieme di r oggetti viene in tal modo contato $r!$ volte, si ha che il numero di sottoinsiemi di r oggetti che si possono formare da un insieme di n oggetti è

$$C_{n,r} = \frac{n(n-1) \cdots (n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \frac{(n)_r}{r!}.$$

Notiamo anche che $D_{n,r} = C_{n,r} \cdot r!$, in quanto il numero di sequenze ordinate è uguale al numero di sequenze non ordinate per il numero di permutazioni di r oggetti, e pertanto

$$C_{n,r} = \frac{D_{n,r}}{r!} = \frac{(n)_r}{r!}$$

Per $r = 0, 1, \dots, n$ definiamo il *coefficiente binomiale*

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \frac{(n)_r}{r!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!}.$$

Se $r < 0$ o se $r > n$ si pone

$$\binom{n}{r} = 0.$$

Il numero $C_{n,r}$ di combinazioni semplici di n oggetti raggruppati in r classi è

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \frac{(n)_r}{r!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!}.$$

Questo denota il numero di sottoinsiemi di dimensione r che si possono formare con gli elementi di un insieme di dimensione n senza tener conto dell'ordine della selezione.

Il numero $C'_{n,r}$ di combinazioni con ripetizioni di n oggetti raggruppati in r classi è

$$C'_{n,r} = \binom{n+r-1}{r} = \frac{(n+r-1)!}{(n-1)!r!} = \frac{(n+r-1)_r}{r!} = \frac{(n+r-1)(n+r-2)\cdots n}{r!}.$$

Tabella riepilogativa

	Disposizioni (l'ordine è rilevante)	Combinazioni (l'ordine non è rilevante)
semplici (senza ripetizioni)	$D_{n,k} = (n)_k = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{(n)_k}{k!}$
composte (con ripetizioni)	$D'_{n,k} = n^k$	$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$

Esempio. Quante combinazioni di 4 oggetti in gruppi di 2 si possono formare

(a) nel caso di combinazioni semplici? (gli oggetti non possono ripetersi)

(b) nel caso di combinazioni con ripetizioni? (gli oggetti possono ripetersi)

Soluzione. (a) $C_{4,2} = (4)_2/2! = (4 \cdot 3)/2 = 6$ (ab, ac, ad, bc, bd, cd).

(b) $C'_{4,2} = (5)_2/2! = (5 \cdot 4)/2 = 10$ ($aa, ab, ac, ad, bb, bc, bd, cc, cd, dd$).

Esempio. In quanti modi si possono scegliere 3 oggetti da un insieme di 20?

Soluzione. $C_{20,3} = \binom{20}{3} = \frac{(20)_3}{3!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 1140$.

Esempio. Una classe di tango argentino ha 22 studenti, 10 donne e 12 uomini. In quanti modi si possono formare 5 coppie?

Soluzione. Vi sono $\binom{10}{5}$ modi di selezionare 5 persone da 10 donne, $\binom{12}{5}$ modi di selezionare 5 persone da 12 uomini, e $5!$ modi di accoppiare 5 donne con 5 uomini, quindi la soluzione è $\binom{10}{5} \binom{12}{5} 5! = 252 \cdot 792 \cdot 120 = 23\,950\,080$.

Esempio. (a) Quanti comitati composti da 2 donne e 3 uomini si possono formare da un gruppo di 5 donne e 7 uomini? (b) Quanti sono i comitati se 2 uomini che hanno litigato rifiutano di sedere insieme nel comitato?

Soluzione. (a) Ci sono $\binom{5}{2}$ possibili insiemi con 2 donne, e $\binom{7}{3}$ possibili insiemi di 3 uomini; segue allora dal principio fondamentale del calcolo combinatorio che vi sono

$$\binom{5}{2} \binom{7}{3} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 350 \quad \text{comitati possibili formati da 2 donne e 3 uomini.}$$

(b) Se due uomini rifiutano di far parte insieme nel comitato, vi sono $\binom{2}{0} \binom{5}{3}$ insiemi di 3 uomini che non contengono nessuno dei 2 litiganti, e $\binom{2}{1} \binom{5}{2}$ insiemi di 3 uomini che contengono esattamente 1 dei 2 litiganti, e quindi vi sono $\binom{2}{0} \binom{5}{3} + \binom{2}{1} \binom{5}{2} = 30$ gruppi di 3 uomini senza i 2 litiganti. In totale vi sono $30 \cdot \binom{5}{2} = 300$ comitati.

Notiamo che il numero di comitati che contengono i 2 uomini che hanno litigato è: $\binom{5}{2} \binom{2}{2} \binom{5}{1} = 50$.

Quanti sono i risultati possibili nel gioco del Superenalotto?

Soluzione. Se si tiene conto dell'ordine delle estrazioni, i possibili risultati sono $90 \times 89 \times 88 \times 87 \times 86 \times 85 = 448\,282\,533\,600$. Dividendo per il numero di possibili permutazioni dei numeri estratti, pari a $6! = 720$, si ottiene il numero dei risultati possibili nel gioco del Superenalotto (ossia senza tener conto dell'ordine delle estrazioni):

$$C_{90,6} = \binom{90}{6} = \frac{90 \times 89 \times 88 \times 87 \times 86 \times 85}{6!} = \frac{448\,282\,533\,600}{720} = 622\,614\,630.$$

Esempio. Un network è costituito da n nodi. Quanti sono i collegamenti diretti che si possono attivare tra ciascun nodo e tutti i nodi rimanenti?

Soluzione. Ragionando nodo per nodo si ha che il numero di collegamenti diretti è $(n-1) + (n-2) + (n-3) + \dots + 2 + 1$. Inoltre la soluzione coincide col numero di combinazioni semplici di n oggetti in 2 classi:

$$C_{n,2} = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}, \quad \text{pertanto} \quad \sum_{k=1}^{n-1} k = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Esempio. In un centro di calcolo 4 elaboratori devono smaltire 3 carichi di lavoro.

(a) Quante sono le possibili distribuzioni dei 3 carichi? (b) Quante sono le possibili distribuzioni dei 3 carichi se ciascun elaboratore può smaltire al più un solo carico?

Soluzione. (a) Si tratta di combinazioni con ripetizioni (l'ordine non è rilevante).

Quindi le possibili distribuzioni sono $\mathcal{C}'_{4,3} = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = 20$, e sono così rappresentabili: 0111, 1011, 1101, 1110, 0012, 0102, 1002, 0021, 0120, 1020, 0201, 0210, 1200, 2001, 2010, 2100, 0003, 0030, 0300, 3000.

(b) Poiché non sono ammesse ripetizioni la soluzione è $\mathcal{C}_{4,3} = \binom{4}{3} = 4$.

Tavola (di Tartaglia-Newton) dei coefficienti binomiali

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	somma
0	1	0	0	0	0	0	0	0	$1 = 2^0$
1	1	1	0	0	0	0	0	0	$2 = 2^1$
2	1	2	1	0	0	0	0	0	$4 = 2^2$
3	1	3	3	1	0	0	0	0	$8 = 2^3$
4	1	4	6	4	1	0	0	0	$16 = 2^4$
5	1	5	10	10	5	1	0	0	$32 = 2^5$
6	1	6	15	20	15	6	1	0	$64 = 2^6$
7	1	7	21	35	35	21	7	1	$128 = 2^7$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \frac{(n)_k}{k!}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n;$$

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! n!} = \frac{n!}{n!} = 1; \quad \binom{n}{n} = \frac{n!}{n! 0!} = \frac{n!}{n!} = 1;$$

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1! (n-1)!} = \frac{n (n-1)!}{(n-1)!} = n; \quad \binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-1)! 1!} = \frac{n (n-1)!}{(n-1)!} = n;$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)! k!} = \binom{n}{n-k}.$$

Formula di ricorrenza dei coefficienti binomiali

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} \quad 1 \leq r \leq n.$$

(**) Dimostrazione analitica

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} &= \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)(n-r-1)!} + \frac{(n-1)!}{r(r-1)!(n-r-1)!} \\ &= \left[\frac{1}{n-r} + \frac{1}{r} \right] \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r-1)!} = \frac{n}{r(n-r)} \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r-1)!} = \binom{n}{r}. \end{aligned}$$

(**) **Esercizio.** Realizzare un programma che usi la formula di ricorrenza dei coefficienti binomiali per ottenere la tavola di Tartaglia-Newton per $\binom{n}{r}$, $0 \leq r \leq n \leq N$, con N assegnato. Quali sono le condizioni iniziali da usare?

Formula di ricorrenza dei coefficienti binomiali

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} \quad 1 \leq r \leq n.$$

(**) Dimostrazione combinatoria

Si basa sul fatto che i sottoinsiemi di r elementi di un insieme di n oggetti sono $\binom{n}{r}$. Consideriamo un insieme di n oggetti e fissiamo l'attenzione su uno di essi, che chiamiamo *oggetto 1*. Vi sono $\binom{n-1}{r-1} \binom{1}{1}$ sottoinsiemi di r elementi che contengono l'oggetto 1. Inoltre vi sono $\binom{n-1}{r} \binom{1}{0}$ sottoinsiemi di r elementi che non contengono l'oggetto 1. La somma dei termini $\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$ fornisce il numero $\binom{n}{r}$ di sottoinsiemi di r elementi.

Un generico sottoinsieme A di un insieme $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ può essere rappresentato da un vettore booleano (x_1, x_2, \dots, x_n) , dove $x_i = 1$ se $a_i \in A$ e $x_i = 0$ altrimenti, per $i = 1, 2, \dots, n$. Quindi ad ogni sottoinsieme corrisponde un solo vettore e viceversa. Poiché in totale vi sono 2^n vettori, tanti sono i possibili sottoinsiemi. Poiché vi sono $\binom{n}{k}$ vettori aventi k bit pari a 1, tanti sono i sottoinsiemi di cardinalità k , per $k = 0, 1, \dots, n$.

Esempio. Per $n = 4$ vi sono $2^4 = 16$ sottoinsiemi di $\{a, b, c, d\}$:

$(0, 0, 0, 0) : \{\}$	$(1, 0, 0, 0) : \{a\}$
$(0, 0, 0, 1) : \{d\}$	$(1, 0, 0, 1) : \{a, d\}$
$(0, 0, 1, 0) : \{c\}$	$(1, 0, 1, 0) : \{a, c\}$
$(0, 0, 1, 1) : \{c, d\}$	$(1, 0, 1, 1) : \{a, c, d\}$
$(0, 1, 0, 0) : \{b\}$	$(1, 1, 0, 0) : \{a, b\}$
$(0, 1, 0, 1) : \{b, d\}$	$(1, 1, 0, 1) : \{a, b, d\}$
$(0, 1, 1, 0) : \{b, c\}$	$(1, 1, 1, 0) : \{a, b, c\}$
$(0, 1, 1, 1) : \{b, c, d\}$	$(1, 1, 1, 1) : \{a, b, c, d\}$

Teorema del binomio

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}, \quad n \geq 1.$$

$\binom{n}{k}$ è detto *coefficiente binomiale* perché interviene nello sviluppo del binomio.

(★★) **Esercizio.** Dimostrare il teorema del binomio per induzione su n .

Esempio. Quanti sono i sottoinsiemi di un insieme di n elementi?

Soluzione. Poiché vi sono $\binom{n}{k}$ sottoinsiemi di dimensione k , dal teorema del binomio per $x = y = 1$ si ha

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1 + 1)^n = 2^n.$$

(Si veda anche l'ultima colonna della tavola dei coefficienti binomiali).

Nella somma $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ è incluso il caso $k = 0$ che corrisponde all'insieme vuoto.

Quindi il numero di sottoinsiemi non vuoti di un insieme di n elementi è

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} = 2^n - 1.$$

Analogamente, il numero di sottoinsiemi costituiti da almeno 2 elementi è

$$\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} = 2^n - n - 1.$$

Esercizio. Utilizzare il teorema del binomio per dimostrare che

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = 0, \quad n > 0.$$

(**) **Proposizione.** Per ogni $n \geq k \geq 0$ sussiste la seguente identità:

$$\sum_{j=k}^n \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Dimostrazione. Procedendo per induzione su n , notiamo che per $n = k$ l'identità è valida, essendo

$$\binom{k}{k} = \binom{k+1}{k+1} = 1.$$

Supponendo valida l'identità per n , vediamo che essa sussiste anche per $n+1$. Si ha

$$\sum_{j=k}^{n+1} \binom{j}{k} = \sum_{j=k}^n \binom{j}{k} + \binom{n+1}{k} = \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k}.$$

Ricordando la formula di ricorrenza $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$ si ottiene

$$\sum_{j=k}^{n+1} \binom{j}{k} = \binom{n+2}{k+1}, \text{ da cui segue immediatamente la tesi.}$$

Esempio. Calcolare quanti sono i vettori (x_1, \dots, x_k) nei quali

- (a) ogni x_i è un intero positivo tale che $1 \leq x_i \leq n$;
- (b) ogni x_i è un intero positivo tale che $1 \leq x_i \leq n$, ed inoltre ogni x_i è diverso da ciascun intero x_1, x_2, \dots, x_{i-1} ;
- (c) ogni x_i è un intero positivo tale che $1 \leq x_i \leq n$, ed inoltre $x_1 < x_2 < \dots < x_k$;
- (d) ogni x_i è un intero positivo tale che $1 \leq x_i \leq n$, ed inoltre $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_k$.

Soluzione. (a) $D'_{n,k} = n^k$; (b) $D_{n,k} = (n)_k$; (c) $C_{n,k} = \binom{n}{k}$; (d) $C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$.

(★★) **Esercizio.** Realizzare un programma che, per valori di k e di n assegnati,

- (i) generi tutte le sequenze dei 4 casi dell'esercizio precedente;
- (ii) conti quante sequenze sono state generate;
- (iii) valuti le quantità n^k , $(n)_k$, $\binom{n}{k}$, $\binom{n+k-1}{k}$;
- (iv) verifichi che i numeri di sequenze generate nei 4 casi corrispondano alle quantità valutate al punto (iii).

(**) **Esercizio.** Dimostrare le seguenti uguaglianze:

$$\begin{aligned} \sum_{i_1=1}^n \sum_{\substack{i_2=1 \\ i_2 \neq i_1}}^n \cdots \sum_{\substack{i_k=1 \\ i_k \neq i_r \ \forall r < k}}^n 1 &= (n)_k, & \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n 1 &= n^k, \\ \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^{i_1-1} \cdots \sum_{i_k=1}^{i_{k-1}-1} 1 &= \binom{n}{k}, & \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^{i_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{i_{k-1}} 1 &= \binom{n+k-1}{k}. \end{aligned}$$

Proposizione. Sussiste la seguente uguaglianza (detta di Vandermonde):

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n}{0} \binom{m}{k} + \binom{n}{1} \binom{m}{k-1} + \cdots + \binom{n}{k} \binom{m}{0}.$$

Per la dimostrazione, si può procedere per via combinatoria. Ad esempio, considerando n biglie nere e m biglie bianche. In quanti modi si può formare un sacchetto di k biglie?

Esempio. Da un lotto di $N = 20$ pezzi costituito da 4 pezzi difettosi e 16 buoni si estraggono $n = 10$ pezzi a caso.

- (a) Quanti sono i possibili campioni che non contengono pezzi difettosi?
- (b) Quanti sono i possibili campioni che contengono 1 pezzo difettoso e 9 buoni?
- (c) Quanti sono i possibili campioni che contengono almeno 2 pezzi difettosi?

Soluzione. (a) I possibili campioni che non contengono pezzi difettosi sono:

$$\binom{16}{10} = \binom{16}{6} = \frac{(16)_6}{6!} = 8\,008.$$

(b) I possibili campioni che contengono 1 pezzo difettoso e 9 buoni sono:

$$\binom{4}{1} \binom{16}{9} = 4 \binom{16}{7} = 4 \frac{(16)_7}{7!} = 45\,760.$$

(c) Facendo uso della formula di Vandermonde si ha che i possibili campioni che contengono almeno 2 pezzi difettosi sono:

$$\binom{20}{10} - \binom{16}{10} - \binom{4}{1} \binom{16}{9} = \frac{(20)_{10}}{10!} - 8\,008 - 45\,760 = 184\,756 - 53\,768 = 130\,988.$$

Esempio. Un lotto di 4 computer distinti deve essere assegnato a 2 laboratori.

(a) In quanti modi può essere fatto?

(b) E se ogni laboratorio deve ricevere almeno un computer?

Soluzione. (a) Assegnando k computer al primo laboratorio e $4 - k$ al secondo laboratorio, l'assegnazione dei computer si può effettuare in $\binom{4}{k}$ modi; si ha quindi:

$$\sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} = 2^4 = 16;$$

tenendo conto che ogni computer può essere assegnato a ciascuno dei 2 laboratori, la soluzione è anche esprimibile come $D'_{2,4} = 2^4 = 16$.

(b) In questo caso si ha:

$$\sum_{k=1}^3 \binom{4}{k} = 2^4 - \binom{4}{0} - \binom{4}{4} = 14.$$

Esercizi

1.1) Quanti sono i vettori booleani di lunghezza n

- (i) che hanno almeno un elemento uguale a **1**?
- (ii) che hanno solo i primi due elementi uguali a **1**?
- (iii) che hanno tutti gli elementi uguali?

1.2) In una città ci sono 5 alberghi.

- (i) In quanti modi 3 persone possono scegliere un albergo dove pernottare?
- (ii) Cosa cambia se ogni persona deve scegliere un albergo diverso?

1.3) (i) Quanti sono i vettori booleani di lunghezza n ?

- (ii) Quanti sono i suddetti vettori con esattamente k elementi uguali a **0**?
- (iii) Quanti sono i suddetti vettori se i primi k elementi sono uguali?

1.4) Sia $S = \{1, 2, \dots, 2n\}$; determinare

- (i) il numero di sottoinsiemi di S aventi cardinalità k e che contengono il numero 1;
- (ii) il numero dei sottoinsiemi di S aventi cardinalità k e che non contengono numeri pari.

1.5) Una squadra è formata da 11 titolari e 9 riserve. Selezionando 4 persone della squadra,

- (i) quanti raggruppamenti distinti si possono formare?
- (ii) quanti raggruppamenti distinti si possono formare, contenenti un solo titolare?
- (iii) quanti raggruppamenti distinti si possono formare, contenenti almeno un titolare?

1.6) In quanti modi si possono disporre in fila 5 donne e 4 uomini in modo che 2 uomini non siano mai consecutivi?

1.7) Quanti sono i numeri di 6 cifre che contengono esattamente due volte la cifra 1, esattamente due volte la cifra 2 e non contengono lo 0?

1.8) Stabilire quante sono le sequenze del tipo abc tali che

(i) a è un intero tra 1 e 9, b e c sono interi tra 0 e 9, e risulta $a > b > c$;

(ii) a è un intero tra 1 e 9, b e c sono interi tra 0 e 9, e risulta $a \geq b \geq c$.

1.9) Calcolare le seguenti somme:

$$(i) \quad \binom{10}{2} + \binom{10}{3} \qquad (ii) \quad \sum_{k=1}^7 \binom{8}{k} \qquad (iii) \quad \sum_{i=0}^3 \binom{4}{i} \binom{4}{3-i}$$

1.10) Calcolare le seguenti espressioni:

$$(i) \quad \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} 2^k \qquad (ii) \quad \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} 2^n \qquad (iii) \quad \sum_{k=1}^3 \binom{4}{k} 2^k 3^{n-k}$$