

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 5 — Klinische Studienberichte

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	5.2
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 5.2 Tabellarische Auflistung aller klinischen Studien

Abschnitt	Titel	Beschreibung
5.2	Tabellarische Auflistung aller klinischen Studien	Vollständige Inventarisierung aller unterstützenden klinische Studien NDA-123456
Phase-I-Studien	First-in-Human- und PK-Studien	SAD, MAD, Leber-/Nierenfunktionsstörung, Arzneimittelwechselwirkungsstudien (NXV-PK-01 bis -05)
Phase-II-Studien	Dosisfindungsstudien	Studie NXV-201: Phase-II-Dosisfindung (5, 10, 20 mg)
Phase-III-Studien	Pivotal Wirksamkeits- und Sicherheitsstudien	NXV-301 (placebokontrolliert) und NXV-302 (aktivkontrolliert)

Dieses Inhaltsverzeichnis deckt nur den Inhalt dieses Dokuments ab. Datei: 5.2-tabular-listing.pdf | NDA-123456 | Sequenz 0000 | PharmaCorp Inc.

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 5.2
Tabellarische Auflistung klinischer Studien

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

5.2 Tabellarische Auflistung aller klinischen Studien

Studie Nr.	Phase	Konstruktion	Bevölkerung	Dosis	Dauer	N	Primärer Endpunkt	Status
NXV-PK-01	I	Offen, SAD	Gesunde Probanden	1– 80 mg Einzeldosis	1 Tag	32	PK (Cmax, AUC, t1/2)	Vollständig
NXV-PK-02	I	Offen, MAD	Gesunde Probanden	5– 40 mg/Tag	14 Tage	24	PK im Steady State; Sicherheit	Vollständig
NXV-BA-01	I	Crossover, offen	Gesunde Probanden	10 mg (Tablette vs. IV)	Einzeldosis	16	Absolute Bioverfügbarkeit (F%)	Vollständig
NXV-BA-02	I	Crossover, offen	Gesunde Probanden	10 mg (gefüttert/nüchtern)	Einzeldosis	24	Nahrungsmittelleffekt auf AUC, Cmax	Vollständig
NXV-ADME-01	I	Massenbilanz, offen	Gesunde Probanden	10 mg [14C] – gekennzeichnet	Einzeldosis	8	Vollständige Genesung, Metabolitenprofil	Vollständig
NXV-PK-03	I	Offen, parallel	Leberbeeinträchtigung (Child-Pugh A,B,C) vs. gematchte gesunde	10 mg Einzelfach	1 Tag	32	PK-Vergleich	Vollständig
NXV-PK-04	I	Offen, parallel	Nierenschädigung (GFR-Stadien) vs. gesund	10 mg Einzelfach	1 Tag	32	PK-Vergleich	Vollständig
NXV-DDI-01	I	Crossover, offen	Gesunde Probanden	NXV 10 mg ± Ketoconazol 200 mg	10 Tage	20	CYP3A4 DDI (AUC-Verhältnis)	Vollständig
NXV-DDI-02	I	Crossover, offen	Gesunde Probanden	NXV 10 mg ± Simvastatin 40 mg	14 Tage	22	Simvastatin PK-Änderung	Vollständig
NXV-201	II	DB, RCT, parallel, SPS	Bluthochdruck-Patienten	2,5, 5, 10 mg/Tag	8 Wochen	320	SeDBP in Woche 8	Vollständig
NXV-301	III	DB, RCT, parallel, SPS	Bluthochdruck	10 mg/Tag	12 Wochen	892	DSeDBP in Woche 12	Vollständig
NXV-302	III	DB, RCT, parallel, SPS + aktiv	Bluthochdruck	10 mg/Tag vs. Amlodipin 10mg vs. PLC	24 Wochen	908	NI vs. Amlodipin (DSeDBP)	Vollständig
NXV-PED-01	III	DB, RCT	Pädiatrische Hypertonie (6– 17 Jahre)	2,5– 5 mg/Tag	8 Wochen	154	SeDBP	Laufend