

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD-Einreichung
Modul 5 — Klinische Studienberichte

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	5.4
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 5.4 Literaturreferenzen — Modul 5

Abschnitt	Titel	Beschreibung
5.4	Literaturreferenzen — Modul 5	Zitierte Literatur zur Unterstützung der klinischen Pharmakologie, Wirksamkeit und Sicherheit

Dieses Inhaltsverzeichnis deckt nur den Inhalt dieses Dokuments ab. Datei: 5.4-references.pdf | NDA-123456 | Sequenz 0000 | PharmaCorp Inc.

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 5.4
Literaturreferenzen — Modul 5

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

5.4 Literaturreferenzen — Modul 5

Die folgenden Referenzen wurden in den klinischen Dokumenten von Modul 5 zitiert:

Schiedsrichter #	Zitat
[1]	Whelton PK et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Leitlinie zur Prävention, Erkennung, Bewertung und Behandlung von Bluthochdruck bei Erwachsenen. J Am Coll Cardiol. 2018; 71(19):e127– e248.
[2]	Falaschetti E. et al. Hypertonie-Management in England: eine serielle Querschnittsstudie von 1994 bis 2011. Lancet. 2014; 383(9932):1912– 9.
[3]	Mancia G, et al. 2018 ESC/ESH-Richtlinien zur Behandlung von arterielle Hypertonie. J Hyperten. 2018; 36(10):1953– 2041.
[4]	Nissen SE, et al. Wirkung von Antihypertensiva auf kardiovaskuläre Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und normalem Blutdruck. JAMA. 2004; 292(18):2217– 25.
[5]	ICH harmonisierte Richtlinie. E9(R1): Statistische Prinzipien für klinische Prüfungen: Nachtrag zu Schätzungs- und Sensitivitätsanalysen. November 2019.
[6]	ICH harmonisierte Richtlinie. E6(R2): Gute Klinische Praxis. November 2016.
[7]	FDA-Leitlinien für die Industrie. Hypertonie-Indikation: Arzneimittelkennzeichnung für kardiovaskuläre Ergebnisbehauptungen. März 2011.
[8]	Dahlöf B, et al. Herz-Kreislauf-Morbidität und Mortalität in der Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension Study (LIFE). Lancet. 2002; 359(9311):995– 1003.
[9]	ALLHAT-Offiziere und Koordinatoren. Hauptergebnisse bei Hochrisikopatienten mit Bluthochdruck, randomisiert auf Angiotensin-umwandelnden Enzyminhibitor oder Kalziumkanalblocker vs. Diuretikum. JAMA. 2002; 288(23):2981– 97.
[10]	James PA, et al. 2014 Evidenzbasierte Leitlinie zur Behandlung von Bluthochdruck bei Erwachsenen: Bericht der Gremiumsmitglieder, die zum achten Gemeinsamen Nationalkomitee (JNC 8) ernannt wurden. JAMA. 2014; 311(5):507– 20.