

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 1 — Verwaltungsinformationen

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	1.3.1
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 1.3.1 Vorgeschlagene Kennzeichnung (Entwurf des Paketbeilegers)

Abschnitt	Titel	Beschreibung
1	Indikationen und Verwendung	Bluthochdruck; Stabile Angina pectoris
2	Dosierung und Verabreichung	10 mg einmal täglich; Leitlinien zur Dosierungsindividualisierung
4	Kontraindikationen	Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Nexivarin
5	Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen	Hypotonie; sich verschlimmernde Angina; Herzinsuffizienz
6	Nebenwirkungen	Erfahrung in klinischen Studien; Am häufigsten (>5 %): Ödem, Kopfschmerzen
8	Verwendung in bestimmten Populationen	Schwangerschaft, Laktation, pädiatrische, geriatrische, Leberschäden
11	Beschreibung	Chemische und physikalische Beschreibung von Nexivarin Hydrochlorid
12	Klinische Pharmakologie	Wirkmechanismus, Pharmakodynamik, Pharmakokinetik

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 1.3.1
Vorgeschlagene Beschriftung (Entwurf des Paketbeilegers)

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

NEXIVARIN® (Nexivarin Hydrochlorid) Tabletten, 10 mg

HÖHEPUNKTE DER VERSCHREIBUNGSIONFORMATIONEN

Diese Highlights enthalten nicht alle Informationen, die benötigt werden, um NEXIVARIN sicher und effektiv zu verwenden. Siehe vollständige Verschreibungsinformationen für NEXIVARIN.

NEXIVARIN® (Nexivarin Hydrochlorid) Tabletten, zur oralen Anwendung

Erste US-Genehmigung: 2021

Abschnitt	Inhalt
INDIKATIONEN UND VERWENDUNG	Bluthochdruck; Stabile Angina pectoris (1)
DOSIERUNG UND VERABREICHUNG	10 mg einmal täglich; Individualisiere die Dosis (2)
DOSIERUNGSFORMEN UND -STÄRKEN	Tabletten: 10 mg (3)
KONTRAINDIKATIONEN	Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Nexivarin (4)
WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN	Hypotonie; Verschlechternde Angina; Herzversagen (5)
UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN	Am häufigsten (>5 %): Ödem, Kopfschmerzen, Schwindel, Erröten (6)
ARZNEIMITTELWECHSELWIRKUNGEN	Starke CYP3A4-Inhibitoren (7,1); Simvastatin (7.2)
VERWENDUNG IN BESTIMMTEN POPULATIONEN	Leberbeeinträchtigung: Dosis reduzieren (8,7)

1 INDIKATIONEN UND VERWENDUNG

NEXIVARIN ist ein Dihydropyridin-Calciumkanalblocker, der für folgende Zwecke indiziert ist:

1.1 Bluthochdruck— **um den Blutdruck zu senken. Die Senkung des Blutdrucks verringert das Risiko tödlicher und nicht-tödlicher kardiovaskulärer Ereignisse, hauptsächlich Schlaganfälle und Herzinfarkte. Diese Vorteile wurden in kontrollierten Studien mit blutdrucksenkenden Medikamenten aus einer Vielzahl von pharmakologischen Klassen beobachtet.**

1.2 Chronische stabile Angina— **zur symptomatischen Behandlung chronisch stabiler Angina. Nexivarin kann allein oder in Kombination mit anderen antianginalen Mitteln verwendet werden.**

2 DOSIERUNG UND VERABREICHUNG

2.1 Erwachsene— **Die empfohlene Anfangsdosis für Bluthochdruck und chronisch stabile Angina beträgt 10 mg einmal täglich. Die Mehrheit der Patienten benötigt 10 mg für eine ausreichende Wirkung. Die Dosierung sollte an die Bedürfnisse jedes Patienten angepasst werden.**

2.2 Leberstörung— **Patienten mit schwerer Leberstörung sollten eine Erstdosis von 5 mg einmal täglich erhalten.**

2.3 Ältere— **Beginnen Sie mit einer Therapie mit 5 mg einmal täglich bei Patienten im Alter von 65 Jahren. Die Dosierungen können je nach klinischer Wirkung erhöht werden.**

4 KONTRAINDIKATIONEN

NEXIVARIN ist bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Nexivarin Hydrochlorid oder einem Bestandteil der Formulierung (z. B. Anaphylaxie, Angioödem) kontraindiziert.

5 WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

5.1 Symptomatische Hypotonie— **Symptomatische Hypotonie ist bei der Anwendung von NEXIVARIN möglich, insbesondere bei Patienten mit schwerer Aortenstenose. Überwachen Sie den Blutdruck aller Patienten.**

5.2 Verschlechterung von Angina pectoris und akuter Myokardinfarkt— **Selten haben Patienten, insbesondere solche mit schwerer obstruktiver koronarer Herzkrankheit, dokumentierte Häufigkeit, Dauer oder Schwere von Angina oder akutem Myokardinfarkt bei Beginn einer Calciumkanalblocker-Therapie oder zur Dosiserhöhung festgestellt.**

6 UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN

6.1 Erfahrungen mit klinischen Studien— Da klinische Studien unter sehr unterschiedlichen Bedingungen durchgeführt werden, können die in klinischen Studien beobachteten Nebenwirkungsraten eines Medikaments nicht direkt mit den Raten in klinischen Studien eines anderen Medikaments verglichen werden und spiegeln möglicherweise nicht die in der Praxis beobachteten Raten wider. Insgesamt wurden 1.850 Patienten in kontrollierten klinischen Studien NEXIVARIN ausgesetzt.

Nebenwirkung	Nexivarin 10 mg (N=924)	Placebo (N=926)
Ödem	14.6%	1.8%
Kopfschmerzen	7.3%	7.8%
Ermüdung	4.5%	2.8%
Schwindel	3.4%	1.5%
Spülung	2.6%	0.5%
Herzklopfen	1.4%	0.6%
Übelkeit	2.9%	1.9%
Bauchschmerzen	1.6%	1.5%

8 VERWENDUNG IN BESTIMMTEN POPULATIONEN

8.1 Schwangerschaft— Basierend auf der humanen Pharmakologie könnte Nexivarin theoretisch den fetalen und neonatalen Blutdruck negativ beeinflussen. Es gibt keine ausreichenden und gut kontrollierten Studien bei schwangeren Frauen. Verwenden Sie sie nur während der Schwangerschaft, wenn sie eindeutig notwendig ist.

8.2 Stillzeit— Es ist nicht bekannt, ob Nexivarin in der Muttermilch ausgeschieden wird. Da viele Medikamente in Muttermilch ausgeschieden werden, sollte bei der Verabreichung von NEXIVARIN an eine stillende Frau Vorsicht geboten werden.

8.4 Pädiatrische Anwendung— Sicherheit und Wirksamkeit von NEXIVARIN bei Patienten unter 6 Jahren sind nicht belegt.

8.5 Geriatrische Nutzung— Klinische Studien zu NEXIVARIN umfassten nicht genügend Probanden ab 65 Jahren, um festzustellen, ob sie anders auf jüngere Probanden reagieren.

11 BESCHREIBUNG

Nexivarin hydrochlorid ist ein Dihydropyridin-Calciumkanalantagonist (Calciumionenantagonist oder Langsamkanalblocker). Der chemische Name lautet 3-Ethyl, 5-Methyl (+)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-Chlorophenyl)-1,4-Dihydro-6-Methyl-3,5-Pyridindicarboxylat, Monohydrochlorid. Die Molekülformel ist C₂₀H₂₅ClN₂O₅·HCl und das Molekulargewicht beträgt 479,35. Nexivarin Hydrochlorid ist ein weißes kristallines Pulver.

12 KLINISCHE PHARMAKOLOGIE

12.1 Wirkmechanismus— Nexivarin ist ein Dihydropyridin-Calciumkanalblocker, der den transmembranalen Zufluss von Kalziumionen in den glatten Gefäß- und Herzmuskel hemmt. Experimentelle Daten deuten darauf hin, dass Nexivarin sowohl an Dihydropyridin- als auch an Nondihydropyridin-Bindungsstellen bindet. Die kontraktile Prozesse des glatten Gefäßmuskulatur und des Herzmuskels hängen von der Bewegung extrazellulärer Kalziumionen in diese Zellen über spezifische Ionenkanäle ab.

12.2 Pharmakodynamik— Nexivarin ist ein peripherer arterieller Vasodilatator, der direkt auf den glatten Gefäßmuskel wirkt, um den peripheren vaskulären Widerstand und den Blutdruck zu verringern. Nach der Verabreichung therapeutischer Dosen an Patienten mit Bluthochdruck erzeugt Nexivarin eine Vasodilatation, was zu einer Senkung des Rückdrucks im Rückstand und des stehenden Blutdrucks führt.

12.3 Pharmakokinetik— Nach oraler Verabreichung therapeutischer Nexivarin-Dosen führt die Aufnahme zu Spitzenplasmakonzentrationen zwischen 6 und 12 Stunden. Die absolute Bioverfügbarkeit wird auf 64 bis 90 % geschätzt. Die Bioverfügbarkeit von Nexivarin wird durch das Vorhandensein von Nahrung nicht verändert. Nexivarin wird umfangreich (etwa 97,5 %) über den Leberstoffwechsel in inaktive Metaboliten umgewandelt, wobei 10 % der Ausgangsverbindung und 60 % der Metaboliten im Urin ausgeschieden werden. Die terminale Eliminations-Halbwertszeit von Nexivarin beträgt 30– 50 Stunden. Stabile Plasmawerte werden nach 7 bis 8 Tagen erreicht.