ပဲစင်းငုံသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ

၁။သီးနှံအမည် - **ပဲစင်းငုံ**

အင်္ဂလိပ်အမည် - Pigeon Pea

သိပ္ပံအမည် - Cajauns Cajan (L) Millsp

၂။နိဒါန်း

ပဲစင်းငုံသီးနှံကိုအပူပိုင်းနှင့်အပူသမပိုင်းနိုင်ငံများတွင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ပဲစင်းငုံပင်သည်နှစ်ရှည်ခြုံပင်မျိုးဖြစ်သော်လည်းတစ်နှစ်ခံသီးနှံပင်အဖြစ်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။ပဲစင်းငုံကိုမိုးသီးနှံအဖြစ်အထက်မြန်မာပြည်အပူပိုင်းခြောက်သွေ့ဒေသများဖြစ်သည့်မန္တလေးတိုင်း၊စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းတို့တွင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည့်ပဲစင်းငုံမျိုးများမှာသက်ကြီးမျိုးများဖြစ်၍
အသက်ရက်(၂၇၅)ရက်ခန့်ရှိပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ပဲစင်းငုံစိုက်ပျိုးဧရိယာ၏(၉၀)%အထက်မှာသီးညှပ်သီးနှံအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။(၂၀၂၁-
၂၀၂၂)ခုနှစ်တွင်(၁၀၆၁၉၉၈)ဧကစိုက်ပျိုးပြီး(၁၄၄၅၃၈၄၀)တင်းထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

၃။ရာသီဥတုလိုအပ်ချက်

ပဲစင်းငုံသည်အပူချိန်(၂၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်လျော့နည်းပါကအပင်ကြီးထွားဖြစ်ထွန်းမှုကိုနှေးကွေးစေပါသည်။အပင်သက်တမ်းတလျှောက်နှင်းခါးရိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။အသင့်တော်ဆုံးအပူချိန်မှာ(၂၀-
၃၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပါသည်။ပဲစင်းငုံ၏အမြစ်သည်ရှည်လျားး၍ရေငတ်ဒဏ်ခံနိုင်ရှိပါသည်။မိုးရေသောက်စိုက်ပျိုးရာတွင်အပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးချိန်၌မိုးခေါင်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ရတက်ပါသည်။ပဲစင်းငုံသည်ရေဝပ်ပြင်းဒဏ်ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။အသင့်တော်ဆုံးမိုးရေချိန်မှာ(၁၀၀)လက်မအထက်ရွာသွန်းသည့်ဒေသများတွင်လည်းရေမဝပ်ပါကစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ပင်လယ်ရေမျက်ပြင်အထက်ပေ(၆၀၀၀၀)အထိစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ပဲစင်းငုံသည်နေ့တာအတိုအရှည်ပင်ဖြစ်၍စိုက်ချိန်သည်အပင်ကြီးထွားမှုနှင့်အပင်အမြင့်အတွက်အဓိကအရေးကြီးသည်။

နေ့တာအတိုအရှည်

ဒေသမျိုးများသည်လင်းတာတို၍အေးသောအချိန်တွင်ပန်းပွင့်ကြပြီးရေဆင်းစိုက်ပျိုးသုတေသနမှထုတ်ဝေသက်လျှင်မျိုးများသည်လင်းတာနှင့်အပူချိန်တုန့်ပြန်မှုမရှိပါ။တစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။သို့သော်ပန်းပွင့်ချိန်တွင်မိုးမိခြင်း၊အပူချိန်မြင့်ခြင်းအခြေအနေမျိုးမှလွတ်အောင်စိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ပ

နှံးပွင့်ရန်နေ့တာတိုကာလလိုအပ်ပါသည်။သို့သော်အပူချိန်(၂၀–
၃၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပါကနေတာရှည်သော်လည်းပန်းပွင့်ရက်စောနိုင်သည်။ပူလွန်း၍ပန်းစောပွင့်လျှင်
အဆံမတည်တက်ပါ။ဒေသမျိုးများကိုမိုးဦးကာလတွင်စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

ဝတ်မှုန်ကူးခြင်း

ပဲစင်းငုံသည်ပင်တည်းပင်ခြားနှစ်မျိုးနှစ်စားအောင်မြင်စွာမျိုးကူးနိုင်ပါသည်။ဝတ်ဆံဖိုတိုင်ရှည်ထွက်လာ
ြီးပန်းမပွင့်မီတစ်ရက်အလိုညနေဘက်တွင်ဝတ်မှုန်ရင့်၍မျိုးကူးသည်။ပျားနှင့်အခြားဝတ်ရည်စုပ်အင်း
ဆက်များကြောင့်(၂၀)%ထိဝတ်မှုန်ကူးနိုင်သည်။နံနက်(၁၁)နာရီမှညနေ(၃)နာရီကြားပန်းပွင့်ဝတ်မှုန်ကူး
လေ့ရှိသည်။မျိုးကူးစပ်လိုပါကမပွင့်မီ(နံနက်၉နာရီ)မတိုင်မီအဖိုဝတ်မှုန်တိုင်ဖယ်ရှားရမည်။

၄။မြေအမျိုးအစား

မြေအမျိုးအစားမရွေးသဲသမမြေမှ၍ စေးသမမြေအထိစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။မြေနီကျောက်စရစ်၊မြေနီသဲဝန်
း၊စနယ်မြေနက်တို့တွင်ဖြစ်ထွန်းပါသည်။နှုန်းမြေစေးမြေသြဇာထက်သန်၍မြေသားနက်သည့်သမမြေ
တွင်ပိုမိုဖြစ်ထွန်းပါသည်။မြေအချဉ်ငံဓာတ်PH(၇)ဝန်းကျင်ရှိပြီးရေစီးရေလာကောင်းသည့်မြေမျိုးကိုရွေး
ချယ်စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။မြေအချဉ်ဓာတ်လွန်ကဲခြင်းနှင့်ဆားပေါက်သည့်မြေမျိုးတွင်မြစ်ဖုဖြစ်ပေါ်မှုကို
ဟန့်တားစေပါသည်။မြေအချဉ်ငံဓာတ်PH(၅.၅)ထက်နိမ့်ပါကအပင်ကောင်းစွာမဖြစ်ထွန်းပါ။ပဲစင်းငုံအရွ
က်များ၊အသီးခြောက်များ၊ပဲမှော်များသည်မြေထဲ၌နိုက်ထရိဂျင်ဓာတ်ကိုကြွယ်ဝစေသဖြင့်မြေဆီမြေလွှာ
ညံ့သောဒေသများတွင်လည်းစိုက်ပျိုးသင့်သည်။ပဲစင်းငုံစိုက်ခြင်းဖြင့်မြေဆီလွှာကိုအာဟာရဓာတ်တိုးပွား
စေသည်။ပဲစင်းငုံအရွက်အသီးသီးတို့သည်လေထဲမှနိုက်ထရိဂျင်ဓာတ်ကိုစိုက်ပျိုးရာသီတစ်ရာသီအတွင်း
တစ်ဧကစိုက်ခင်းရှိအပင်များက(၁၈)ပေါင်မှ(၂၈)အထိစုပ်ယူနိုင်ကြောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်များကဆို
ထားပါသည်။ပဲစင်းငုံအမြစ်မှမီသိုင်းနွယ်ဝင်ပစီဒစ်အက်ဆစ်ထုတ်ပေးသည်။ၜင်းအက်ဆစ်ကြောင့်မြေထဲ
တွင်သံဓာတ်ကအထိန်းအချုပ်ခံထားရသောဖော့စဖိတ်ဓာတ်တို့ကိုအရည်ပျော်စေပြီးအမြစ်ကလွယ်ကူစွာ
စုပ်ယူစားသုံးနိုင်စေသည်။သံဓာတ်ကြောင့်ဖော့စဖိတ်ချုပ်ထိန်းခံရသောဒေသများတွင်ဖော့စဖိတ်ချုပ်ထိ
န်းခံရသောဒေသများတွင်ဖော့စဖိတ်ချို့တဲ့တက်သဖြင့်ပဲစင်းငုံကိုမဖြစ်မနေစိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

၅။စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသောမျိုးများ

ပဲစင်းငုံမျိုးတွင်ပင်ပြန့်၊ပင်ထောင်ဟူ၍အခြေခံမျိုးကြီးနှစ်မျိုးရှိသည်။အသက်ရက်ကိုလိုက်၍သက်ကြီးမျို
း၊သက်လတ်မျိုး၊သက်လျှင်မျိုးဟူ၍လည်းခွဲခြားခေါ်ကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း၊အပူပိုင်းခြောက်
သွေ့ဒေသများတွင်ရွှေဒင်္ဂါးနှင့်ငါးဆံပဲစသည့်သက်ကြီးပဲစင်းငုံမျိုးများကိုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေး
သုတေသနမှထောက်ခံထားသောမျိုးများနှင့်ဒေသမှစိုက်ပျိုးလေ့ရှိသောမျိုးများ၏အရည်အသွေးလက္ခ
ဏာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

အမည်	အသက်ရက်	အစေ့(၁၀၀) အလေးချိန် ဂရမ်	အထွက်နှုန်း တင်း/ဧက	အစေ့ အရောင်	စိုက်ပျိုးရန်သင့် တော်သောဒေသ
မုံရွာရွှေဒင်္ဂါး	၁၈၀-၂၀၀	၉-၁၀	၂၀-၂၅	နီဝါ	တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အား လုံး
ရေဆင်း-၆	၂၃၀-၂၄၀	၁၂-၁၃	၂၂-၂၅	နီဝါ	မကွေးရှမ်းပြည်နယ်
ရေဆင်း-၇	၁၈၀-၁၉၀	၁၀-၁၂	၂၀-၃၀	နီ	စစ်ကိုင်းမန္တလေး
သူဌေးကန်	၁၉၅-၂၀၀	၁၁-၁၂	၂၀-၂၅	နီဝါ	မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း

၆။မျိုးစေ့နှုန်းထား

အပင်အရေတွက်သည်အထွက်ကိုစိုးမိုးပါသည်။သက်ကြီးမျိုးအားတစ်ဧကအပင်ဦးရေ(၉၆၀၀)ပင်၊သက်လတ်မျိုးအားတစ်ဧက(၁၄၀၀၀)ပင်၊သက်လျင်တစ်ဧက(၄၃၀၀၀)ပင်၊ဝင်ဆံ့အောင်စိုက်ပျိုးရမည်။တစ်ဧက

(၂၅)တင်းထွက်ရှိရန်သက်ကြီးမျိုးတစ်ပင်လျှင်အသီးအောင်တောင့်(၂၀၀)တောင့်၊သက်လတ်တစ်ပင်လျှင်အသီးအောင်တောင့်(၁၅၀)တောင့်၊သက်လျင်မျိုးတစ်ပင်လျှင်အသီးအောင်တောင့်(၅၅)တောင့်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။တစ်တောင့်ပါအောင်စေ့(၃)စေ့မှ(၅)စေ့ပါဝင်ရန်လိုအပ်ပြီးအစေ့(၁၀၀)အလေးချိန်(၉-၁၅)ဂရမ်ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ပဲစင်းငုံတစ်ပင်ပါအောင်တောင့်အရေအတွက်ရရှိမှာဒေသနှင့်ကိုက်ညီသောမျိုးကောင်း၊မျိုးသန့်များကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရန်အရေးကြီးသည်။မျိုးစေ့နှုန်းထားသည်မျိုးစေ့အရွယ်အစားနှင့်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ပေါ်မူတည်၍တစ်ဧကလျှင်(၄-၆)ပြည်နှုန်းသုံးစွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။လိုအပ်သည့်အပင်အရေအတွက်ရရှိရန်မျိုးစေ့ပေါက်ရာခိုင်နှုန်း(၈၅-၉၀)ရှိသောမျိုးသန့်မျိုးစေ့ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။

၇။စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

ပဲစင်းငုံသီးနှံအားသီးသန့်(သို့)သီးညှပ်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။သီးသန့်စိုက်ပျိုးရာတွင်သက်တန်းအလိုက်သတ်မှတ်ထားသောအပင်အရေအတွက်ဝင်အောင်စိုက်ပျိုးရမည်။သီးညှပ်အဖြစ်ပဲစင်းငုံတစ်တန်းနှင့်တစ်တန်းကြားတွင်ပဲတီစိမ်းနှမ်း၊မြေပဲ၊ဝါ၊နေကြာနှင့်နှံစားပြောင်း(၃)တန်းမှ(၅)တန်းထိညှပ်၍စိုက်ပျိုးခြင်းသည်။သက်ကြီးမျိုးကိုတန်းကြား(၄.၅)ပေ၊ပင်ကြား(၁)ပေ၊သက်လတ်မျိုးကိုတန်းကြား(၃)ပေ၊ပင်ကြား(၁)ပေ၊သက်လျင်မျိုးကိုတန်းကြား(၂)ပေပင်ကြား(၆)လက်မစိုက်ပျိုးရသည်။ပဲစင်းငုံကိုသီးညှပ်စိုက်ပျိုးရာတွင်ပင်ကြားတန်းကြားကို(၁.၅-၃)ပေ(၇-၁၀.၅)ပေထိထား၍စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။

၈။ပဲစင်းငုံစိုက်ဧကများ

ပဲစင်းငုံစိုက်ဧကများနှစ်စဉ်တိုးတက်လျှက်ရှိပါသည်။နှစ်အလိုက်ပဲစင်းငုံစိုက်ဧကမှာအောက်ပါအတိုင်းြ
ြဖစ်ပါသည်။

စဉ်	ခုနှစ်	စိုက်ဧက
၁	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၁၀၉၈၇၃၆
၂	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၁၀၉၁၇၀၅
၃	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၁၀၆၇၂၀၉
၄	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၁၀၆၁၉၉၈

၉။ပဲစင်းငုံစားသုံးမှုနှင့် ပြည်ပစျေးကွက်အခြေအနေ

ပဲစင်းငုံကိုပြည်တွင်း၌ပဲဟင်း၊ပဲကြော်၊ပဲပြုတ်၊ပဲသီးစိမ်းပြုတ်၍စားသုံးကြသော်လည်းအများအားဖြင့်ပြ
ည်ပစျေးကွက်သို့တင်ပို့ရောင်းချမှုအတွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပဲစင်းငုံပြည်ပသို့တင်ပို့ရော
င်းချမှုအခြေအနေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	ခုနှစ်	တင်ပို့သည့်ပမာဏ (၀၀၀)မ/တန်	တန်ဖိုး(သန်းပေါင်း)
၁	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၁၈၂.၁၆၉	၁၀၁.၂၄၆
၂	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၅၃.၃၇၇	၂၉.၉၉၆
၃	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၁၄.၀၉၂	၁၄၄.၀၉၉
၄	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၄၅.၀၈၃	၁၃၃.၈၈

၁၀။နိဂုံး

ပဲစင်းငုံသည်ပြည်တွင်း၌အသင့်အတင့်သာစားသုံးပြီးပြည်ပ(အဓိကအားဖြင့်အိန္ဒိယ)သို့တင်ပိုရောင်းချလျှ
က်ရှိပြီးနိုင်ငံခြားငွေအများဆုံးရှာဖွေပေးသောပဲသီးနှံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ပဲစင်းငုံအထွက်တိုးအောင်စိုက်ပျို
းလာနိုင်နှင့်အမျှတောင်သူများဝင်ငွေတိုး
တက်၍လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားလာနိုင်မည်ကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ပဲစင်းငုံသီးနှံတစ်ကေ(၂၅) တင်း ထွက်ရှိရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

တစ်ဧကသဘာဝမြေဩဇာနွားချေး(၁၀၀-
၁၅၀)တင်းရောရှေနေရာနှံ့အောင်ချပါ။နွားထယ်(သို့)ထွန်စက်ကြီးနှင့်တစ်စပ်ကမ်းပြုအောင်အနည်းဆုံးအ
နက်(၆)လက်မရအောင်ထိုးပြီးယူရီးယား(၈)ပြည်၊တီဆူပါ(၂၄)
ပြည်၊ပိုတက်(၁၂)ပြည်၊ဂျစ်ပဆန်(၂၀)ပြည်ကိုသမအောင်ရောမွှေပြီးမြေခံကျဲပတ်ပါ။ထွန်းရေးကောင်းစွာ
ညက်အောင်သုံးစပ်မွှေပါ။ရေဝပ်ခြင်းကင်းဝေရန်မြေမျက်နှာပြင်ညီညာစွာညှိပေးပါ။အပင်ငယ်စဉ်ရေဝပ်ပ
ါကတစ်ညအိပ်ပင်မခံနိုင်ပါ။မျိုးအဖြစ်မုံရွာရွှေဒင်္ဂါး၊သူဌေးကန်၊ရေဆင်း(၆)၊ရေဆင်း(၇)မျိုးများကိုအထွ
က်ကောင်းမျိုးများအသုံးပြုပါ။မြေတွင်းအောင်းပိုးများကာကွယ်ရန်ဖျူရာဒန်(၁-
၃)ပိဿာ/ဧကစိုက်ပျိုးမည့်မျိုးစေ့ဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။

စိုက်ပျိုးခြင်း

(၀၁ ရက်)

အပင်ပေါက်ကောင်း၍အပင်ပေါက်ညီညာရန်ပဲစင်းငုံမျိုးစေ့များကိုနာရီဝက်ခန့်ရေစိမ်ပြီးပဲမြစ်ဖုဇီဝမြေ
ဩဇာတစ်ထုတ်နှင့်သမအောင်ရောမွှေပြီးမှစိုက်ပါ။အပင်ငယ်စဉ်ညိုးသေရောဂါကျတက်သောကြောင့်မှို
သတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုမျိုးစေ့တစ်ပြည်လျှင်(၁)ဂရမ်နှုန်းဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပါ၊သက်ကြီးမျိုးအတွက်တစ်
ဧကအပင်ဦးရေ(၉၆၀၀)ပင်၊သက်လတ်မျိုးအားတစ်ဧက(၁၄၅၂၀)ပင်၊သက်လျှင်တစ်ဧက(၄၃၅၆၀)ပင်၊၀
င်ဆန့်ရန်အတွက်မျိုးစေ့နှုန်း(၄-
၆)ပြည်နှုန်းသုံးပါ။အပင်ပေါက်ညီညာ၍အပင်ပေါက်ကောင်းရန်ထယ်ရေးအတွင်းမျိုးစေ့အတိမ်အနက်(၁
-၂)လက်အတွင်းရအောင်စိုက်ပါ။

(၀၄ ရက်)

အစေ့မှစတင်အပင်ပေါက်သည်။

(၁၅ရက်)

အပင်ပေါက်စုံသည်။ပင်ညိုးရောဂါကာကွယ်ရန်မှုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးပတ်ဖျန်းပါ။အပင်ငယ်စဉ်လေး၊
ကျိုင်းမွားပင့်ကူနီစသည့်ပိုးများကျတက်သောကြောင့်ပင်လုံးပြန့်သတ္တိရှိသည့်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးပတ်ဖျန်း
ပါ။(မွားပင့်ကူသည်ပင်ဖိုမှိစိတ်ရောဂါကိုသယ်ဆောင်သောပိုးဖြစ်သည်။)

(၁၅ရက်-၅ရက်)

ပဲပင်များကြီးထွားသန်မာဖြစ်ထွန်းရန်(NPK)နှင့်အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များပါ၀င်သောရွက်ဖျန်းမြေ
ဩဇာများတွင်နိုက်ထရိဂျင်အချိုးများသည့်သင့်တော်သောရွက်ဖျန်းမြေဩဇာတစ်မျိုးမျိုးကို(၁၅)ရက်ခြာ
းတစ်ကြိမ်ဖြင့်(၃)ကြိမ်ပတ်ဖျန်းပါ။

(၁၅ရက်-၆၀ရက်)

ရွက်ဖောက်၊လှေး၊ကျိုင်း၊ရွက်စား၊ပိုး၊ငမြောင်တောင်၊ပျိုး၊သရစ်၊လှေးပိုး၊ပွင့်ထွေး၌ရွက်ကပ်ပိုး၊မွှေပင့်ကူးနီစသည့်ပိုးများမကျရောက်စေရန်(၁၅-
၆၀)ရက်သားအထိပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး(သို့)အခြားထိသေဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ပတ်ဖျန်းပါ။သီးနှံသက်တမ်းတလျောက်လုံးပင်ညိုးရောဂါ၊ဖားဥမှိုရောဂါ၊သံချေးမှိုရောဂါ၊ရွက်ခြောက်ရောဂါကျရောက်တက်၍သင့်တော်သောပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို(၁၅)ရက်ခြားတစ်ကြိမ်(၄)ကြိမ်ပတ်ဖျန်းပါ။

(၂၀ရက်-၆၀ရက်)

ပေါင်းမြက်ကင်းစင်ရန်(၂၀)ရက်သားလျှင်ကြားထွန်းလိုက်ပါ။(၂၅)ရက်သားတွင်သံထွန်းလိုက်ပါ။(၃၀)ရက်သားတွင်ပေါက်ပြားပေါင်းလိုက်ပါ။(၆၀)ရက်သားတွင်ပေါင်းမြက်ကင်းစင်ရန်နှင့်ရရှိထားသောမိုးရေနှင့်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ထယ်ကြောင်းထိုးပါ။ပန်းပွင့်ချိန်တွင်ပွင့်အားကောင်း၍သီးတောင့်များရန်(NPK)အချိုးမြေဩဇာများတွင်(P)နှင့်(K)အချိုးများသောသီးပွင့်ရွက်မြေဩဇာ(၁၀)ရက်ခြား(၂)ကြိမ်ဖျန်းပါ။(သို့)ယူရီးယား(၄.၅)ဂွန်းနှင့်လက်ချား(၁)ဂွန်း၊ရေတစ်ဂါလံနှင့်ရောပြီးတစ်ဇက(၂၀)ဂါလံနှုန်းဖျန်းပါ
။

(၈၀ရက်-၉၀ရက်)

တစ်တောင့်ပါအောင်စေ့အရေအတွက်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။တစ်တောင့်လျှင်အေ
ာင်စေ့(၃-
၄)စေ့ပါရှိရန်သီးတောင့်ဖြစ်ချိန်၊အစေ့အဆံတည်ချိန်ဖြစ်၍သီးလုံးဖောက်ပိုးဂရုစိုက်ပါ။ပင်လုံးပြန့်သတ္တိရှိသောဆေးတစ်မျိုးမျိုးနှင့်ထိသေအာနိသင်ရှိဆေးတစ်မျိုးမျိုးအားတစ်လှည့်စီဖျန်းပါ။အစေ့အဆံဖြစ်ထွန်းချိန်တွင်(NPK)အချိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများတွင်(P)နှင့်(K)အချိုးများသည့်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာတစ်မျိုးမျိုးပတ်ဖျန်းပါ။

ရိတ်သိမ်းခြင်း

(၁၀၅ရက်-၁၄၀ရက်)

အတောင့်များ(၇၅-၈၅)%ရင့်မှည့်ချိန်တွင်ဆွတ်ခူးရိတ်သိမ်းပါ။(၇-
၁၄)ရက်အထိနေလှန်းသန့်စင်၍အစိုဓာတ်(၈-
၁၀)%အောက်ထားရှိပြီးသိုလှောင်ပါ။သိုလှောင်ရာတွင်အစေ့ထိုးပိုးဝင်ရောက်တက်သဖြင့်ဆေးနှင့်လူးနယ်သိုလှောင်ပါ။