ပဲပုပ် အထွက်နှုန်းတိုးတက်စေရန် လိုက်နာရမည့် နည်းပညာအချက်အလက်များ

၁။ ပဲမျိုးစုံသီးနှံမျိုးအလိုက် အထွက်နှုန်းတိုးရန် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

မြန်မာအမည် – ပဲပုပ်

အင်္ဂလိပ်အမည် – Soybean

သိပ္ပံအမည် – Glycine max (L) Merrill

သိပ္ပံအမည်ကွဲ – Glycine soja Sieb and Zucc Soja max

၂။နိဒါန်း

ပဲပုပ်သီးနှံသည် Glycine ussriensis မျိုးစိတ်မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ပဲပုပ်သီးနှံ၏ မူရင်းဒေသမှာ အရှေ့တောင်အာရှဖြစ်ပြီး တရုတ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မျိုးရိုင်းများကို စိုက်ပျိုးသည်။ ပဲပုပ်မျိုးများစွာရှိပါသည်။ ၎င်း၏သက်တမ်းကာလကိုလိုက်၍ မျိုးအုပ်စု(၁၀) စုခွဲခြားထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပဲပုပ်သီးနှံကို ပြည်တွင်းစားသုံးရန်နှင့် ပြည်ပသို့ ဆီထွက်သီးနှံအဖြစ် တင်ပို့လျှက်ရှိသောသီးနှံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပဲပုပ်ကို ပဲငပိဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ (၁၉၆၅)ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စိုက်ပျိုးရေးပညာစာအုပ်(စာပေဗိမာန်ထုတ်)တွင် ပဲငပိ(Soy Bean)ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ပဲပုပ်သီးနှံသည် အာဟာရနှင့် စီးပွားရှုထောင့်အရ တန်ဖိုးရှိ၍ အရေးပါသည့် ပဲမျိုးစုံသီးနှံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အသားဓါတ်ခေါ် ပရိုတိန်း(၄၀-၄၅)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ (၁၉-၂၀)ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါသည်။ ပဲပုပ်ဆီသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနေရာတွင်ရှိသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ပဲပုပ်သည် ရေးအကျဆုံး စားသုံးသီးနှံဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် အသုံးဝင်ဆုံးသီးနှံအဖြစ်အောင်မြင်မှုရလျှက်ရှိပါသည်။ ပဲပုပ်အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်ဒေသမှာ ရှမ်းပြည်နယ်ဖြစ်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးစိုက်ကေ၏ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း စိုက်ပျိုးပါသည်။ ကျန်ရှိဇရိယာများကို မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ဧရာဝတီနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သီးသန့်သော်လည်းကောင်း၊ သီးညှပ်သီးနှံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်း၊ နေကြာသီးနှံတို့နှင့် ညှပ်၍ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြစ်ရေကျချိန် ကိုင်းကျွန်းမြေများ၌ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပဲပုပ်သီးနှံသည် တစ်ရာသီခံပင်ဖြစ်ပြီး ပင်တည်းဝတ်မှုံကူးသော အပင်အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပဲပုပ်သီးနှံကို တောင်ပေါ်ဒေသတွင် မေလနှင့် ဇွန်လ၊ မြေပြန့်ဒေသတွင် ဩဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလ ၊မြစ်ရေကျသည့် ကိုင်းကျွန်းမြေများတွင် အောက်တိုဘာလ၊စပါးအပြီး သီးထပ်စိုက်ပျိုးလျှင် နိုဝင်ဘာလအတွင်း စိုက်ပျိုးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပဲပုပ်ကို(၂၀၂၁-၂၀၂၂)ခုနှစ် စိုက်ပျိုးမှုများမှာ (၃၂၄၄၃၈)ဧကထိ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ရာသီဥတုလိုအပ်ချက်

ပဲပုပ်သီးနှံသည် မိုးရေချိန်ပျမ်းမျှ(၁၆-၂၂)လက်မအတွင်း ရွာသွန်းသော ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။ ထိုထက်ပိုများသောဒေသများ၌လည်း မိုးရေချိန် ပျမ်းမျှ(၂၄-၆၀)လက်မရရှိလျှင်အကောင်းဆုံး စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါသည်။ သီးနှံကြီထွားချိန်တလျှောက်လုံးတွင် မိုးညီညာစွာရွာသွန်းပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ပဲပုပ်သီးနှံသည် ပန်းပွင့်ချိန်တွင် နေ့တာတိုရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင် ညအမှောင်ချိန် (၁၆)နာရီနှင့် အလင်းရောင်ရချိန် (၈)နာရီ လိုအပ်ပါသည်။ အပူပိုင်းဒေသများတွင် ညအမှောင်ချိန် အနည်းဆုံး(၁၄)နာရီ လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းပွင့်ချိန်တွင် ယင်းကဲ့သို့ ညတာရှည်ချိန် အနည်းဆုံး(၂-၃)ရက်အထိနှင့် အများဆုံး(၅-၆)ရက်အထိ

မျိုးအလိုက်လိုအပ်ပါသည်။ သက်တမ်းရှည်သည့် မျိုးများသည် သက်တမ်းတိုသည့် မျိုးများထက် လင်းတာတုံပြန်မှု၏ လွှမ်းမိုးမှုပိုများသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပဲပုပ်မျိုးတစ်မျိုးအား ဒေသတစ်ခုတွင် စိုက်ပျိုးပါက အပူချိန်(၁၆)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်နှင့် ရှိသင့်သည့်လင်းတာထက်လျော့နည်းလျှင် ပန်းပွင့်စော၍ သက်တမ်းတိုသွားပြီး အပင်ကြီးထွားမှု၊ အပင်အမြင့်၊အဆစ်အရေအတွက် စသည်တို့ လျော့နည်းပြီး အထွက်ကျဆင်းသွားပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပဲပုပ်သီးနှံအား ဆောင်းရာသီတွင် စိုက်ပျိုးလိုပါကအောက်မြန်မာပြည်၌သာဒေသနှင့် သင့်တော်သည့် မျိုးအား ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

အပူချိန်

ပဲပုပ်ကို အပူချိန်အမျိုးမျိုးတွင် အောင်မြင်စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အပင်ပေါက်ရန် လိုအပ်သည့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်၍ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၄၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပါသည်။ အပင်ပေါက်နှုန်းကောင်းရန် အသင့်တော်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၂၀-၃၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ဖြစ်ပါသည်။ ပန်းပွင့်ချိန်မှ သန္ဓေအောင်ပြီးအထိ သီးတောင့်ဖြစ်ထွန်းချိန်တွင် ညအပူချိန်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ညအပူချိန်မှာ (၂၁-၂၇)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် နေ့အပူချိန်(၄၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလျှင် ပဲပုပ်သီးနှံ ဖြစ်ထွန်းမှု ကောင်းမွန်ပါသည်။ ပဲပုပ်တွင် အဓိက အစိုခါတ်လိုအပ်ချိန်(၂)ချိန်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အစေ့မှအပင်ပေါက်ချိန်နှင့် သီးတောင့်အတွင်း အစေ့တည်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးရာတွင် မိုးရေအားကိုးနှင့်သာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အစေ့အဆံတည်ချိန်သည်ပန်းပွင့်ချိန်ထက်ပို၍အစိုဓာတ်လိုအပ်ပါသည်။အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းကိုရရှိရန်အစေ့အဆံတ ည်ချိန်တွင်အစိုဓာတ်လုံလောက်စွာရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။အချို့ဒေသတွင်ထပ်မံလိုအပ်သည့်အစိုခါတ်ကိုရေသွင်း၍ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အစေ့တည်ချိန်နှင့် အသီးရင့်မှည့်ချိန်တွင် စိုထိုင်းဆများခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းဖြင့် အစေ့အရည်အသွေး ကျဆင်းစေပါသည်။

၄။ မြေအမျိုးအစား

ပဲပုပ်သည် သဲသမမြေမှ မြေစေးမြေအထိ မြေအမျိုးအစားမရွေး ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါသည်။ ရေစီးရေလာကောင်း၍ ညီညာသောမျက်နှာပြင်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြေချဉ်ဝင်ခါတ်(pH-၇.၀) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည့် မြေမျိုးဖြစ်ပြီး မြေဆွေးခါတ်ကာဗွန်ကြွယ်ဝသည့် မြေမျိုးသည် ပဲပုပ်စိုက်ပျိုးရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ မြေချဉ်ဝင်ခါတ်(pH-၅.၅)ထက် လျော့နည်းပါက အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုအားနည်းပါသည်။မြေချဉ်လျှင် ထုံးထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆားငံပေါက်သည့်မြေတွင် အပင်ပေါက်မှု ဟန့်တားပါသည်။

၅။ စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသောမျိုးများ

တောင်သူအများဆုံး စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသော မျိုးများသည် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဝေထောက်ခံထားသည့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များနှင့် ဒေသအထွက်ကောင်းမျိုးများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အဆိုပါမျိုးများ၏ အရည်အသွေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

မျိုးကွဲအမည်	အသက်ရက်	အစေ့၁၀၀ အလေးချိန်	အထွက်နှုန်း တင်း/ဧက	အစေ့အရောင်	စိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သောဒေသ
ရေဆင်း-၆	၁၀၅-၁၁၀	၁၅.၀	၂၅-၃၀	အဝါရောင်	မိုးရာသီနှင့်စပါးသီးထပ်တွင် ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်
ရေဆင်း-၁၄	၈၅-၉၀	၁၅.၀	၂၀-၂၅	အဝါရောင်	မိုးရာသီတွင်ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်
ရေဆင်း-၁၅	၁၁၀-၁၁၅	၁၃.၅	၂၈-၃၀	အဝါရောင်	မိုးရာသီနှင့်စပါးသီးထပ်တွင် ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်
ရေဆင်း-၃	၈၅-၉၀	၁၄.၀	၁၈-၂၀	အဝါရောင်	မိုးရာသီတွင်ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်
ရေဆင်း-၁၁	၁၁၅-၁၂၀	၁၄.၀	၂၇-၃၀	အဝါရောင်	မိုးရာသီနှင့်စပါးသီးထပ်တွင် ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်
ရေဆင်း-၂	၁၀၀-၁၀၅	၁၅.၀	၂၅-၂၈	အဝါရောင်	မိုးရာသီတွင်ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်

၆။ မျိုးစေ့နှုန်းထား

ပဲပုပ်တစ်ဧက တင်း(၂၀)ရရှိရန် မျိုးစေ့ပေါင်း တစ်ဧကသိန်း(၁၃၀)စေ့ကျော် ရရှိရန်လိုသဖြင့် တစ်တင်းတွင် အစေ့ပေါင်း(၆)သိန်းခွဲကျော်ခန့် ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ရရှိရန် တစ်ဧကရိတ်သိမ်းပင်ပေါင်း(၁၃၀၀၀၀)ရှိရန် တစ်ပင်ပါသီးတောင့်(၂၀)ရရှိရန်၊ တစ်တောင့်လျှင် အောင်စေ့(၂)စေ့မှ (၃)စေ့ရှိပြီး၊ အစေ့(၁၀၀)အလေးချိန် (၁၄-၁၅)ဂရမ် ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အပင်(၃၀၀၀၀)ခန့်လျော့နည်းပါက တစ်ဧက(၅)တင်းခန့် လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။ မစိုက်ပျိုးမီ အပင်ပေါက်နှုန်းအား စမ်းသပ်ပြီး အပင်ပေါက်ရာခိုင် နှုန်း(၉၀)ခန့်ရှိသော မျိုးကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အတန်းလိုက်စိုက်ခင်းတွင်တစ်ဧက(၁၃-၁၄)ပြည်နှုန်းအားလည်းကောင်း၊ ကြဲပက်သည့်စိုက်ခင်းတွင် တစ်ဧကပျမ်းမျှ(၁၈-၂၀)ပြည် သုံးစွဲပါ။ မိမိဒေသအတွင်း အပင်ငယ်စဉ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်သော ပမာဏအားထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ တစ်ဧကရိတ်သိမ်းပင် (၁၃၀၀၀၀)ရရှိရန် လိုအပ်သဖြင့် အပင်ပေါက်စုံရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပင်ပေါက်စုံရန်အတွက် အစိုဓာတ်မီရန် စိုက်ချိန်မှန်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။

၇။ပဲပုပ်သီးနှံပုံစံ

ပဲပုပ်သီးနှံအား ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ညမိုးရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီ၌လည်း စိုက်ပျိုးကြပြီး ကျန်တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် ဆောင်းရာသီစပါးအပြီး သီးထပ်အဖြစ် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါးအပြီးသီးထပ်စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ပါက မိုးစပါးအား အောက်တိုဘာလကုန်ရိတ်သိမ်းနိုင်သည့် သက်လတ်စပါးမျိုးကို စိုက်ရမည်။ စပါးရိတ်သည့်အခါ အောက်ခြေပြတ်ရိတ်၍ ခြေနင်းခံနိုင်သောမြေအခြေအနေတွင် စိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သော အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ မြေကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်ကြည့်လျှင် မြေလုံးမကွဲသောအခြေအနေသည် အစိုဓာတ်အနေတော်ဖြစ်ပါသည်။

၈။ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

ပဲပုပ်ကို အများအားဖြင့် စပါးသီးထပ်(သို့)ရေလိုက်ကြဲပတ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အတန်းလိုက်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ဖြင့် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။ အတန်းလိုက်စိုက်ပျိုးခြင်းသည် အထွက်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ပဲပုပ်ကို အစိုဓာတ်မိမိနှင့် စောစောအပင်ပေါက်ရစေရန် ရေလိုက်ကြဲစနစ်၊ ဓားခုတ်ဖုန်းစနစ်၊ ထွန်ရေဖြင့် စိုက်သောစနစ်(ထွန်ပဲစနစ်) စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။

၉။ ပဲပုပ်စိုက်ကေများ

ပဲပုပ်စိုက်ကေများ နှစ်စဉ်တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ နှစ်အလိုက်မတ်ပဲစိုက်ကေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	ခုနှစ်	စိုက်ကေ
၁	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၃၄၃၈၅၅
၂	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၃၃၉၇၂၇
၃	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၃၂၆၂၀၃
၄	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၃၂၁၄၃၈

၁၀။ပဲပုပ်စားသုံးမှုနှင့်ပြည်ပဈေးကွက်အခြေအနေ

ပဲပုပ်ကို ပြည်တွင်း၌ ပဲပင်ပေါက်၊ ပဲဟင်း၊ ပရာကြော်၊ တို့ဟူး၊ ပဲနို့၊ ပဲပုပ်ဆော့၊ ပဲပုပ်ပြား၊ ပဲပြား ၊ဒိန်ချဉ်၊ ပဲပြားပူတင်း၊ ပဲပုပ်ထောင်း၊ ပဲပုပ်စေ့လှော်၊ ဆီတို့ဟူး၊ ကြာညို့၊ ပဲငံပြာရည်၊ ပဲမုန့်၊တို့ပြုလုပ်၍ စားသုံးကြသော်လည်း ဖယောင်းတိုင်၊ ဇီဝလောင်စာဆီ၊နှင့် သုတ်ဆေးများအဖြစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ်လည်း အသုံးပြု၍ အများအားဖြင့် ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရောင်းချမှုအတွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပဲပုပ်ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချမှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	ခုနှစ်	တင်ပို့သည့်ပမာဏ(တန်)	တန်ဖိုးပေါင်းသန်းပေါင်း
၁	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၆၃၈၆	၂.၇၃၇
၂	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၁၅၆၈၉	၆.၆၆၇
၃	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၆၁၇၆	၃.၆၄၈
၄	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၄၆၀၉.၂၉၆	၂.၉၀၅

၁၁။ နိဂုံး

ပဲပုပ်သည် ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံ၍ ပြည်ပ(အဓိကအားဖြင့်တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ)သို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံခြားငွေအများဆုံးရရှာဖွေပေးသော ပဲသီးနှံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပဲပုပ်အထွက်တိုးအောင် စိုက်ပျိုးလာနိုင်နှင့်အမျှ တောင်သူများဝင်ငွေတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ပဲပုပ်သီးနှံ တစ်ကေတင်း (၂၀) ထွက်ရှိရေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

(မြေယာပြုပြင်ခြင်း

)တစ်ဧက နွားခြေ၊သဘာဝမြေဩာ (၁၀၀-၁၅၀)တင်း နေရာနှံအောင်ချပါ။ နွားထယ်(သို့)ထွန်းစက်ကြီးဖြင့် ထယ်တစ်စပ်(သို့) နှစ်စပ်ထိုးပါ။ ထယ်စာခဲခေါင်းဖွေးအောင် နှစ်နေသုံးနေလှမ်းပြီးနောက်မြေခံမြေဩာ ယူရီးယား(၈)ပြည်၊ တီစူပါ(၂၄)ပြည်၊ ပိုတက်(၁၂)ပြည်၊ ဂျစ်ပဆမ်(၂၀)ပြည်ကို ရောမွှေကြဲပတ်ပါ။ ထို့နောက် ထွန်းရေသင့်တင့်စွာ ညက်အောင်ထွန်းနှစ်စပ်မွှေပေးပါ။မြေကောင်းမြေမွှေသော ဒေသများတွင် စပါးရိုးပြတ်တိုအောင်ရိတ်၍ ပထမဦးစွာ မတ်ပဲမျိုးစေ့ကြဲးပတ်ပြီး ကွန်းဒေါင်းထွန်း(Rotavator)နှင့် နှစ်စပ်မောင်း၍ ကြမ်းတုန်းရိုက်ပြီး စိုက်ပျိုးရပါမည်။မြေစေးမြေမာသော စိုက်ခင်းများတွင် ပထမဦးစွာ နွားထယ်(သို့) ထွန်စက်ကြီးဖြင့် ထယ်တစ်စပ်မောင်း၍ ထွန်တစ်စပ်ခြေပြီး မျိုးစေ့ကြဲပတ်ကာ နွားထွန်(သို့) ကွန်းဒေါင်းထွန်ဖြင့် တစ်စပ်မွှေ၍ကြမ်းတုန်းရိုက် စိုက်ပျိုးရပါမည်။ ထယ်ထိုးခြင်း၊ ထွန်းမွှေခြင်းများကို မြေ၏အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

မျိုးစုဆောင်းခြင်း

မျိုးအဖြစ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနမှ ထောက်ခံထုတ်ဝေထားသည့် ရေဆင်း(၃)၊ ရေဆင်း(၆)၊ ရေဆင်း(၁၁)၊ ရေဆင်း(၁၂)၊ ရေဆင်း(၁၄) ၊ ရေဆင်း(၁၅)စသည့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ(သို့) မိမိဒေသတွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနေသော မျိုးများရှိပါက မျိုးသန့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ မျိုးအဖြစ် စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဧကရိတ်သိမ်းအပင်(၁၃၀၀၀၀)ရရှိရန်အတန်းလိုက်စိုက်ပါက (၁၃-၁၄)ပြည်နှုန်း သုံးပါ။ကြဲပတ်ပါက မျိုးစေ့(၁၈-၂၀)ပြည်နှုန်းသုံးပါ။

စိုက်ပျိုးခြင်း

(၀၁ ရက်)

ပဲပုပ်မျိုးစေ့များကို နာရီဝက်ခန့် ရေစိမ်ပြီး ပဲမြစ်ဖုဇီဝမြေဩာတစ်ထုတ်နှင့် သမအောင်ရောမွှေစိုက်ပါ။ ။အပင်အစိပ်ကျဲညီအောင် မျိုးစေ့ကို နှစ်လွှာကြဲပါ။ ကြဲပြီးပြီးချင်း ကြမ်းဖြင့်နှစ်ပြန်အုပ်ပေးပါက အစိုဓာတ်လုံလောက်စွာ ရရှိ၍ အပင်ပေါက်ညီညာပြီး လိုအပ်သော အပင်ဦးရေရရှိနိုင်ပါသည်။ အတန်းလိုက်စိုက်မည်ဆိုပါက စိုက်ကြောင်းပေး၊မျိုးစေ့ချပြီး ကြမ်းပြန်အုပ်ပေးရပါမည်။ ကြဲပတ်မည်ဆိုပါက ညနေပိုင်းတွင် ကြဲပတ်ရန်သင့်တော်ပြီး လက်ဆည်အောင် ကြဲပတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပင်ညိုးသေနှင့် အခြားရောဂါများ မကျရောက်အောင် မျိုးစေ့ကို မှိုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်လူးနယ်၍ စိုက်ပျိုးပါ။ အပင်ပေါက်ညီညာ၍ အပင်ပေါက်ကောင်းအောင် ထယ်ရေးအတွင်း မျိုးစေ့ကို အတိမ်အနက်(၁.၂)လက်မအတွင်း ရအောင်စိုက်ပါ။ အပင်စပေါက် သည်။

(၀၅-၁၅ ရက်)

အပင်ပေါက်စုံပါသည်။ အပင်ငယ်စဉ် လှေး၊ ကျိုင်း၊ ပျ၊ မွှား၊ ပင့်ကူနီ၊ ပင်စည်ထိုးယင်တို့ ကာကွယ်ရန် ပင်လုံးပြန့်သတ္တိရှိသော ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို တစ်ဧကလျှင် သတ်မှတ်နှုန်းဖျန်းပါ။ ညိုးသေရောဂါကာကွယ်ရန် မှိုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖျန်းပါ။ ပေါင်းမြက်ကင်းစင်အောင် စတင်ဆောင်ရွက်ပါ။

(၁၅ရက်-၃၀ရက်)

ပေါင်းမြက်များကင်းစင်အောင် စတင်ဆောင်ရွက်ပါ။ ပဲပင်များ ကြီးထွားသန်မာဖြစ်ထွန်းရန် (NPK)နှင့် အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များ ပါဝင်သော ရွက်ဖြန်းမြေဩာများတွင် နိုက်ထရိဂျင်အချိုးများသည့် သင့်တော်သော

ရွက်ဖြန်းမြေဩဇာတစ်မျိုးမျိုးကို (၁၅)ရက် ခြား၍ နှစ်ကြိမ်ပတ်ဖျန်းပါ။ ပေါင်းမြက်ကင်းစင်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။ သီးကိုင်းဖူးလေးများ စတင်နှံကြားလာသည်။ ထိုအချိန်တွင် အစိုဓာတ်မပျက်ရန်၊ အာဟာရဓာတ်မချို့တဲ့ရန်၊ ပိုးမွှားရောဂါမကျရောက်ရန် ဂရုပြုရမည်။

(၃၅ရက်-၄၅ရက်)

(၃၅)ရက်ခန့်တွင် ကိုင်းဖျားပန်းဖူးလေးများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပန်းဖူးပေါ်ပြီး တစ်ပတ်အကြာ ပန်းစပွင့်သည်။ (၄၅)ရက်သားမှ (၆၀)ရက်သားအတွင်း ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်၍ ပွင့်အားကောင်းအသီးတောင့်များရန် (NPK)အချိုးပါသော ရွက်ဖြန်းမြေဩဇာများတွင် ဖော့စဖရပ်နှင့် ပိုတက်ဆီရမ်ရာခိုင်နှုန်းများသော သီးပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများကို (၁၅)ရက်ခြား နှစ်ကြိမ်ဖျန်းပါ။ (သို့)ရေတစ်ဂါလံတွင် ယူရီးယား(၄.၅)ဂွန်းနှင့် လက်ချားတစ်ဇွန်းရော၍ တစ်ဧကလျှင်ဂါလံ(၂၀)ဖျန်းပါ။

(၁၅ရက်-၆၀ရက်)

နှံစုပ်ဂျပိုး၊ ရွက်ဖောက်၊လှေး၊ကျိုင်း၊ ရွက်စားငမြောင်တောင်၊ ပင်စည်ထိုးယင်၊ ပျဉိုး၊ သရစ်၊ ထွာကောင်စိမ်း၊ ရွက်စုံစားခူဝါ၊ ပွင့်ထွေးရွက်ကပ်သီးလုံးဖောက်ပိုး စသည်တို့နှင့် ယင်ဖြူကြောင့် ဖြစ်သောအဝါရောင်မှိုစိတ်ဗိုင်းရက်စ်ရောဂါများ မကျရောက်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ (၆၀)ရက်သားအထိ (၁၅)ရက် တစ်ကြိမ် ပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို အလှည့်ကျ ပတ်ဖျန်းပါ။ သီးနှံသက်တမ်းတလျှောက်လုံး ပင်ညှိုးရောဂါ၊ ဖားဥမှိုရောဂါ၊ သံချေးရောဂါ၊ ဆာကိုစပိုးရားရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ မှည့်ပြောက်စွန်းရောဂါ၊ ဗိုင်းရပ်စ်မိုစိတ်ရောဂါ စသည်ရောဂါများ ကျရောက်တက်၍မှိုသတ်ဆေးများမှ ရောဂါများနှင့်သင့်တော်သည့် ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို (၁၅)ရက်တစ်ကြိမ် အလှည့်ကျ(၄)ကြိမ် ဖျန်းပါ။ အစေ့အဆံတည်ချိန်ဖြစ်၍ သီးလုံးဖောက်ပိုးနှင့် ထိပ်ပုပ်ရောဂါကို ဂရုပြုပါ။ပန်းပွင့်သန္ဓေအောင်ပြီး ပဲတောင့်ကလေးများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

(၆၀ရက်-၈၀ရက်)

အသီးနှင့် အစေ့အဆံတည်ချိန်ဖြစ်၍ သီးလုံးဖောက်ပိုးကို ဂရုပြုပါ။ တဖြည်းဖြည်းပဲတောင့်အတွင်း ပဲစေ့လေးများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပဲစေ့လေးများ ပြည့်တင်းကြိုးထွားချိန်ဖြစ်၍ တစ်ပင်လုံးချက်လုပ်သောအစာ၏ (၆၀)%ကို အစေ့အောင်မြင်ရန် အသုံးချရ၍ အစာအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အစာချက်နှုန်းကောင်းရန် အရွက်များ စိမ်းစိုကျန်းမာနေရန် အရေးကြီးသည်။ အာဟာရနှင့် အစိုဓာတ်မပျက်ရန် အရေးကြီးသည်။

ရိတ်သိမ်းခြင်း

(၇၅ရက်-၁၁၀ရက်)

ပဲပုပ်မျိုးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအပေါ် မူတည်၍ (၇၅-၁၁၀)ရက်အတွင်း ရင့်မှည့်လေ့ရှိကြသည်။ အရွက်များဝါခြောက်ပြီး သီးတောင့်များ ကောက်ရိုးရောင် (သို့မဟုတ်) ညိုဖျော့ရောင်ပြောင်းသွားချိန်၊ အတောင့်များ၏ (၇၅-၈၅)% အနက်ရောင်သို့ပြောင်း၍ ခြောက်သွေ့ချိန်တွင် ရိတ်သိမ်းပါ။ ရိတ်သိမ်းချိန်နောက်ကျလျှင် သီးတောင့်များ အက်ကွဲကျ၍ သီးနှံအထွက်နှုန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ရိတ်သိမ်းပြီး နှစ်နေသုံးနေလှမ်း၍ ချွေလှေ့သန့်စင်ပါ။ နေလှမ်းပြီး အစိုဓာတ်(၈-၉)% ရှိချိန်တွင် သိုလှောင်ပါ။