မြေပဲစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

မြေပဲသီးနှံတစ်ကေလျှင်ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းရရှိစေရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သည့်အောက်ဖော်ပြပါမြေပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးနည်း စနစ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

- မျိုးစေ့နှုန်းမှာတစ်ကေလျှင်မြေပဲတောင့် (၆–၈တင်း)လိုအပ်ပြီး ပင်ထောင်မြေပဲကို တန်းကြား၊ ပင်ကြား (၁၅" x ၄") နှင့် တစ်ကေ အပင်ဦးရေ တစ်သိန်းခန့်၊ ပင်ပြန့်မြေပဲ တန်းကြား၊ ပင်ကြား
- (၁၈" x ၄") နှင့် အပင်ဦးရေ တစ်ကေ (၈၅၀၀၀) ခန့်ရှိရမည်။
- တစ်ကေလျှင် နွားချေး/မြေဆွေးလှည်း(၅–၁၀) စီး နှုန်း၊ ယူရီးယား (၂၈–၅၆) ပေါင်၊ တီစူပါ(၈၄ – ၁၁၂) ပေါင်နှင့် ပိုတက်ရှ် (၂၈) ပေါင်နှုန်းကို စိုက်ထယ်ရေး ပြင်ချိန်ထည့်ပေးပါ။ လချေးမှုန့်မြေသြဇာ (၂၀၀–၂၅၀)ပေါင်နှုန်းကို မြေခံ(သို့) နောက်ဆုံးကြားလိုက်ချိန်(မြေတွင်းအစိုဓါတ်ရှိချိန်)၌ အပင်ခြေတွင်ထည့်ပေးပါ။ ပဲမြစ်ဖုဇီဝမြေသြဇာကို တစ်ကေလျှင်(၁) ထုပ်နှုန်းဖြင့် မျိုးစေ့နှင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးသင့်သည်။
- အပင်ငယ်စဉ် စုပ်စားပိုး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်ပိုးများ ကျပါကပင်လုံးပြန့်ထိတွေ့ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး ပက်ဖျန်းနှိမ်နင်းပါ။ ဖိုးလမင်းကျိုင်းနှင့် ခြများကျ ရောက်ပါကပင်လုံးပြန့် ထိတွေ့ပိုးသတ်ဆေးခဲကို စိုက်ချိန်တွင် စိုက်ကြောင်းအတွင်းထည့်ပေးပါ။
- မြစ်ပုပ်၊ ခါးရိ၊ အစေ့ပုပ်ရောဂါများမှ ကာကွယ်ရန် မျိုးစေ့ကိုမှိုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လူးနယ်စိုက် ပျိုးပါ။
ရွက်ပြောက်ရောဂါကျရောက်သောဒေသများတွင် သင့်တော်သည့်မှိုသတ်ဆေးဖြင့်ကာကွယ် နှိမ်နင်းပါ။

မြေအမျိုးအစား

- နုံးမြေနှင့်သဲမြေတို့သည် မြေပဲစိုက်ပျိုးရန်အသင့်တော်ဆုံးမြေအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်။
- မြေပဲသီးနှံဖြစ်ထွန်းရန်မြေအချဉ်ငံဓာတ်(၅.၅)ထက်နိမ့်သောမြေနှင့်ဆားပေါက်မြေများတွင်မစိုက်သင့်ပါ။ရေသွင်း/ရေထုတ်လွယ်ကူသည့်မြေဖြစ်ရမည်။

စိုက်ပျိုးချိန်

- မြေပဲသီးနှံကို မိုးဦး၌ မေနှင့်ဇွန်၊ မိုးလယ်၌ဩဂုတ် ၊ မိုးနှောင်းတွင် အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလ များတွင်စိုက်ပျိုးသင့်သည်။

မျိုးရွေးချယ်ခြင်း

- ရေမြေဒေသနှင့်ကိုက်ညီသောမျိုး၊အပင်ပေါက်(၈၀)%အထက်ရှိသောမျိုးစေ့ကိုတစ်ဧကလျှင်မျိုးစေ့(၁.၅ –၂)တင်းနှုန်းအသုံးပြုစိုက်ပျိုးပါ။
- မျိုးစေ့ဆောင်ရောဂါများကင်းစင်ပြီးရာသီဥတုဒါဏ်၊ ပိုးမွှား/ရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်သောမျိုးများကို ရွေးချယ် စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ မိုးခေါင်ဒေသများအတွက် (ဥပမာ ဆင်းပဒေသာ–၆၊ ၁၂၊ မကွေး–၁၁) မြေပဲမျိုး များကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့်သည်။

သက်တမ်းအလိုက်အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

- စိုက်ပြီး(၃၀–၃၅)ရက်အတွင်း ပေါင်းမြက်များအပြီးရှင်းပါ။ အထက်စွယ်များကို အတောင့်ဖြစ်စေရန် ပန်းဖြိုင်ချိန်မှစ၍ နောက်ပိုင်းတွင် ဘောင်တင်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ စွယ်ချချိန်နှင့် အဆံဖြည့်တင်းချိန်များဖြစ်သော အပင်သက်တမ်း (၄၅–၇၅) ရက်သား အတွင်းအစိုဓါတ်လိုအပ်ပါကရေသွင်းပေးပါ။

ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်လုပ်ငန်းများ

- မြေပဲတောင့် ၇၀%ရင့်မည့်ချိန် ရိတ်သိမ်းသင့်သည်။
- မျိုးအဖြစ်အသုံးပြုမည့် စိုက်ခင်းကိုရေသွင်း၍ နှုတ် သိမ်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။
- မြေပဲတောင့်များ အခြောက်ခံရာတွင် မြေကြီးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိစေရန်မိုးကာ၊ဖျာ၊ ကွန်ကရစ်တလင်း များပေါ်တွင် လှမ်းသင့်သည်။

- မြေပဲပင်များကိုနှုတ်ပြီး ချက်ချင်းဆွတ်ကာနေပြင်း ပြင်းတွင်ပါးပါး(၃–၄)ရက် အခြောက်ခံရန်နှင့် အစိုဓါတ်(၆–၇%) ထိရှိရန်လိုအပ်သည်။ လုံးပိန်၊ လုံးညှက်၊ ဖုံ၊ သဲ၊ ခဲများကို လူ/စက်ကိရိယာများ အသုံးပြု၍ဖယ်ရှားသန့်စင်သင့်သည်။

တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ

- မြေပဲသီးနှံမှ ထုတ်လုပ်နိုင်သော တန်ဘိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များမှာ မြေပဲဆီ၊ မြေပဲယို၊ မြေပဲလှော်၊ ပဲဖတ် စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။