# ရုံးပတီစိုက်ပျိုးနည်း

မြန်မာအမည် – ရုံးပတီ

အင်္ဂလိပ်အမည် – Okra, Lady's Fingure,

ရုက္ခဗေဒအမည် – Abelmoschusesculentus

မျိုးရင်းအမည် – Malvaceae

**ရုံးပတီမျိုးများ**

အသီးအရောင်အစိမ်းနှင့်အနီမျိုးဟူ၍ရှိပြီးအနုံ့အရသာအဟာရကွဲပြားမှုမရှိပဲအရောင်အားဖြင့်သာကွဲပြားသည်။ဟင်းချက်သည့်အခါအနီရောင်သည်အစိမ်းရောင်သီးတောင့်အဖြစ်အရောင်ပြောင်းသွားသည်။

**ရေမြေရာသီဥတု**

ပူနွေးသောရာသီဥတုကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးဆောင်းရာသီတွင်အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုမကောင်းပါ။မြေမျိုးမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်သော်လည်းရေစိမ့်ဆင်းမှုကောင်းသောမြေမျိုးဖြစ်ရမည်။မြေချဉ်ငန်ဓါတ်(၅.၈)မှ(၇.၀၀) သည်ရုံးပတီနှင့်သင့်တော်သော(Soil pH) ဖြစ်ပါသည်။

**မျိုးစေ့နှုန်းထား**

တစ်ဧကလျှင်မျိုးစေ့နှုန်း( ၆)ကီလိုဂရမ်အသုံးပြုပါ။

မြေဩဇာနှုန်းထား

နွားချေး (၁၀)တန်

ယူရီးယား (၅၀)ကီလို (၂) အိတ်

တီစူပါ (၅၀)ကီလို (၁) အိတ်

ပိုတက်ရှ် (၅၀)ကီလို (၁)အိတ်

မြေပြင်စဉ်ယူရီးယားမြေဩဇာတဝက်၊တီစူပါမြေဩဇာနှင့်ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာများကိုစိုက်ခင်းအတွင်းထည့်သွင်းပါ။စိုက်ပြီး(၃၀)ရက်သားဘောင်ထပ်ချိန်တွင်ကျန်ယူရီးယားမြေဩဇာတဝက်ကိုထည့်သွင်းပါ။မြေပြုပြင်ခြင်းမြေပြင်ချိန်တွင်နွားချေးချပြီးထယ်ထိုးထွန်မွေပေးရမည်။ငင်းနောက်စိုက်ကြောင်းဖော်ပေးပါ။

**စိုက်ပျိုးခြင်း**

နွေရာသီတွင်စိုက်ပျိုးပါကရုံးပတီမျိုးစေ့အား(၄)နာရီရေစိမ်ပေးပါ။ထို့နောက်မျိုးစေ့ကိုရေသန့်ဖြင့်ဆေး၍တစ်ကျင်းလျှင် (၃)စေ့ခန့်ချ၍တိုက်ရိုက်စိုက်ပျိုးပါ။မိုးရာသီတွင်ရေစိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ။အစေ့မှအပင်ပေါက်ရန်အတွက်စိုက်ဘောင်၏ အပူခတ်သည် အရေးကြီးပါသည်။ တန်းကြား (၃)ပေ၊ပင်ကြား(၁-၁.၅)ပေထား၍စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

**ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ခြင်း**

ရုံးပတီတွင်အဓိကကျရောက်သောပိုးမွှားရောဂါများမှာVercillium wilt, Yellow Mosaic Virus,Fusarium Wilt, ယင်ဖြူ, ပျ, သီးလုံးဖောက်ပိုး တို့ဖြစ်ပါသည်။ Virus ရောဂါကာကွယ်ရန်အတွက်ယင်ဖြူပျတို့ကိုနှိမ်နင်းပါ။ ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်လျှင် ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နည်းစနစ်(IPM)ဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းပါ။ကျရောက်ပျက်စီးမှုများပါကစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှထောက်ခံထားသည့်ဆေးများကိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအသုံးပြုပါ။ မိတ်ဖက်အပင်များ(Campan.ion-planting)စိုက်ပျိုးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါ။အကျိုးပြု အင်းဆက်များကိုစိုက်ခင်းသို့ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် (Farm- scaping) အဖြစ်အကျိုးပြု အင်းဆက်များ နှစ်သက်သော အပင်များစိုက်ပျိုးထားရှိပါ။

**ခူးဆွတ်ခြင်း**

စိုက်ပျိုးပြီး(၂)လခန့်အကြာတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်ခူးဆွတ်နိုင်ပါသည်။အဟာရဓာတ်အပြည့်ရရှိရန်အသီးတောင့် (၂-
၄)လက်မအရွယ်တွင်ခူးဆွတ်ရမည်။ရုံးပတီသီးကို(၁)ရက်ခြားခူးဆွတ်ပါ။ပထမဆုံးအသီးတောင့်ခူးဆွတ်ပြီးချိန်တွင်အောက်ခြေရှိအရွက်များအားဖယ်ရှား ပေးရမည်။

**မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း**

ရုံးပတီမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရန် တန်းကြား (၃)ပေ၊ ပင်ကြား(၁.၅)ပေ ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။တစ်ကျင်းလျှင်တစ်ပင်ထားစနစ်ကို အသုံးပြုရမည်။ မျိုးစေ့ အရည်အသွေးကောင်းရန်အတွက် ပိုတက်ဆီယမ် မြေဩဇာကိုပိုမိုထည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။မျိုးစေ့ထုတ်ရာတွင်အစေ့၊အဆံအောင်မြင်ရန်အတွက်အောက်သီးမှစသီးေ ောအောက်ခြေအတောင့်(၂)တောင့်အားခူးဆွတ်ပေးရမည်။အောက်ခြေအတောင့်နံပါတ်(၃)မှစ၍(၁၀) တောင့်အားမျိုးသီးအဖြစ်ယူပါ။ (၁၀)တောင့်အထက်မှစ၍ ထိပ်ပိုင်းဖြတ်ပေးမည်။ အသီးတောင့်အခြောက်ခူးပြီးတိုင်း သီးတောင့်နှင့်ကပ်လျက်အရွက်အား ဖယ်ရှားပေးပါ။ အသီးတောင့်များအားလုံးမကွဲအက်မီခူး ဆွတ်သင့်သည်။ မျိုးစေ့များအားသိုလှောင် မီအနည်းဆုံးအစိုဓာတ်(၈)%အထိအခြောက်ခံသင့်ပါသည်။

**ရုံးပတီသီး(၁၀၀)ဂရမ်တွင် ပါဝင်သောအာဟာရဓါတ်များ**

ကယ်လိုရီ - ၃၃ ဂရမ်

အဆီဓာတ် - ၀.၂ ဂရမ်

ဆိုဒီယမ် - ၇ မီလီဂရမ်

ပိုတက်ဆီယမ် - ၂၉၉ မီလီဂရမ်

ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် - ၇၈ ရမ်

အမျှင်ဓာတ် - ၃.၂ ဂရမ်

ပရိုတိန်း - ၁.၉ ဂရမ်

ဗီတာမင်-စီ - ၂၃ မီလီဂရမ်

ကယ်လဆီယမ် - ၈၂ မီလီဂရမ်

သံ - ၀.၆ မီလီဂရမ်

ဗီတာမင်ဘီ -၆ - ၀.၂ မီလီဂရမ်

မဂ္ဂနီစီယမ် - ၅၇ မီလီဂရမ်