ကျုံစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

ကျုံသီးနှံတစ်ဧကအထွက်နှုန်း တိုးတက်ရရှိစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သည့် အောက်ဖော်ပြပါစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

- ဆောင်းရာသီတွင် မြေတွင်းအစိုဓာတ် (သဘာဝမိုးရေ) ဖြင့် စိုက်ပျိုးသော ဧရိယာများ၌ တစ်ဧကရှိအနှံပါပင်ပွား (၇၀၀၀၀၀) ရရှိရန် တန်းကြား (၈) လက်မ၊ မျိုးစေ့လက်ဖြူးချ စိုက်ပျိုးနည်း၊ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးသောဧရိယာများတွင် တစ်ဧကရှိအနှံပါပင်ပွား (၁၀၀၀၀၀၀) ရရှိရန် တန်းကြား (၆) လက်မ၊ မျိုးစေ့လက်ဖြူးချစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရမည်။

- တစ်ဧကမျိုးစေ့နှုန်းထားအနေဖြင့် မြေတွင်းအစိုဓာတ်ဖြင့်စိုက်ပါက (၁.၅) တင်း အသုံးပြုပြီး ရေသွင်းစိုက်ပျိုးပါက (၂) တင်းအထိ အသုံးပြုရမည်။

- ကျုံမစိုက်ပျိုးမီ ရက်သတ္တပတ် (၄)ပတ်မှ (၆) ပတ်ခန့်ကတည်းက ကြိုတင်၍ သဘာဝမြေဩာ ရနိုင်သမျှထည့်သွင်းရမည်။

- အထွက်နှုန်းပိုမိုရရှိရန် ယူရီးယား (၅၆) ပေါင်၊ တီစူပါ (၁၁၂)ပေါင်၊ ပိုတက်ရှ် (၅၆) ပေါင်နှုန်းကို မြေပြင်စဉ်တွင် ထည့်ရန်လိုအပ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်ရေသွင်းချိန်၌ ယူရီးယား (၅၆) ပေါင် ထည့်သွင်းရမည်။

မြေအမျိုးအစား

- မြေဩာထက်သန်သောနုံးမြေ၊ နုံးမြေစေး၊ သဲနုံးမြေများတွင် စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။ နုံးမြေ အမျိုးအစားသည် ကျုံစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။

- မြေချဉ်ဓာတ် (၅.၅) မှ (၇.၅) အတွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး မြေချဉ်ဓာတ် (၆.၄) သည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးချိန်

- ကျုံစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးကာလမှာ အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းနှင့် နိုဝင်ဘာလ အစောပိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- မိုးရေ၏ အစိုဓာတ်ကို အမိအရစိုက်ပျိုးပါက အောက်တိုဘာ (၁၅) မှ (၃၀) ရက်အတွင်း စိုက်ပျိုး နိုင်ပါသည်။

- ရေသွင်းစိုက်ပျိုးပါက နိုဝင်ဘာ (၁) မှ (၁၅) ရက်အတွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

မျိုး

- ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဒေသရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီပြီး ဈေးကွက်ဝင်သည့်ရေဆင်း-၉၊ ရေဆင်း-၁၀၊ မက္ကဆီပက်နှင့် ရင့်ကျီ-၄၃၇ မျိုးများကို အများဆုံးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပါသည်။

- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဒေသရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီပြီး ဈေးကွက်ဝင်သည့် မုံရွာကျုံဖြူမျိုး အများဆုံးစိုက်ပျိုးပြီး ဧလုပ်ကျုံဖြူ၊ V-၁၂၈၇ မျိုးများကို အများဆုံး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပါ သည်။

- ရေသွင်းကျုံများတွင် ကျရောက်တတ်သော ကျုံသံချေးရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဇလုပ်ဖြူ-၁၊ ရေဆင်း-၉၊ ရေဆင်း-၁၀ မျိုးများ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရမည်။

သက်တမ်းအလိုက် အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးပြီး (၂၅)ရက်သားနှင့် (၄၅) ရက်သားတို့တွင် ပေါင်းမြက်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက် ကြားပေါင်းလိုက်ရမည်။

- ရေသွင်းစိုက်ဧရိယာများတွင် စိုက်ပြီး (၂၅) ရက်သားတွင် တစ်ကြိမ်၊ (၄၅) ရက်သားတွင် တစ်ကြိမ်၊ (၆၀) ရက်သားတွင် တစ်ကြိမ် ရေသွင်းပေးရမည်။

- ပထမဆုံးအကြိမ်ရေသွင်းချိန်၌ ယူရီးယား (၅၆) ပေါင်ထည့်သွင်းရမည်။

- ပင်ပွားစည်ချိန်နှင့် ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်ချိန်တို့တွင် ပင်ခြေရေမဝပ်စေပဲ ဂရုတစိုက်ရေသွင်းရမည်။

- အနှံထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျုံနန္တင်းရောဂါနှင့် ကြွက်ဖျက်ဆီးမှုရှိတတ်သဖြင့် အခင်းဝန်းကျင် တွင် သန့်ရှင်းရပါမည်။ ကြွက်ဆေးချရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်လုပ်ငန်းများ

- အနှံအားလုံး (၈၀%) ရင့်မှည့်ချိန်၊ ကျုံပင်၏ ရိုးတံနှင့် အနှံများ အဝါရောင်ပြောင်းချိန် (သို့မဟုတ်) စိုက်ပြီး (၉၀-၁၁၅) ရက်သားခန့်ရောက်လျှင် ရိတ်သိမ်းရမည်။

- တန်ဘိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ

- ကျုံသီးနှံကို ဘီစကစ်၊ ပလာတာ၊ ထပ်တစ်ရာ၊ စမူဆာ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်အမျိုးမျိုး၊ ပေါင်မုန့်၊ ပေါက်စီ၊ အသားပေါင်းအမျိုးမျိုးစသည်ဖြင့် တန်ဘိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ပါသည်။