မှိုသီးနှံ(Mushroom)

မှိုဆိုသည်မှာ

- မှိုကို(Fungus)ဟုခေါ်ကြသည်။
မည်သည့်မှိုကိုမဆို(Fungus)ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနိုင်သော်လည်းမျက်စိအားဖြင့်ကောင်းစွာမြင်နိုင်သောပုံပန်းသဏ္ဌာန်တစ်စုံတစ်ခု၊ ရိုးတံ၊ ထီးရွက် စသည့်များပါရှိသော၊
အရွယ်အစားကြီးမားသောမှိုအားလုံးကို(Mushroom)ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလေ့ရှိကြသည်။
-
စိုက်ပျိုးမှိုအမျိုးမျိုးတို့၏အဓိကထူးခြားချက်မှာသဘာဝမှိုတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရသာပေါ့သည်ဟုထင်ရသော်လည်းစားသုံးသူများအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
-
စိုက်ပျိုးမှိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုနေရာကျဉ်းကျဉ်း၌အချိန်တိုတိုအတွင်းကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းဖြင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်မိမိတို့နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းကားဂိုဒေါင်၊မီးဖိုချောင်၊ဝရန်တာစသည့်နေရာလွတ်များ၌တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြစေရန်မှိုစိုက်ပျိုးမှုနည်းပညာများ၊မှိုအမျိုးမျိုးတို့၏မှိုစိုက်ထုပ်များအားစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ကော်ဖီ-ရာသီသီးနှံဌာနခွဲအောက်ရှိမှိုခြံများမှဖြန့်ဝေပေးလျှက်ရှိပါသည်။



ကမ္ဘာပေါ်တွင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနေသောမှိုမျိုးများ

- ကောက်ရိုးမှို
- ငွေနားမှို
- ငွေနှင်းမှို
- နာမီကို
- လင်ဇီးမှို
- ရှီတာကီမှို
- မျောက်ခေါင်းမှို
- ကြွက်နားရွက်မှို
- ကြယ်သီးမှို

စသည်တို့အားစိုက်ပျိုးရောင်းချလျှက်ရှိသကဲ့သို့စားသောက်မှုပုံစံသစ်အရအခြားမှိုမျိုးများလည်းပြည်ပနိုင်ငံများမှပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရောင်းလာမှုများရှိလာပါသည်။



မှိုသုတေသနနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးခြံ(၅)ခြံ၏စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု

ရန်ကုန်(၉)မိုင်မှိုခြံတွင်စိုက်ပျိုးသောမှိုအမျိုးအစားများ

- ငွေနှင်းမှို

- ကြက်နားရွက်မှို
- နို့စိမ်းမှို(Milky)
- ကောက်ရိုးမှို
- လင်ဇီးမှို

မော်ဘီညောင်နှစ်ပင်မှိုခြံတွင်စိုက်ပျိုးသောမှိုအမျိုးအစားများ

- ငွေနှင်းမှို
- ကြက်နားရွက်မှို
- နို့စိမ်းမှို(Milky)
- ကောက်ရိုးမှို
- လင်ဇီးမှို

ပဲခူး(၁၀)မိုင်မှိုခြံတွင်စိုက်ပျိုးသောမှိုအမျိုးအစားများ

- ငွေနှင်းမှို
- ကြက်နားရွက်မှို
- နို့စိမ်းမှို(Milky)
- ကောက်ရိုးမှို
- လင်ဇီးမှို


တောင်ငူကျောက်တိုင်မှိုခြံတွင်စိုက်ပျိုးသောမှိုအမျိုးအစားများ

- ငွေနှင်းမှို
- ကြက်နားရွက်မှို
- နို့စိမ်းမှို(Milky)
- ကောက်ရိုးမှို
- လင်ဇီးမှို

ပြင်ဦးလွင်ဒိုးကွင်မှိုခြံတွင်စိုက်ပျိုးသောမှိုအမျိုးအစားများ

- ငွေနှင်းမှို
- ကြက်နားရွက်မှို

- ရှိတာကီမှို
- မျောက်ခေါင်းမှို
- ပဲပင်ပေါက်မှို(ရွှေအပ်မှို/အီနိုကီတာကီမှို)
- ကြယ်သီးမှို





မှိုမွေးမြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များ

မှိုမျိုးသန့်မွေးမြူခြင်း

- မှိုအသားမျှင်မှမွေးမြူခြင်း
- မှိုမျိုးစေ့မှ မွေးမြူခြင်း

မှိုမျိုးစေ့/ပွားစာ(Spawn)ပြုလုပ်ခြင်း

- သီးနှံမှိုမျိုးစေ့ပြုလုပ်နည်း (Grain Spawn)
- နှပ်စာမှိုမျိုးစေ့ပြုလုပ်နည်း (Compost Spawn)

– တိုက်ရိုက်မှို ပြုလုပ်နည်း (Direct Spawn)

မှိုစိုက်ထုပ်ပြုလုပ်ခြင်း

ကုန်ကြမ်း

–

သစ်ပွလွှစာ၊ကောက်ရိုးရိုးပြတ်၊ပြောင်းရိုး၊ဝါအလေအလွင့်၊လဲမှို့အူတိုင်၊ဗေဒါခြောက်၊ပဲမျိုးစုံရွက်ခြောက်၊ပဲမှော်၊ပဲရိုး(အပင်၏အမျှင်ဓါတ်ရှိအပင်အစိတ်
အပိုင်းအားလုံး)အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ရောစပ်စာအချိုး

– အထုပ်ပြုလုပ်စိုက်ပျိုးသောမှိုများအတွက် သစ်ပွလွှစာ ၁၀၀ %၊ ဆန်ဖွဲနု ၅– ၇ %၊ ပြောင်းဖွဲ ၃ %၊ ပဲဖွဲ ၂ %၊ သကြား/ဂလူးကို့စ် ၁ %၊ ဆားခါး ၀.၂ %၊ မဖောက်ထုံး ၁ %၊ ရေ ၆၅ %
ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။
– ကောက်ရိုးမှိုအတွက် နှပ်စာ ၁၀၀ %၊ ဆန်ဖွဲနု ၅ %၊ ပြောင်းဖွဲ ၃ %၊ သကြား/ ဂလူးကို့စ် ၁ %၊ ဆားခါး ၀.၂ %၊ မဖောက်ထုံး ၁ %၊ ရေ ၆၅ % ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

မှိုမျိုးသွင်းခြင်း

– စိုက်ထုပ်များအတွင်းသို့ မှိုမျိုးများ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။

မှိုမျှင်ရင့်ကျက်စေခြင်း

– မှိုမျိုးထည့်ပြီးနောက်တွင် မှိုစိုက်ထုပ်များ မှိုမျှင်ပြည့်၍မျိုးရင့်စေခြင်းဖြစ်သည်။
မှိုရင့်ကျက်ခန်းပြုလုပ်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မျိုးသွင်းပြီးစိုက်ထုပ်များ ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း မှိုမျှင်စ၍ဖွာလာပြီး မျိုးပေါ်မူတည်ကာရင့်ကျက်ခန်းတွင် ထားရမည့်ရက်ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
– ငွေနှင်းမှိုသည် ၂၅-၃၀ ရက်၊ ကြွက်နားရွက်/လင်ဇီးမှိုသည် ၄၀-၄၅ ရက်၊ ရှီတာကီမှိုသည် ၃
လ ခန့်နှင့် ကောက်ရိုးမှိုသည် ၁၀-၁၂ ရက်ခန့်ကြာနိုင်ပါသည်။

မှိုစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းလမ်းများ

– အထုပ်ပြုလုပ်စိုက်ပျိုးခြင်း(ငွေမိုး/နှင်း၊ ကြွက်နားရွက်၊နို့စိမ်းမှို၊လင်ဇီး၊ထပ်တစ်ရာမှို၊ ရှီတာကီ၊မျောက်ခေါင်း၊ရွှေအပ်မှို)
– အပုံပြုလုပ်စိုက်ပျိုးခြင်း (ကောက်ရိုး၊ ကြယ်သီးမှို)
– သစ်တုံးဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်း (ငွေနှင်း၊ ကြွက်နားရွက်၊ ရှီတာကီ၊ လင်ဇီး၊ ထပ်တစ်ရာမှို)

မှိုဆွတ်ခူးခြင်း

–

ငွေနှင်းမှိုအားဆွတ်ခူးမည်ဆိုပါကအနားသားပါး၍ပြန့်ကားနေသောအခြေအနေတွင်ဆွတ်ခူးပါ။

–

ကြွက်နားရွက်မှိုအားဆွတ်ခူးမည်ဆိုပါကအနားသားများတွန့်ခြောက်နေသောအခြေအနေတွင်ဆွတ်ခူးပါ။

မှိုစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းလမ်းများ

– အထုပ်ပြုလုပ်စိုက်ပျိုးခြင်း (ငွေမိုး/နှင်း၊ ကြွက်နားရွက်၊ နို့စိမ်းမှို၊ လင်ဇီး၊ထပ်တစ်ရာမှို၊ ရှီတာကီ၊မျောက်ခေါင်း၊ရွှေအပ်မှို)

– အပုံပြုလုပ်စိုက်ပျိုးခြင်း (ကောက်ရိုး၊ ကြယ်သီးမှို)

– သစ်တုံးဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်း (ငွေနှင်း၊ ကြွက်နားရွက်၊ ရှီတာကီ၊ လင်ဇီး၊ ထပ်တစ်ရာမှို)

အထုပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက်မှိုစိုက်တဲဆောက်ရန်လိုအပ်

မှိုစိုက်တဲ

– နမူနာအနေဖြင့် အလျား ၁၈ ပေ၊ အနံ ၁၂ ပေ၊ အမြင့် ၁၀ ပေ၊ ခေါင် ၃ ပေ ရှိသော အဆောက်အဦးတစ်ခုတွင် အထုပ်ထားပုံပေါ်မူတည်၍ ၂၀၀၀–၃၀၀၀ အထိ ထားနိုင်သည်။
– စိုက်ခန်းအနေအထား – အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်သောအခင်းရှိရမည်။
– လေဝင်လေထွက်ကောင်းရန် မြင့်မိုရ်မှာ ၁ ပေခွဲ – ၂ ပေ အပေါက်ဖောက်၍ဖြစ်စေ၊ အမိုးနှင့်

နံရံ အကြား ၅-၆ လက်မခန့် လွှတ်ထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဖန်တီးနိုင်
- အလင်းရောင် အနည်းငယ်ဝင်နိုင်ရန် ဖန်တီးထားရမည်။
- စင်များကို သံ၊ သစ်၊ ဝါး ကြိုက်နှစ်သက်ရာသုံးနိုင်သည်။
- ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်ရန်သာ ဖန်တီးထားရမည်။

မှိုထုပ်များလောင်းရန်ရေ

- အချဉ် အငန် သမရန်လို
- မည်စပတ်သောရေ၊ လူသောက်သုံးနိုင်သောရေ ဖြစ်ရမည်။
- အကောင်းဆုံးမှာ မိုးရေ (နိုက်ထရိုဂျင်များ)

အထုပ်ဖေါက်နည်း(၃)နည်း

၁။ ကော်လံမှဖွင့်ဖေါက်နည်း
၂။ ထိပ်မျက်နှာစာမှဖွင့်ဖေါက်နည်း
၃။ ဘေးမျက်နှာစာမှဖွင့်ဖေါက်နည်း

(၁)ကော်လံမှဖွင့်ဖေါက်နည်း



ငွေနှင်းမှို
လင်ဇီးမှို
မျောက်ခေါင်းမှို
ရွှေအပ်မှို

(၂) ထိပ်မျက်နှာစာမှ ဖွင့်ဖေါက်နည်း



ငွေနှင်းမှို
နှံ့စိမ်းမှို
ရှီတာကီမှို

(၃) ဘေးမျက်နှာစာမှ ဖွင့်ဖေါက်နည်း



ငွေနှင်းမှို
ကြွက်နားရွက်မှို

အထုပ်ထားနည်း(၃)နည်း

၁။ ထောင်ထားနည်း
၂။ လဲထားနည်း
၃။ ချိတ်ဆွဲထားနည်း

၁။ထောင်ထားနည်း





လင်ဇီးမှို၊ နှံ့စိမ်းမှို၊ ရှီတာကီမှို၊ မျောက်ခေါင်းမှို၊ ရွှေအပ်မှို

၂။ လဲ့ထားနည်း





ငွေနှင်းမှို၊ လင်ဇီးမှို၊ မျောက်ခေါင်းမှို

၃။ချိတ်ဆွဲထားနည်း



ငွေနှင်းမှို



ကြွက်နားရွက်မှို

ငွေနှင်းမှိုစိုက်ပျိုးနည်း

မှိုထုပ်များကိုလေဝင်လေထွက်ရှိ၍တိုက်ရိုက်နေမပူသောနေရာတွင်ထားပါ။အပူချိန်(၂၅-၂၈)°Cနှင့်စိုထိုင်းဆ(၈၀)%ရှိရမည်။

ကော်လံမှဖွင့်ဖောက်နည်း

-

ကော်လံနှင့်ဂွမ်းမဖြုတ်ပဲထား၍လည်းကောင်း၊ကော်လံအောက်ခြေတစ်ဝိုက်ဓားဖြင့်ဖြတ်၍လည်းကောင်းစင်ပေါ်တွင်လဲ ၍စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

မှိုစိုက်ထုပ်မျက်နှာစာမှဖွင့်ဖောက်နည်း

- ကော်လံကိုဖြုတ်၍ အိတ်နူတ်ခမ်းကို အပြင်သို့လှန်၍လည်းကောင်း၊ မျက်နှာစာပတ်လည်ဓားဖြင့်ဖြတ်၍လည်းကောင်း၊ စင်ပေါ်တွင်လဲ၍ နှစ်ဆင့်ထပ်စိုက်နိုင်သည်။

- မှိုထုပ်ဘေးမျက်နှာပြင်ကိုဓားသန့်သန့်ဖြင့်စောင်းလျှက်လှီးဖြတ်ပြီးလျှင်(၁"-၁"ခွဲ)အရွယ်ဓားချက်(၈-၁၀)ချက်ခန့်ခွဲပေးရမည်။ ဝါးစင်၊ သစ်သားစင်၊ သံစင်များပေါ်တွင်အထုပ်များကိုထောင်၍(သို့)လဲ၍ထားနိုင်ပါသည်။

-

နေ့စဉ်ရေလောင်းပေးရမည်။ရေမှုန်ရေမွှားအနေဖြင့်လောင်းလျှင်သင့်လျော်သည်။ရေလောင်းလျှင်အထုပ်များအတွင်းရေမဝပ်စေရန်ဂရုပြုရမည်။ရေဝပ်ပါကမှိုပွင့်များပုတ်ရိသွားနိုင်သည်။

- မှိုထုပ်များစိုက်ခန်းအတွင်းသို့ထည့်သွင်းပြီး(၃-၇)ရက်အတွင်းမှိုအပွင့်ငယ်လေးများစတင်ထွက်လာမည်။မှိုပွင့်ထွက်ပြီး (၄-၅)ရက်အတွင်းမှိုပွင့်အနေအထားအားဖြင့်ဘေးအနားသားမကွဲမီဆွတ်ခူးရမည်။

- မှိုပွင့်များအောက်ခြေမှလက်ဖြင့်ညင်သာစွာနှုတ်ယူရပါမည်။ချိုးဖဲ့ဖြတ်တောက်၍မယူရပါ။

-

မှိုပွင့်များခူးယူပြီးသောအခါမှိုထုပ်၏အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကိုလက်မဝက်ခန့်သန့်စင်သောဓါးြြင့်လှီးပေးရမည်။

- လှီးဖြတ်ပြီးသောမှိုထုပ်ကို(၄-
၅)ရက်ခန့်ရေမလောင်းဘဲထားရမည်။ထိုရက်အတွင်းအထုပ်မျက်နှာပြင်တွင်မှိုမျှင်များ
ပြန်လည်ဖွေးဖြူလာသောအချိန်တွင်ရေဖြန်းပေးပါကဒုတိယအကြိမ်မှိုပြန်လည်ထွက်လာသ
ည်။

- ဤနည်းအတိုင်းမှိုထုပ်၏အောက်ခြေတစ်ဝက်ကျန်သည်အထိ(၃-
၅)ကြိမ်စိုက်ပျိုးဆွတ်ခူးရယူနိုင်သည်။

-
မှိုထွက်အားပိုမိုကောင်းစေရန်ပုလဲဓါတ်မြေဩာ(၆)ကျပ်သားနှင့်တီစူပါဓါတ်မြေဩာ(၃)က
ျပ်သားကိုရေ(၂)ဂါလန်ခွဲတွင် ဖျော်စပ်၍(၂)ရက်ခြားတစ်ကြိမ်ပက်ဖျန်းပေးရပါမည်။



ငွေနှင်းမှိုစိုက်ပျိုးရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာများ

(၁)မှိုမျှင်ပြည့်သော်လည်း အပွင့်ပွင့်ရန်ကြာခြင်း


- ရာသီနှင့်မကိုက်ညီသောမျိုးကွဲ (Strain)ကို သုံးမိခြင်း
- အာဟာရပြင် သားဆက်များခြင်း
- အာဟာရခတ် မလုံလောက်ခြင်း
- ခွဲကြောင်း တိမ်လွန်းခြင်း
- ရာသီဥတု ပူလွန်းအေးလွန်းခြင်း

(၂) မှိုပွင့်ထွက်သော်လည်း ဆက်လက်မကြီးထွားခြင်း
- မျိုးညှံ့ခြင်း၊ အထုပ်ဖောက်ကျယ်လွန်းခြင်း၊ အကြိမ်များများခူးခြင်း၊ အပူချိန်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်း

(၃) မှိုပွင့်များ ပွင့်ချိန်မတိုင်မီ ပုပ်ရိ/ ခြောက်သွေ့ခြင်း
- ရေလောင်းများလွန်း၊ နည်းလွန်းခြင်း
- မှိုသန္ဓေခဲ ထိခိုက်ခြင်း
- ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ခြင်း

(၄) အပွင့်နည်းလွန်းခြင်း
- ကုန်ကြမ်းများ အာဟာရ မလုံလောက်ခြင်း
- ပိုးမွှားရောဂါ ဝင်ရောက်ခြင်း

(၅) အပွင့်များပုံသဏ္ဌာန်မမှန်ခြင်း
- မှိုတဲအတွင်းလေဝင်လေထွက်မလုံလောက်ခြင်း၊ CO2 များလွန်းခြင်း



ငွေနှင်းမှို

ငွေနှင်းမှိုကို GAP စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ –

–

စိုက်ခန်းအတွင်းလိုအပ်သောအပူချိန်၊စိုထိုင်းဆ၊လေဝင်လေထွက်၊အလင်းရောင်မျှတကောင်းမွန်စွာထားရှိရန်

–

အထွက်ကောင်းမျိုး၊ရာသီနှင့်ကိုက်ညီသောမျိုး၊ဈေးကွက်မှလက်ခံနိုင်သောမျိုးကိုအသုံးပြုရန်

– စိုက်ထုပ်အတွင်းသတ်မှတ်ထားသောအာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝနေစေရန်

–

မှိုထုပ်များပေါင်းတင်ပိုးသတ်ရာတွင်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်သို့မှသာရောဂါကျရောက်မှုနည်းပြီးအောင်မြင်သောစိုက်ထုပ်ကောင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။

- မှိုသည် အာဟာရ/အနှံ့စုပ်ယူမှုအားကောင်းသော
သီးနှံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမှိုစိုက်ခန်းအတွင်း(ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတ်ဆီ၊
ချောဆီ)စသောအနှံ့ဆိုးများကိုရှောင်ရှားရန်
-
ပိုးသတ်ဆေးအနေဖြင့်ဓာတုပိုးသတ်ဆေးအစားဆေးရွက်ကြီးမှိုင်းတိုက်ခြင်း၊ဆေးရွက်ကြီးပြု
တ်ရည်အခိုးအငွေ့လွှတ်ခြင်း၊တမာပိုးသတ်ဆေးစသည်တို့ကိုသုံးခြင်း၊ပိုးမွှားကျရောက်သော
စိုက်ထုပ်များအားလေလုံပိတ်၍02
ဖြတ်သောနည်းသုံးခြင်း၊ထုံးရည်စိမ်ခြင်း၊ရောဂါကျရောက်မှုအားထုံးဖြူး၍နှိမ်နင်းခြင်းစသည်
တို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်
-
ဤသို့အားဖြင့်အာဟာရကြွယ်ဝ၍သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောမှိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ပြည်
သူတို့၏အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးကိုမှိုကဏ္ဍဖြင့်အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကောက်ရိုးမှို

ပုံစံခွက်ဖြင့် ကောက်ရိုးမှိုစိုက်ပျိုးခြင်းစနစ်
နေရာဒေသမရွေး တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတွက် အထွက်ကောင်းမွန်တည်ငြိမ်သော
မှိုစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ဖြစ်သည်။

ကုန်ကြမ်း
-ကောက်ရိုး၊ ရိုးပြတ်၊ စပါးနှုတ်ပင်(လုံးဝခြောက်သွေ့ရမည်၊ နှစ်ချို့မဖြစ်စေရ)

ဖြည့်စွက်စာ
- ဗေဒါ၊ ငှက်ပျောရွက်/ပင်စည်၊ ပဲပင်အမျိုးမျိုး၊ နေကြာ၊ လဲမှိုအူတိုင်၊ ဝါအလေအလွင့် (၂)
ပြည်
- မြင်းချေး၊ နွားချေး၊ ကျွဲချေး(၁) ပြည်
- ဖွဲနု(၃) ဗူး(နို့ဆီဗူး)(ဖြည့်စွက်စာအားလုံး လုံးဝခြောက်သွေ့ရမည်)

ရေ

ရေကောင်းရေသန့်ဖြစ်ရမည်။အချဉ်-အငံဓာတ်(pH 6.5 - 7.8)ဖြစ်ရမည်။ပင်လယ်ဒီရေ၊ဓာတ်သတ္တုပျော်ဝင်မှုလွန်ကဲသောရေ၊စက်မှုစွန့်ပစ်ရေများလုံးဝမဖြစ်စေရ။

မြေ

မြေမျက်နှာပြင်ညီရမည်။ဆား/ဆပ်ပြာ/စိမ့်ပေါက်သောမြေ၊လောင်စာဆီ၊ပိုး/ပေါင်း/မှိုသတ်ဆေးသိုလှောင်ရာနေရာဟောင်းနှင့်"ခြ"မြေမဖြစ်စေရ။

မျိုး

-မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ဖြစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

-နုလွန်းရင့်လွန်းခြင်း၊ ပိုးမွှားရောဂါ မကင်းစင်ခြင်း၊ မှိုမျှင် အားနည်းခြင်း မဖြစ်စေရပါ။

-

မျိုးသွင်းပြီးနွေ(၁၀)ရက်၊မိုး(၁၂)ရက်၊ဆောင်း(၁၄)ရက်မှစ၍စိုက်ပျိုးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး(၂၁)ရက်ကျော်လျှင်မျိုးသက်တမ်းရင့်၍မစိုက်ပျိုးသင့်ပေ။

-အထွက်နှုန်းကောင်းခြင်းနှင့် အောင်မြင်မှုတို့၏ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းမှာ မျိုး၏အရည်အသွေးပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ပုံစံခွက်

-စနစ်ကျ၍ရာသီမရွေးအထွက်နှုန်းတည်ငြိမ်သောပုံစံခွက်အတိုင်းအတာမှာ - အလျား (၄-၃)ပေ၊ -အောက်ခြေအနံ (၁)ပေခွဲ၊ အပေါ်နံရံ (၁)ပေ၊ အမြင့် (၁)ပေခွဲ၊ နှစ်ဖက်ဖွင့်ဇလားဖြစ်သည်။

ဇလားပုံစံခွက် - အလျား ၃-၄ ပေ၊ အောက်ခြေအနံ ၁ ပေခွဲ၊ အပေါ်ဖက်အနံ၁ ပေ၊ အမြင့် ၁ ပေခွဲ

ပထမအဆင့်

- ရိုးပြတ်များရေစိမ်ခြင်း(နွေ ၆နာရီ၊မိုး ၁နာရီ၊ ဆောင်း ၃နာရီ)လွှာ ဖြန့်ခင်းထား
- ဇလာခွက်အတွင်းဖြန့်ခင်း၊ ဖိသိပ်ပြီး အထူ ၃ လက်မ

- ရိုးပြတ်ပတ်ပတ်လည်တွင် ဖြည့်စွက်စာဖြည့်ထား(အကျယ် ၃ လက်မ ပတ်လည်၊ အထူ ၀.၅ လက်မ)
- ဖြည့်စွက်စာပေါ်တွင် မှိုမျိုးဖြူးထား(ဖြည့်စွက်စာအလယ်ကြောင်းအတိုင်း ပါးပါးညီညီဖြူးမည်)
- အထက်ပါအတိုင်း ၅-၆ လွှာစိုက်ပြီး၊ အပေါ်ဆုံးမှ ရေစိုကောက်ရိုး ခပ်ပါးပါးအုပ်ပြီးလျှင် ဇလားခွက်ကို မ,ချွတ်ပါ။
- စိုက်ပုံကို(၁)ပုံတည်းစိုက်၍လိုအပ်သောအပူချိန်မရရှိနိုင်၊နွေ(၅)ပုံ၊မိုး(၇)ပုံနှင့်ဆောင်း(၁၀)ပုံထိထား၍စိုက်ပျိုးသင့်သည်။
- နွေရာသီတွင် တစ်ပုံနှင့်တစ်ပုံအကြား အောက်ခြေအကွာအဝေး (၁၀)လက်မ
- မိုးရာသီတွင် တစ်ပုံနှင့်တစ်ပုံအကြား အောက်ခြေအကွာအဝေး (၈)လက်မ
- ဆောင်းရာသီတွင် တစ်ပုံနှင့်တစ်ပုံအကြား အောက်ခြေအကွာအဝေး (၆)လက်မ ခန့် ခွာ၍ စိုက်ပျိုးသင့်သည်။

စိုက်ပုံတန်းများကိုအတန်းလိုက်ပလတ်စတစ်(အကြည်စ)ဖြင့် အိမ်အမိုး (သို့) ပေါင်းမိုးခုံးသဏ္ဌာန် လုံခြုံစွာအုပ်ထားရမည်။
- စိုက်ပျိုးသောနေရာသည် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် ကျရောက်ခြင်းနှင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းရှိပါက ပလတ်စတစ်ပေါ်မှ နေကာလေကာပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပြီးဗူးစင်၊တဲ၊ ဂိုဒေါင်၊ အိမ်အောက်၊သစ်ရိပ်တို့တွင်စိုက်ပျိုးပါကနေကာလေကာပြုလုပ်ပေးရန်မလိုပါ။

ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း

ရာသီဥတု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကိုလိုက်၍ လိုအပ်သော အခြေအနေကောင်းများ ရရှိရန်ဇယားအစီအစဉ်အတိုင်း မှိုစိုက်ပုံများကို စနစ်တကျ ပြုစုထိန်းသိမ်းပေးပါ။ (မှိုစိုက်ပျိုးရေးတွင် ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အရေးပါဆုံး အခန်းကဏ္ဍဖြစ်၍အထူးဂရုစိုက်သင့်သည်။)

အပူချိန်

သတ်မှတ်ကာများတွင် လိုအပ်သော အပူချိန်များ ရရှိရန် လိုအပ်သည်။
အပူချိန်မြင့်လွန်းခြင်း/နိမ့်လွန်းခြင်းများ မဖြစ်စေရ။

(အပူချိန်မြင့်ရာမှ နိမ့်စေလိုလျှင်) ...
- အောက်ခြေမြေပြင်ကို ရေဖြန်းခြင်း
- စိုက်ပုံများအကြား ရေစိုက်ကောက်ရိုးထည့်ခြင်း
- ပလတ်စတစ်ပေါ်မှ ရေစိုကောက်ရိုးဖြန့်တင်ခြင်း
- ပလတ်စတစ်ပေါ်မှ ရေဖြန်းခြင်း
- စိုက်ပုံများနိမ့်၍ စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(အပူချိန်နိမ့်ရာမှ မြင့်စေလိုလျှင်) ...
- ပလတ်စတစ်ခင်း၍ စိုက်ပျိုးခြင်း
- ဖြည့်စွက်စာ တပြင်လုံး ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း
- စိုက်ပုံများကြား ရေနွေးငွေ့လွှတ်ခြင်း
- လုံခြုံသောအခန်းတွင် မီးဖို၍ စိုက်ပျိုးခြင်း
- စိုက်ပုံများကိုကောက်ရိုးဖုံးအုပ်မီးရှို့ခြင်း(၄-ရက်အတွင်း)ပြုလုပ်နိုင်သည်။

စိုထိုင်းဆ
- စိုက်ပုံများခြောက်သွေ့ပါကရေအနည်းငယ်
ဖြန်းပေးရမည်။စိုက်ပုံအပေါ်ဘက်ဇောင်းပတ်လည်တစ်လျှောက်ရေဖြန်းပေးပါ။မို့သန္ဓေခဲစတ
င်ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင်စိုက်ပုံတွင်ရေမဖြန်းရ၊လိုအပ်ပါကအောက်ခြေကိုသာရေဖြန်းရမည်။

လေဝင်လေထွက်
- တစ်ဖက်ပါဇယားအတိုင်း လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပါ။

အလင်းရောင်
- မို့မျှင်ပွားများချိန်ကာလအတွင်း အမှောင်များရသည်။
- မို့မျှင်ပျောက်ကွယ်ချိန်တွင်အလင်းရောင်လိုအပ်သည်။
- မို့သန္ဓေခဲဖြစ်ပေါ်ချိန်မှမို့ဆွတ်ခူးချိန်အထိအလင်းအမှောင်မျှတရမည်။

အာဟာရဖျော်ရည် ပြုလုပ်အသုံးပြုနည်း

- ပုလဲ(၆)ကျပ်သား
- တီစူပါ(၃)ကျပ်သား

ရေ

(၃)ဂါလန်တွင်ဖျော်၍ဆေးဖြန်းကိရိယာဖြင့်စိုက်ပုံ(၃၀)ခန့်ကိုသတ်မှတ်ကာလများတွင်ပေးနိုင်သည်။

ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းအစီအစဉ် မိုးမျှင်ကြီးထွားမှုအဆင့်ဆင့်နှင့် လိုအပ်သောအခြေအနေများ

စဉ်	ကာလ	မိုးမျှင်ကြီးထွားမှုအဆင့်ဆင့်	လိုအပ်သောအခြေအနေ				
			အပူချိန်	စိုထိုင်းဆ	လေဝင်လေထွက်	အလင်းရောင်	အာဟာရ
၁	စိုက်ပြီး - ၁ ရက် - ၂ ရက် - ၃ ရက် - ၄ ရက်	အဆင့်(၁).. အဖြူရောင် (ကြည်လင်) ပင့်ကူမျှင် ကဲ့သို့ ကြီးထွားပွားများ လာမည်။	34°- 36°C	70%	ပလတ်စတစ် လုံး၀ အုပ်ထားရမည်။ (မှိုပုံများအတွက် ပူအိုက်စိုထိုင်းနေစေရန်)	အမှောင် များရမည်။	မလို
၂	စိုက်ပြီး - ၅ ရက် - ၆ ရက် - ၇ ရက်	အဆင့်(၂).. မိုးမျှင်များ ပွားလာပြီးနောက် နဂို အရွယ်ထက် သေးငယ် လာပြီး အဖြူမှ အ၀ါ ဖျော့ရောင် ပြောင်းလာ သည်။ မိုးမျှင်ပျောက် ကွယ်သည်ဟု ထင်ရ မည်။ မိုးမျှင်များ ပေါင်း စပ်၍ မိုးသနွေခဲ စတည် သည်။	32° - 34°C	75%	တစ်နေ့ (၂)ကြိမ် ပလတ် စတစ် လှပ်ပေးရမည်။ (၁ ကြိမ် ၂၀/၃၀ မိနစ်ခန့်) (၇)ရက် မိုးသနွေခဲတည်စေ ရန် လုံး၀ အုပ်ထားရမည်။	အမှောင်များ ရာမှ တဖြည်း ဖြည်း အလင်း ရောင် လိုအပ် လာသည်။	၅/၆ ရက်မြောက်နေ့ တွင် အာဟာရ (၁) ကြိမ် ပေးနိုင်သည်။

ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းအစီအစဉ် မှိုမျှင်ကြီးထွားမှုအဆင့်ဆင့်နှင့် လိုအပ်သောအခြေအနေများ

စဉ်	ကာလ	မှိုမျှင်ကြီးထွားမှု အဆင့်ဆင့်	လိုအပ်သောအခြေအနေ				
			အပူချိန်	စိုထိုင်းဆ	လေဝင်လေထွက်	အလင်းရောင်	အာဟာရ
၃	စိုက်ပြီး - ၈ ရက် - ၉ ရက် - ၁၀ ရက် (မှိုခူးသည် အထိ)	အဆင့်(၃).. မှိုသန္ဓေခဲ (အဖြူစက်ကလေးများ) မှ မှိုဥငယ်ကလေးများ ဖြစ်လာမည်။ မှိုဥဘဝမှ ဆွတ်ခူးရချိန် အရွယ် အထိ ကြီးထွားလာမည်။ ပထမအကြိမ် မှို (၃-၄) ရက် ဆက်တိုက်ခူးရ မည်။ ဒုတိယအကြိမ် (၅)ရက်ခန့် ခြားပြီး ထပ်မံရရှိမည်။ တတိယ အကြိမ် (၅)ရက်ခန့်ခြား ပြီး အနည်းငယ် ရရှိ မည်။	38° - 30°C	80 - 85%	(၈)ရက်မှစ၍ တစ်နေ့ (၃)ကြိမ်ခန့် လုပ်ပေးရ မည်။ (မှိုခူးနေစဉ် ကာလ အတွင်းထိ)	အလင်း အမှောင် မျှတ စေမည်။	(၉)ရက် မှိုဥငယ် ပြောင်းဖူးစေ့ခန့်တွင် အာဟာရ (၁)ကြိမ်၊ မှိုဥ ကွမ်းသီးလုံးငယ် ခန့်တွင် (၁)ကြိမ် အာဟာရလိုက်ပေး နိုင်သည်။

ကောက်ရိုးမှို စိုက်ပျိုးနေပုံများ







ကောက်ရိုးမှို (ပုံစံခွက်နှင့်စိုက်ပျိုးနည်း)

ကျင်းဖြင့်စိုက်ပျိုးနည်း

ဂျပ်စက္ကူနှင့် နွားချေး (သို့မဟုတ်) ဗေဒါအသုံးပြုပြီး ကောက်ရိုးမှို ကျင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်း အလျား (၁၂-ပေ)၊ အနံ(၃-ပေ) ၊အနက်(၆)လက်မ အပုံကြီးစိုက်ပျိုးနည်း

လိုအပ်သောပစ္စည်းများ

- ဂျပ်စက္ကူ (၁၀)ပိသာ
- မှိုမျိုး (၅)ထုပ်
- မှိုအားဆေး (၄)ထုပ်
- ခြပေါသောနေရာများအတွက် ခြဆေး (၂)ဇွန်
- ပလတ်စတစ် (၈)ကိုက် (ပလတ်စတစ် အနံ ၈-ပေ)
- နွားချေး ၁၀-၁၃တင်းခန့် (နွားချေးအစား ဗေဒါ သုံးနိုင်ပါသည်။ဗေဒါအစိုရော

အခြောက်ပါသုံးနိုင်သည်။အခြောက်သုံးပါက ၅-မိနစ်ခန့်ရေစိမ်သုံးပါ။) (ဆောင်းရာသီတွင် ကြက်ချေး/ငုံးချေးကိုအောက်ဆုံးမှ ၁၂ပြည်မှ တစ်တင်းခန့် မဖြစ်မနေ ထည့်ရပါမည်။)

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

-မှိုစိုက်ပျိုးမည့်နေရာကို အလျား (၁၂)ပေ၊ အနံ (၃)ပေ နေရာသတ်မှတ်ပါ။ သတ်မှတ်နေရာတွင် ဖြလက်မခန့် မြေကျင်းပတ်တူးပါ။

-တူး၍ရသော မြေခဲများကို ကျင်းနှုတ်ခမ်းသား၌ ကန်သင်းဘောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။

-စိုက်ကာနီး၌ဂျပ်စက္ကူများကို(၃၀)မိနစ်မှတစ်နာရီကြာအောင် ရေစိမ်ပါ။ရေမနူးလွယ်သောဂျပ်စက္ကူများကိုတစ်ညအိပ်ထိ ရေစိမ်နိုင်သည်။

-ရေစိမ်ပြီးသောဂျပ်စက္ကူများကို လက်ဝါးအရွယ်၊ ၎င်းထက်သေးသောအရွယ်ဖြစ်အောင်ဆုတ်ဖြဲထားပါ။

-မှိုမျိုးကိုအခဲမကျန်အောင်ခြေမွထားပါ။(ဗေဒါနှင့်စိုက်ပါကဗေဒါအစို/ အခြောက်ကိုတစ်ထွာတစ်မိုက်စင်းထားပါ။)

စိုက်ပျိုးခြင်း

-ခြပေါသောနေရာ၌ ပြင်ဆင်ထားသောကျင်းအတွင်း ခြသတ်ဆေးဟင်းစားဇွန်း (၂)ဇွန်းခန့်နေရာအနှံ့ပါးပါးဖြူးပါ။၎င်းအပေါ်မှနွားချေး (၇-၁၀)တင်းခန့်ကိုနေရာအနှံ့ဖြန့်ခင်းပါ။

-ကျင်းနှုတ်ခမ်းမှ တစ်ထွာတစ်မိုက်ခန့်ခွာပြီး (ရေစိမ်ဆုတ်ဖြဲထားသော) ဂျပ်စက္ကူ များကို နေရာအနှံ့ ခင်းပါ။


-ခြေမွပြီးသောမှိုမျိုး (၅)ထုပ်ကို ဂျပ်စက္ကူပေါ်နှင့်ဘေးဘက် နွားချေး မျက်နှာပြင်ပေါ်နေရာအနှံ့ကြဲချပါ။

-ပြီးနောက် ဂျပ်စက္ကူများ၊ မှိုမျိုးများ မမြင်ရအောင် ကြံ၊နွားချေး ဖုံးပါ။ ရေ(၄)ဂါလံဝင်ပုံးနှင့်(၅)-ပုံးမှ(၁၂)ပုံးခန့်မှိုပုံမျက်နှာပြင်ပေါ်နေရာအနှံ့ ဖြန်းပါ။ပူပြင်းသောနွေရာသီ၌ရေများလေပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။

-မှိုဟော်မုန်းအားဆေး(၁)ထုပ်ကိုရေဆယ်ဝင်ပုံးနှင့်တစ်ပုံးဖျော်၍ မှိုပုံမျက်နှာပြင်နေရာအနှံ့ ဖြန်းပါ။မှိုပုံဘေးဘက်ကျင်းအတွင်းရေပြည့်အောင်ဖြည့်ပါ။

-မြေပြင်မှခေါင်အမြင့်၁-တောင်(၁-


ပေခွဲ)ခန့်ထားပြီးမှိုပုံပေါ်မှခေါင်တန်း(သို့)ပေါင်းမိုးကိုင်းလုပ်ပြီးငင်းပေါ်မှအိမ်ခေါင်မိုးကဲ့သို့ပ
လတ်စတစ်အလုံအုပ်ပါ။ပလတ်စတစ်အလုံအုပ်ရာတွင်မှိုပုံဘေးဘက်ခြုံမိအောင်အုပ်ရမည်။
-
မှိုပုံပလတ်စတစ်အနားများကိုမြေခဲ(သို့)သဲနှင့်လုံခြုံအောင်ဖိပေးထားပါ။ပလတ်စတစ်ပေါ်မှေ
ာ်ရိုး၊သက်ကယ်၊ခနဲ တစ်မျိုးမျိုး ပြန်အုပ်ပေးပါ။
-လုံးဝနေရိပ်တွင်
စိုက်ပါကပလတ်စတစ်ချည်းသာအုပ်နိုင်သည်။သစ်ပင်ရိပ်စိုက်သူများနေရောင်အနည်းငယ်ထို
းတတ်သဖြင့်ကောက်ရိုး၊သက်ကယ်၊ခနီပါးပါးပြန်အုပ်သင့်ပါသည်။



ပြုစုခြင်း

-
(၄)ရက်မြောက်၊(၅)ရက်မြောက်နေ့တွင်မှိုပုံကိုဖွင့်ပြီးမှိုဟော်မုန်းအားဆေး(၁)ထုပ်ကိုရေဆ
ယ်ဝင်ပုံးနှင့်(၁)ပုံးဖျော်၍ ဖြန်းပါ။
မှိုပုံရေခြောက်ပါကရေပို၍လောင်းနိုင်သည်။မှိုပုံဘေးဖက်ကျင်းအတွင်းရေပြည့်အောင်ဖြည့်ပါ
။
-ပလတ်စတစ်ပြန်အုပ်ရာ၌ တစ်ပုံလုံးလုံအောင်
မအုပ်ရပါ။မှိုဘောင်ထိပ်နှစ်ဖက်နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်တို့တွင်တစ်ဖက်လေပေါက်တစ်ပေါက်စီ(စုစု
ပေါင်း ၄-ပေါက်)ပေးထားရမည်။
-လေပေါက်ပေးပုံမှာပလတ်စတစ်အောက်ခြေကိုအနည်းငယ်လိပ်ခေါက်ပြီးစ-
လက်မပတ်လည်၉-

လက်မပတ်လည်ခန့်ရှိသောစမူဆာပုံအပေါက်(တြိဂံပုံအပေါက်)ဖွင့်ထားရမည်။(ပုံတွင်ကြည့်ပါ။)
-စတင်စိုက်သည့်ရက်မှ(၆)-ရက်၊(၇)-
ရက်ခန့်တွင်မှိုပုံမျက်နှာပြင်တစ်ပြင်လုံးသေးငယ်သောမှိုသန္ဓေလေးများဆန်ကွဲစေ့သဏ္ဌာန်မြင်ရပါမည်။
-မှိုသန္ဓေမြင်ရပြီး(၄)-ရက်၊ (၅)-ရက်မြောက်သောနေ့၌ဆွတ်ခူးနိုင်သောမှိုငုံကြီးများအဆင့်သို့ရောက်ပါသည်။
-ပထမအကြိမ်ထွက်သောမှိုများကို ကြီးသည့်ဥများရွေးဆွတ်ခူးပါက(၃)ရက်မှ
(၅)ရက်ခန့်ခူးပြီးမှိုများကုန်သွား၍ဆန်ကွဲစေ့သဏ္ဌာန်မှိုသန္ဓေလေးများသာကျန်တတ်ပါသည်။ထိုအခါငင်းမှိုသန္ဓေလေးများကြီးအောင်မစောင့်တော့ဘဲ(ရေခြောက်လျှင်)
ရေဖြန်းကရားနှင့်ရေဖြန်းပါ။
-ရေဆယ်ဝင်ပုံး ၁-ပုံးမှ ၂-ပုံးထိ
ဖြန်းနိုင်ပါသည်။ရေခြောက်ပါကရေပိုဖြန်းနိုင်ပါသည်။နောက်(၂-၃)ရက်ခန့်အကြာတွင်
ဒုတိယအကြိမ်မှိုအသစ်ထပ်ထွက်ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ်
မှိုများခူး၍ကုန်ပါကမှိုပုံရေခြောက်လျှင်ရေဖြန်းပါ။တတိယအကြိမ်မှိုထပ်ထွက်ပါသည်။
-စတင်စိုက်သည့်ရက်မှ(၁)လအတွင်း (၇)ပိသာမှ(၁၅)ပိသာခန့်အထိထွက်ရှိ နိုင်ပါသည်။
မှိုပုံသက်တမ်း(၁)လကျော်ပါက မှိုများထွက်နိုင်မှု
မရှိတော့ဘဲထွက်ပါကလည်းအနည်းငယ်သာရရှိတတ်သည်။
-
(နွားချေးအစားဗေဒါသုံးနိုင်ပါသည်။ဗေဒါအစိုရောအခြောက်ပါသုံးနိုင်သည်။အခြောက်သုံးပါက(၅)မိနစ်ခန့်ရေစိမ်သုံးပါ။ဗေဒါကိုတစ်ထွာတစ်မိုက်စင်းပြီးနွားချေးသုံးသည့်နေရာတိုင်းအစားထိုးထည့်နိုင်သည်။ဗေဒါစိုက်နည်းတွင်အပေါ်ဆုံးမှနွားချေးတစ်တင်းခန့်ပါးပါးဖြူးပေးရမည်။)





ကြွက်နားရွက်မှို

ကြွက်နားရွက်မှို စိုက်ပျိုးခြင်း (စိုက်ထုပ်)

-အဓိက ဘေးခွဲ၍ စိုက်ပျိုးသည်။ မှိုထုပ်၏ ဘေးပတ်လည်ကို(၁"-၂")အရွယ်ဓားသန့်သန့်ဖြင့်ခွဲပါ။တစ်ထုပ်လျှင်ဓားရာ(၈- ၁၀)နေရာခန့်(၁"-၁.၅") အရွယ်စောင်း၍ခွဲပါ။အောက်မျက်နှာစာတွင်ဓါးရာ(၂)ချက်ရှိရမည်။

- မှိုထုပ်၏ ထိပ်မှ ကြိုးဆွဲ၍ဖြစ်စေ၊ ဝါးစင် သစ်သားစင်ပေါ်တွင် ထောင်၍ဖြစ်စေ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
- စိုက်ခန်းအပူချိန်သည်(၂၅-၃၂) ºC နှင့် စိုထိုင်းဆ(၈၀-၉၅)% ရှိရမည်။
- လေဝင်လေထွက် ကောင်းစွာရရှိရမည်။
- အလင်းရောင် အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။
-
နေ့စဉ်ရေလောင်းပေးရမည်။တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးရေ(နှစ်ကြိမ်)လောင်းပေးရမည်။အထုပ်များအတွင်းရေမဝပ်စေရ၊မှိုပွင့်များပုပ်ရိသွားနိုင်သည်။

မှိုထုပ်များ စဖွင့်ပြီး(၅-၇)ရက်အတွင်းမှိုပွင့်ငယ်များထွက်ပေါ်လာပြီး(၇-၁၀)ရက်အတွင်းဆွတ်ခူးရန်အသင့်ဖြစ်သည်။
- ဆွတ်ခူးပြီးနောက်မှိုထုပ်များကို(၃-၄)ရက်ခန့်ရေမလောင်းဘဲထားရမည်။ကြမ်းပြင်ကိုသာရေဖျန်းပေးပါ။ထို့နောက်မှိုထုပ်များမှမှိုပွင့်များပြန်လည် ထွက်လာပါသည်။
- ဤနည်းအတိုင်းမှိုထုပ်ကို(၂)လမှ(၂)လခွဲကြာသည်အထိ(၃-၅)ကြိမ်အထိဆွတ်ခူးနိုင်သည်။
- မှိုထွက်အားကောင်းစေရန် Urea (၁၀၀)ဂရမ်၊ T-Super (၅၀)ဂရမ် ကို ရေ(၂.၅)ဂါလံတွင်ဖျော်စပ်၍တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ခန့်ဖျန်းပေးရမည်။
- ၆၀ ကျပ်သား မှိုထုပ်တစ်ထုပ်မှ မှိုပွင့်အလေးချိန် (၂၀-၃၀)ကျပ်သား ရရှိနိုင်သည်။

ကြွက်နားရွက်မှို စိုက်ပျိုးရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာများ

(၁) စိုက်ထုပ်များ ပျက်စီးခြင်း
- ပိုးသတ်ရာတွင်အပူချိန်၊ပေါင်းချိန်မလုံလောက်ခြင်း
-ဖြည့်စွက်စာအထည့်များ၍ ပြင်ပမှအဖျက်အဆီးများဝင်လာခြင်း
-မျိုးထည့်သွင်းစဉ် သေးမွှားသက်ရှိများ ဝင်ရောက်ခြင်း

(၂) မွှားဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခြင်း
- မျိုးပွားစာမှ ပါလာခြင်း
- စိုက်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်မသန့်ရှင်းခြင်း(အလွန်ဆိုးရွားသောပြဿနာဖြစ်သည်။)

(၃) မှိုမျှင်ပြည့်သော်လည်း မှိုသန္ဓေခဲ မဖြစ်ပေါ်ခြင်း

- မျိုးညှံ့ခြင်း
- အာဟာရဓာတ် မလုံလောက်ခြင်း
- အစိုဓာတ် မလုံလောက်ခြင်း
- အိတ်ခွဲမှု နည်းလွန်းခြင်း

(၄) မှိုထုပ်ပုပ်ရိခြင်း၊ အရောင်ပျက်၍ အနံ့ဆိုးသောမှိုများတွေ့ရခြင်း

- Mucor spp. ခေါ် ဘုံနိမ့်မှိုတစ်မျိုးကြောင့် စိုက်ခန်း မသန့်ခြင်း

(၅) မှိုထုပ်ခွဲပြီးနောက် Pinicillium spp.များထွက်လာခြင်း

- ရာသီဥတုပူလျှင် ဖြစ်တတ်သည်။
- ပေါင်းချိန် မပြည့် ပေါင်းမနပ်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

ကြွက်နားရွက်မှို စိုက်ပျိုးရာတွင် လိုက်နာသင့်သည့်အချက်များ

(၁) ငွေနှင်းထက် အနည်းငယ် ခံနိုင်ရည်နည်းပြီး မှိုမျှင်ပြည့်ရန် ပိုကြာသည်။
(၂) မျိုးသုံးရာတွင် သားဆက်နည်းသော မျိုးပုလင်းကို အဓိကထား သုံးသင့်သည်။
(၃) ကြွက်နားရွက်မှိုစိုက်ထုပ် ပြုလုပ်ရာတွင် ထုံးအပြင် Gypsum သုံးသင့်သည်။
(ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ)
(၄) ကြွက်နားရွက်မှိုစိုက်ရန် စိုက်ထုပ်ကို ပေါင်းတင် ပိုးသတ်ရာတွင် သာမန်ထက် အချိန်ပိုယူသင့်သည်။
(၅)
မွားကျရောက်ခြင်းသည်ကြွက်နားရွက်မှိုစိုက်ပျိုးမှုတွင်ကြီးမားသောအဟန့်အတားဖြစ်စေေကြောင့်မွားအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်တွက်ဆကာလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တိုင်းတွင်သေချာမှု/သပ်ရပ်သန့်ရှင်းမှုတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သင့်သည်။
(၆)

အစိုနှင့်အခြောက်စျေးကွက်ဟူ၍ရှိရာအစိုစျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီသောမျိုး၊အခြောက်စျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီသောမျိုးကို ခွဲခြား၍ စိုက်ပျိုးသင့်သည်။



ကြွက်နားရွက်မှိုမျိုးများ



A auricula

A polytricha