

PC 6 : Convergence & Loi des grands nombres

Dernière modification 24 mai 2023

Rappels

- Convergence en probabilité

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \iff \forall \epsilon > 0 \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) = 0$$

- Convergence en moyenne

$$X_n \xrightarrow{L^1} X \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(|X_n - X|) = 0$$

- Convergence presque-sûrement

$$X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X \iff \mathbb{P} \left(\left\{ \omega : \lim_{n \rightarrow +\infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} \right) = 1$$

- Théorème de convergence dominée

Si $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X$ et $\exists Z$ v.a réelle tel que $\forall n, |X_n| \leq |Z|$ p.s. Alors, $X_n \xrightarrow{L^1} X$

- Loi des grands nombres Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ i.i.d $\in L^1$.

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}(X_1)$$

- Lemme de Borel-Cantelli

- Si la série $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < +\infty$, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$. C'est à dire, p.s il y a un nombre fini de A_n qui sont réalisés.
- Si de plus la suite $(A_n)_n$ est indépendante, alors $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = +\infty \implies \mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. C'est à dire, p.s une infinité de A_n sont réalisés.

Q1 Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires de loi Bernoulli, $X_n \sim \mathcal{B}(p_n)$ avec $p_n \rightarrow 0$.

1. Montrer que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ et $X_n \xrightarrow{\mathbb{L}^1} 0$.
2. On suppose que $\sum_n p_n < \infty$. Montrer que $X_n \xrightarrow{p.s.} 0$.
3. On suppose que $X_n \xrightarrow{p.s.} 0$. Montrer qu'on n'a pas nécessairement $\sum_n p_n < \infty$.
4. On suppose maintenant que $\sum_n p_n = \infty$ et que les variables $(X_n)_{n \geq 1}$ sont indépendantes. Montrer que $X_n \not\xrightarrow{p.s.} 0$.

1.

$$\forall \epsilon > 0 \quad \mathbb{P}(|X_n - 0| > \epsilon) = \mathbb{P}(X_n = 1) = p_n \rightarrow 0$$

donc, $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

$$\mathbb{E}(|X_n - 0|) = \mathbb{E}(X_n) = p_n \rightarrow 0$$

donc, $X_n \xrightarrow{L^1} 0$.

2. Par le lemme de Borel-Cantelli $\sum_n p_n < +\infty \implies \mathbb{P}(\limsup\{X_n = 1\}) = 0$. Donc, il y a un nombre fini de $X_i = 1 \implies X_n \xrightarrow{p.s.} 0$.

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega : \lim_{n \rightarrow +\infty} X_n(\omega) \neq 0\right\}\right) = \mathbb{P}(\limsup\{X_n = 1\}) = 0$$

3. Soit U une v.a réelle de loi uniforme $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$. Prenons $X_n = \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{n}]}(U)$. On note $X_n \sim \mathcal{B}(\frac{1}{n})$.

$$\sum_n p_n = \sum_n \frac{1}{n} = +\infty$$

$$X_n(\omega) = \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{n}]}(U(\omega)) = 0 \forall n \geq n_0 \implies X_n \xrightarrow{p.s.} 0.$$

4. Par le lemme de Borel-Cantelli $\sum_n p_n = +\infty$ et la suite $(X_n)_n$ est indépendante, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. Donc, on a une infinitude de $X_i = 1 \implies X_n \not\xrightarrow{p.s.} 0$.

Q4 Montrer qu'une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires converge presque sûrement vers une variable aléatoire X si et seulement si $M_n = \sup_{k \geq n} |X_k - X|$ converge vers 0 en probabilité.

Supposons que $X_n \xrightarrow{p.s.} X \implies M_n \xrightarrow{p.s.} 0 \implies M_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Réciproquement, supposons que $M_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

$$\begin{aligned} \iff \forall \epsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|M_n - 0| > \epsilon) &= 0 \\ &= \mathbb{P}(M_n > \epsilon) \\ &= \mathbb{P}(\sup_{k \geq n} |X_k - X| > \epsilon) \\ &= \mathbb{P}(\cup_{k \geq n} \{|X_k - X| > \epsilon\}) \end{aligned}$$

$$\iff \forall \epsilon > 0 \quad \mathbb{P}(\cap_{n \geq 1} \cup_{k \geq n} \{|X_k - X| > \epsilon\}) = 0$$

En particulier, soit $B = \cup_{m \in \mathbb{N}} \cap_{n \geq 1} \cup_{k \geq n} \{|X_k - X| > \frac{1}{m}\}$ on a

$$\mathbb{P}\left(\cup_{m \in \mathbb{N}} \cap_{n \geq 1} \cup_{k \geq n} \{|X_k - X| > \frac{1}{m}\}\right) = 0.$$

$$\mathbb{P}(\lim X_n \neq X) \leq \mathbb{P}(B) = 0 \implies X_n \xrightarrow{p.s.} X.$$

Q6 Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue bornée et $\lambda > 0$. Déterminer

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} g\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) dx_1 \dots dx_n$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda n} \frac{(\lambda n)^k}{k!} g\left(\frac{k}{n}\right)$$

1. Soit $X_i \sim \mathcal{U}[0, 1]$ indépendantes.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} g\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) dx_1 \dots dx_n = \int_{[0,1]^n} g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) dx_1 \dots dx_n \quad (1)$$

$$= \mathbb{E}(g(\bar{X}_n)) \quad (2)$$

$$\xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}(g(\mathbb{E}(X_i))) \text{ par la loi des grands nombres.} \quad (3)$$

$$= g\left(\frac{1}{2}\right) \quad (4)$$

2. Soit $Y_n \sim \mathcal{P}(\lambda k)$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda n} \frac{(\lambda n)^k}{k!} g\left(\frac{k}{n}\right) = \mathbb{E}\left(g\left(\frac{Y_n}{n}\right)\right) \quad (5)$$

$$= \mathbb{E}(g(\bar{Z}_n)) \text{ où } Z_i \sim \mathcal{P}(\lambda) \text{ indépendantes} \quad (6)$$

$$\xrightarrow{\text{p.s.}} g(\lambda) \text{ par la loi des grands nombres.} \quad (7)$$

Q9 On considère une particule se déplaçant sur l'axe réel, et on note X_n sa position à l'instant $n \in \mathbb{N}$. On suppose que X_0 est une v.a réelle et que la position de la particule évolue de la manière suivante

$$X_{n+1} = X_n + \epsilon_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

où $(\epsilon_n)_{n \geq 1}$ est une suite de v.a.r i.i.d intégrables et de moyenne $m \neq 0$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} |X_n| = +\infty$ p.s.

Par récurrence $X_n = X_0 + \sum_{i=1}^n \epsilon_i$.

Par la loi des grands nombres,

$$\iff \frac{1}{n} X_n = \frac{1}{n} X_0 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \epsilon_i \xrightarrow{\text{p.s.}} \not\equiv m \neq 0.$$

Donc $X \approx nm$ pour n grand $\implies |X_n| \xrightarrow{\text{p.s.}} +\infty$.