به نام خدا



دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران طراحی و تحلیل الگوریتمها، نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲–۹۶ تمرین شماره ۲ (برنامهنویسی پویا) موعد تحویل: ۱۴ آبان ۱۳۹۶



slog(s) عدد S به شما داده می شود، تعداد اعداد بین ۱ تا $7^{"7}$ که مجموع ارقام آن ها برابر S می باشد را بیابید. زمان اجرا

۲- عدد پنج را به صورت زیر می توان به ۶ شکل به صورت جمع اعداد کوچک تر از خود نوشت.

1 + 1 + 1 + 1 + 1

1+1+1+7

1+7+7

7+7

1+1+4

1+4

 $n=0(10^3)$ وا به چند شکل می توان به صورت جمع اعداد کوچک تر از خود نوشت؛ $n=0(10^3)$

- n تا n عددی بین ۱ تا اید و کی کارخانه برای این که یک چوب را به k قسمت (با اندازه دلخواه) تقسیم کنند، c_k پول می گیرند. k عددی بین ۱ تا n می باشد. برای این که یک تکه چوب را به n قسمت تقسیم کنند، کمترین پول چقدر هست؟ n
- ۴- روی محور xها، n نقطه داده شده است. قصد داریم با x بازه بسته تمام نقاط را بپوشانیم. (یک بازه می تواند به طول صفر و فقط شامل یک نقطه باشد یا این که به طول بسیار بزرگ و شامل تمامی نقاط باشد) اگر این کار را به صورتی انجام دهیم که مجموع طول بازه ها کمینه شود، این طول چنده O(nk)
- n^* عددی مثبت یا منفی قرار گرفته است. ما از خانه پایین سمت چپ جدول n^* عددی مثبت یا منفی قرار گرفته است. ما از خانه پایین سمت چپ جدول شروع کرده و در آن حرکت می کنیم. در هر مرحله مجاز هستیم به یکی از خانه های مجاور حرکت کنیم. به هر خانه که می رسیم معادل عدد داخل آن امتیاز دریافت می کنیم. حداکثر امتیازی که می توانیم جمع کنیم چه قدر است؟
- الف) مسئله را برای حالتی حل کنید که فقط به خانه بالایی یا به خانه بالا سمت راست می توانیم و یا خانه بالا سمت چپ می توانیم برویم. O(nm)
- ب) مسئله را در حالتی حل کنید که علاوه بر خانه های قسمت قبل به خانه های راست و چپ هم می توانیم حرکت کنیم(تنها حرکت به سمت پایین غیر مجاز است.) $O(n^2m)$ (امتیازی)
- k در یک درخت تعدادی از رئوس به رنگ سیاه درآمدهاند. میخواهیم k یال از یالهای درخت را حذف کنیم به طوری که درخت به k+1 درخت کوچک تر تقسیم شود به طوری که در هر درخت به وجود آمده دقیقا یک راس سیاه وجود داشته باشد. الگوریتمی ارائه دهید که در O(n) تعداد حالات ممکن برای این کار را محاسبه کند.
- ۷- دو عدد a و d به همراه عدد d به شما داده می شود. جفت اعداد x و y به صورتی که شروط زیر برقرار باشد، چه تعداد هستند؟(امتیازی)

 $gcd(x, y) = d X \le a, y \le b$

الف) برای d=1 مسئله را حل کنید.

محدودیت زمانی: اگر k تعداد عوامل اول کوچک تر از b باشد زمان اجرا باید $O(b*2^k)$ باشد.

ب) مسئله را برای حالت کلی حل کنید.

 $o(o\left(\sqrt{n}(nlgn+blg\ b)\right)$ زمان اجرا

توضیح: gcd به معنای بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد است. برای مثال gcd بین ۴ و ۶، ۲ می باشد.

پیروز و سربلند باشید