TP Chinie - Cinetique Le sono: LC21 et LC7 Suis cinétique de la réaction: 2 I (ag) + Sz Optop -> Tzagt ? Sol (ag) K= conditions: gants -> ions I' en exces pour avoir réas hion: I + I2 -> I3 (complexation) and 6 + 1821. considerée conne totale. On suivra absorbance de 17 (55) · 2 experiences: Tune quec: I' V= ISAR [I]= Imol L' 503- : Ves = 500 500 = 10 20127 one sufreque: I V; : Sout []= 100/-Soit: No: Sol (2017) = 10321 (et) was K2 Vugus 1000 3=1001.7-1 Désilibrer pare longue: (oi biensted - serini au spectromètre à 1= 415 m (Reperse Fingre) · donnée Ess = 4360 /. Biblio Messpled "100 novios de chimie sérérele et analy have" p.199-203 L

reactips: - Dodore de potassion (15I) à 1 mol'2-1 (50 au 100 mg) - Peroxo e: sulpate de Sadius (40 5,08) à 10 201 4 (20452) - ear distille pour blace optionellanent - Sel de Mohn (soltion) à 102 mol L-! Verrerie verrenic de précision à par I'en carces car en vilise on concentration dans les pormies. 3 herber de some 1 bother de 200 al (a- some) 2 better leder reger de work sont 3 cures apestro (+( au ca oi) 3 pipette juge de sont I pipetk jasí de 1000 1 pipette jagé de 15 nl (event-ellenen & plants perter plantique) - optionallement 3 ballons de 50 mil - platk jaujé: -- charge bollon - Besterces + Krois + pinces 2 doists