

# Pirmas laboratorinis darbas

Arnas Vaicekauskas

2024 m. rugsėjo 10 d.

## 1 Pirmas pratimas

$$2 + y^2 + \sqrt{5 - x^2}yy' = 0$$

Kintamieji atsiskiria atlikus porą elementarių pertvarkymų:

$$\begin{aligned}\sqrt{5 - x^2}y \frac{dy}{dx} &= -(y^2 + 2) \\ \frac{ydy}{-(y^2 + 2)} &= \frac{dx}{\sqrt{5 - x^2}}\end{aligned}\tag{1}$$

Integruojame:

$$\begin{aligned}\int \frac{ydy}{-(y^2 + 2)} &= \int \frac{dx}{\sqrt{5 - x^2}} \\ -\frac{1}{2} \int \frac{d(y^2 + 2)}{y^2 + 2} &= \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}} + C \\ -\frac{1}{2} \ln |y^2 + 2| &= \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}} + C \\ \ln |y^2 + 2| &= C - 2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}} \\ y^2 &= Ce^{-2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}}} - 2\end{aligned}\tag{2}$$

Prieš tikrindami randame išvestinę "patogesnėje" išraiškoje:

$$\begin{aligned}(y^2)' &= (Ce^{-2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}}} - 2)' \\ 2yy' &= \frac{-2C}{\sqrt{5 - x^2}} e^{-2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}}} \\ yy' &= \frac{-C}{\sqrt{5 - x^2}} e^{-2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}}}\end{aligned}\tag{3}$$

Tikriname:

$$\begin{aligned}
 2 + y^2 + \sqrt{5 - x^2}yy' &= 0 \\
 2 + Ce^{-2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}}} - 2 + \sqrt{5 - x^2} \frac{-C}{\sqrt{5 - x^2}} e^{-2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}}} &= 0 \\
 2 - 2 + Ce^{-2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}}} - Ce^{-2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{5}}} &= 0 \\
 0 &\equiv 0
 \end{aligned} \tag{4}$$

Analitinio sprendinio palyginimas su sprendiniu gautu skaitiniais metodais:  
 TODO

## 2 Antras pratimas

$$3x^3y' = y(3x^2 - y^2) \tag{5}$$

Atliekame elementarų pertvarkymą:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{3} \left( \frac{y}{x} \right)^3 \tag{6}$$

Įvedame keitinį  $u = \frac{y}{x}$  arba  $y = ux$ , tada  $y' = u'x + u$  ir lygtis tampa:

$$\begin{aligned}
 u'x + u &= u - \frac{1}{3}u^3 \\
 u'x &= -\frac{1}{3}u^3 \\
 \int \frac{du}{u^3} &= -\frac{1}{3} \int \frac{dx}{x} \\
 \frac{u^{-2}}{-2} &= -\frac{1}{3} \ln|x| - \frac{1}{3} \ln|C| \\
 u^{-2} &= \frac{2}{3} \ln|Cx|
 \end{aligned} \tag{7}$$

Gražinam keitinį:

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{y^2} &= \frac{2}{3} \ln |Cx| \\ y^2 &= \frac{3x^2}{2 \ln |Cx|}\end{aligned}\tag{8}$$

Prieš tikrindami randame išvestinę "patogesnėje" išraiškoje:

$$\begin{aligned}(y^2)' &= \left( \frac{3x^2}{2 \ln |Cx|} \right)' \\ 2yy' &= \frac{3}{2} \left( \frac{2x \ln |x| - x}{\ln^2 |Cx|} \right)\end{aligned}\tag{9}$$

Tikrinimą atliksime taip pat su "patogesne" lygties forma, padauginę abi puses iš  $y$ , tada:

$$\begin{aligned}3x^3yy' &= y^2(3x^2 - y^2) \\ 3x^3 \frac{3}{4} \left( \frac{2x \ln |x| - x}{\ln^2 |Cx|} \right) &= \frac{3x^2}{2 \ln |Cx|} \left( 3x^2 - \frac{3x^2}{2 \ln |Cx|} \right) \\ \frac{18x^4 \ln |x| - 9x^4}{4 \ln^2 |Cx|} &= \frac{9x^2}{2 \ln |Cx|} - \frac{9x^2}{4 \ln^2 |Cx|} \\ \frac{18x^4 \ln |x| - 9x^4}{4 \ln^2 |Cx|} &\equiv \frac{18x^4 \ln |x| - 9x^4}{4 \ln^2 |Cx|}\end{aligned}\tag{10}$$

Analitinio sprendinio palyginimas su sprendiniu gautu skaitiniais metodais:  
TODO

### 3 Trečias pratimas

$$\begin{cases} y' + 2y = x \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (11)$$

Pirma sprendžiame homogeninį atvejį:

$$y' + 2y = 0 \quad (12)$$

Lygtis yra tiesinė, homogeninė ir su pastoviais koeficientais, todėl galime formuoti charakteringą lygtį:

$$\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -2 \quad (13)$$

Tada bendrasis homogeninės lygties sprendinys turės formą:

$$y = Ce^{-2x} \quad (14)$$

Nehomogeninį variantą sprendžiame konstantų variavimo metodu, darydami prielaidą, kad nehomogeninės lygties sprendinys turės formą:

$$y = C(x)e^{-2x} \quad (15)$$

Tada

$$(Ce^{-2x})' + 2Ce^{-2x} = x$$

$$C'e^{-2x} - 2Ce^{-2x} + 2Ce^{-2x} = x$$

$$C'e^{-2x} = x$$

$$C' = xe^{2x}$$

$$C = \int xe^{2x} dx$$

$$C = \frac{1}{2} \int x d(e^{2x}) \quad (16)$$

$$C = \frac{1}{2} \left( xe^{2x} - \int e^{2x} dx \right)$$

$$C = \frac{1}{2} \left( xe^{2x} - \frac{1}{2} e^{2x} \right) + \tilde{C}$$

$$C(x) = e^{2x} \left( \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right) + \tilde{C}$$

Gauname bendrąjį ir atskirąjį sprendinius:

$$y = C(x)e^{-2x} = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} + \tilde{C}e^{-2x} \quad (17)$$

ir tada

$$y' = \frac{1}{2} - 2\tilde{C}e^{-2x} \quad (18)$$

Tikriname:

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} + \tilde{C}e^{-2x}\right)' + 2\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} + \tilde{C}e^{-2x}\right) &= x \\ \frac{1}{2} - 2\tilde{C}e^{-2x} + x - \frac{1}{2} + 2\tilde{C}e^{-2x} &= x \end{aligned} \quad (19)$$

$$x \equiv x$$

Analitinio sprendinio palyginimas su sprendiniu gautu skaitiniais metodais:

TODO