IPE 1 · 2º examen · Simulacro Test

Tema 3 · Los riesgos ambientales en el trabajo · 140 preguntas de selección múltiple · Tiempo: 75 min · Soluciones al final

Instrucciones: una sola respuesta correcta por pregunta. Hazlo cronometrado y sin mirar el Repaso. Las de **casos prácticos** (ruido, vibraciones, temperatura) son las que más puntúan: si fallas alguna, vuelve a los semáforos del Repaso.

Bloque A · Riesgos físicos, ruido y vibraciones (1-30)

1. En el entorno laboral, los agentes contaminantes pueden:
a) Solo causar molestias sin efectos en la salud
b) Causar daño solo fuera del trabajo
c) Dañar la salud, generar enfermedades profesionales a corto, medio o largo plazo y originar accidentes de trabajo
d) Afectar únicamente a las máquinas

2. Los riesgos físicos se producen por la exposición a agentes físicos, que son:
a) Posturas forzadas y cargas
b) Sustancias químicas en estado líquido
c) Seres vivos que causan enfermedades
d) Manifestaciones de distinto tipo de energía

3. El ruido y las vibraciones proceden de la energía:
a) Electromagnética
b) Mecánica
c) Química
d) Térmica

4. Sobre el ambiente térmico (energía térmica), la profe insistió en que:
a) Solo cuenta el calor
b) No es solo calor, también frío
c) Solo cuenta la humedad
d) No es un riesgo físico

5. Las radiaciones ionizantes alteran los átomos; las no ionizantes actúan a nivel:
a) Atómico
b) Molecular
c) Celular únicamente
d) Nuclear

6. La exposición al ruido es un riesgo:
a) Ergonómico
b) Físico
c) Químico
d) Biológico

7. Según la profe, el agente laboral más extendido que existe es:
a) El ruido
b) El frío
c) La radiación ionizante
d) El virus

8. NO es un efecto del ruido:
a) Trastornos digestivos y del sueño
b) Síndrome de Raynaud
c) Alteración de los sistemas respiratorio y cardiovascular
d) Hipoacusia laboral

9. El ruido aumenta el riesgo de accidentes laborales porque:
a) Baja la atención y el tiempo de reacción
b) Aumenta la temperatura del cuerpo
c) Produce alergias
d) Provoca cambios atómicos

10. La hipoacusia laboral es:
a) Una enfermedad de la columna vertebral
b) Una infección del oído por bacterias
c) Una sordera específica del trabajo, de leve a muy grave, hasta perder el oído
d) Un desmayo por calor

11. El nivel diario equivalente mide:
a) La exposición continuada durante una jornada de 8 horas, en dB(A)
b) La vibración en m/s^2
c) El valor máximo de presión sonora en un instante, en dB(C)
d) La temperatura del puesto

12. El nivel de pico es:
a) El nivel a partir del cual no hay riesgo
b) La exposición de toda la jornada, en dB(A)
c) La media semanal de ruido
d) El valor máximo de presión sonora alcanzado en un periodo muy breve, en dB(C)

13. Un ejemplo de nivel de pico es:
a) Una oficina silenciosa
b) Un maquinista de tren a lo largo de su vida laboral
c) Una máquina toda la jornada
d) Una explosión

14. El nivel diario equivalente a partir del cual se adoptan medidas (amarillo) es:
a) 85 dB(A)
b) 80 dB(A)
c) 135 dB(C)
d) 87 dB(A)

15. Los valores de pico del semáforo de ruido son:
a) 135 · 137 · 140 dB(C)
b) 2,5 · 5 · 1,15 m/s^2

c) 135 · 137 · 140 dB(A)
d) 80 · 85 · 87 dB(C)

16. A partir de 85 dB(A) / 137 dB(C) (naranja):
a) El EPI es obligatorio, el riesgo queda señalizado y hay un programa de medidas técnicas y organizativas
b) No hay riesgo
c) El EPI solo está a disposición
d) Se deja de trabajar inmediatamente

17. El valor de 87 dB(A) / 140 dB(C) (rojo):
a) Solo exige audiometría cada 5 años
b) Permite trabajar con EPI sin límite
c) Obliga solo a dar información
d) Nunca se puede superar: se deja de trabajar

18. En el nivel amarillo (80 dB(A)) el EPI está:
a) Prohibido
b) Solo para los encargados
c) A disposición, no obligatorio
d) Obligatorio siempre

19. Una peluquera expuesta a 84 dB(A):
a) No tiene ningún riesgo
b) Está en amarillo: información, formación, vigilancia de la salud y EPI a disposición
c) Tiene EPI obligatorio
d) Debe dejar de trabajar

20. Si el trabajador está a 86 dB(A):
a) El EPI ya es obligatorio
b) No hay que hacer nada
c) Basta con información
d) Se deja de trabajar sin excepción

21. Si se sobrepasa el valor límite de ruido hay que:
a) Adoptar medidas inmediatas para reducir la exposición
b) Aumentar la jornada
c) Solo informar al trabajador
d) Esperar a la siguiente evaluación

22. Un puesto con un ruido diario equivalente de 74 dB(A):
a) Tiene EPI obligatorio
b) Está por debajo de 80 dB(A): no hay riesgo ni es obligatorio adoptar medidas
c) Supera el valor límite
d) Debe señalizarse en rojo

23. De 80 a 85 dB(A), si el trabajador pierde oído sin usar el EPI:
a) No existe ese caso
b) La reclamación no prospera
c) La culpa es siempre del trabajador
d) Se puede recurrir, porque no era obligatorio

24. La señalización del riesgo por ruido (naranja) se hace con paneles:
a) Rojos y negros
b) Verdes
c) Grises
d) Amarillos y azules

25. ¿Por qué el rojo se mide mejor en diario equivalente que en pico?
a) Porque el pico solo se usa en vibraciones
b) Porque el pico no existe
c) Porque el diario se mide en m/s^2
d) Porque el pico es muy difícil de medir: el sonido máximo dura 1-2 segundos

26. Una vibración es todo movimiento oscilatorio transmitido al cuerpo:
a) Por ondas electromagnéticas
b) Por un elemento sólido, cuya energía es absorbida por el cuerpo humano
c) Por contacto con seres vivos
d) Por el aire, como el ruido

27. Según la profe, el daño de la vibración depende de la energía y, muy importante, de la:
a) Humedad
b) Edad del trabajador
c) Duración
d) Indumentaria

28. Las herramientas manuales (herramientas mecánicas portátiles: martillo neumático, radiales, taladros) generan vibraciones del:
a) Sistema auditivo
b) Sistema digestivo
c) Cuerpo entero
d) Sistema mano-brazo

29. La vibración de cuerpo entero se transmite:
a) Solo por las manos en tareas de agarre
b) Por el aire
c) Por la piel y las mucosas
d) Sentado o de pie, a través de asientos y plataformas de vehículos o máquinas

30. El síndrome de Raynaud (dedos blancos por pérdida de circulación) es un efecto:
a) De las radiaciones ionizantes
b) De los agentes biológicos
c) Vascular de las vibraciones mano-brazo
d) Del estrés térmico por frío

Bloque B · Vibraciones (medidas) y ambiente térmico (31-46)

31. Las vibraciones de cuerpo entero (camión, villavesa, tractores, cosechadoras) producen (como en el camionero):
a) Afecciones vasculares, neurológicas y musculares de las manos
b) Hipoacusia
c) Afecciones de la columna vertebral, hernias, problemas circulatorios, malestar general y

dolor de cabeza
d) Quemaduras de retina

32. Los límites de vibración de cuerpo entero son mucho más bajos porque:
a) El cuerpo entero recibe toda la vibración
b) Las máquinas vibran menos
c) Se usa siempre EPI
d) Solo se mide 1 hora

33. Valores de vibración mano-brazo (acción / límite):
a) 2,5 m/s^2 / 5 m/s^2
b) 5 m/s^2 / 10 m/s^2
c) 0,5 m/s^2 / 1,15 m/s^2
d) 80 / 87 dB(A)

34. Valores de vibración de cuerpo entero (acción / límite):
a) 0,14 m/s^2 / 0,39 m/s^2
b) 2,5 m/s^2 / 5 m/s^2
c) 0,5 m/s^2 / 1,15 m/s^2
d) 1,15 m/s^2 / 2,5 m/s^2

35. El valor límite de vibración:
a) No se puede pasar ni 2 segundos: hay que parar o que lo haga otra persona, aunque se lleve EPI
b) Se puede superar si se lleva EPI
c) Se puede superar media jornada
d) Solo obliga a dar formación

36. Una pulidora en un taller da 4 m/s^2. Es:
a) Cuerpo entero: supera el límite
b) Mano-brazo: sin riesgo
c) Mano-brazo: supera la acción (2,5) sin llegar al límite (5); hay riesgo y hay que adoptar medidas
d) Mano-brazo: supera el límite y hay que parar

37. En construcción naval, una carretilla da 1,27 m/s^2 (cuerpo entero):
a) No llega a la acción: sin riesgo
b) Está entre acción y límite
c) Es mano-brazo y no hay riesgo
d) Supera el límite de 1,15: medidas inmediatas

38. Un soldador a 0,14 m/s^2 y un puente grúa a 0,39 m/s^2:
a) El soldador supera el límite
b) Ninguno llega a su valor de acción (2,5 y 0,5): sin riesgo
c) Los dos superan el límite
d) El puente grúa supera el límite

39. Frente a las vibraciones, la primera opción es:
a) Aceptar que hay riesgo 0
b) Eliminar la vibración en su origen

c) Dar EPI
d) Aumentar la jornada

40. Usar robots o brazos neumáticos y un buen mantenimiento de herramientas es una medida:
a) Sobre las personas
b) Técnica sobre el foco
c) Técnica sobre el medio
d) Organizativa

41. Los aislantes y la amortiguación (asientos, manguitos) son medidas:
a) Técnicas sobre el foco
b) Organizativas
c) Sobre las personas
d) Técnicas sobre el medio

42. Reducir el tiempo de exposición, cambiar tareas y aumentar los descansos son medidas:
a) Sobre la fuente radiactiva
b) Organizativas
c) Técnicas sobre el medio
d) Técnicas sobre el foco

43. El ambiente térmico es el conjunto de variables termohigrométricas que, junto con el esfuerzo físico, las características individuales y la indumentaria, afectan a la salud. NO depende de:
a) El ruido
b) La velocidad del aire
c) La humedad relativa
d) La temperatura

44. La temperatura para un trabajo sedentario es:
a) 17-27 °C
b) 14-25 °C
c) 10-20 °C
d) 20-30 °C

45. La temperatura en una actividad no sedentaria (trabajo ligero) es:
a) 14 y 25 °C
b) 5 y 15 °C
c) 25 y 35 °C
d) 17 y 27 °C

46. Si hay equilibrio entre el calor producido por el organismo y el que cede al ambiente, hablamos de:
a) Hipotermia
b) Estrés térmico
c) Sobrecarga térmica
d) Confort térmico

Bloque C · Estrés térmico y radiaciones (47-62)

47. La sobrecarga térmica es:
a) Una vibración
b) La respuesta fisiológica del cuerpo al estrés térmico
c) Un tipo de radiación
d) El equilibrio térmico

48. La lipotimia es:
a) Estrés térmico por calor: aumento brusco y sostenido de la temperatura del cuerpo
b) Un efecto de las vibraciones
c) Pérdida auditiva
d) Estrés térmico por frío: pérdida de calor excesiva

49. La hipotermia es estrés térmico por frío; un ejemplo de clase es:
a) Una panadería a 38 °C
b) Un concierto con deshidratación
c) La inyección de plástico
d) Las cámaras frigoríficas de la alimentación en Navarra

50. NO es una medida preventiva de la lipotimia:
a) Piel limpia e hidratada para poder sudar
b) Ropa de trabajo adecuada
c) Aumentar el tiempo de trabajo
d) Evitar cambios de temperatura

51. Para prevenir la hipotermia se usa ropa adecuada y:
a) Piel seca
b) Turnos de 12 horas
c) Limitar el tiempo de trabajo (rotación, turnos de menos de 8 h)
d) Quitarse la ropa de abrigo

52. Un trabajador de una panadería a 38 °C puede sufrir:
a) Síndrome de Raynaud
b) Hipotermia
c) Ningún efecto, está dentro del rango
d) Estrés térmico por calor: sobrecarga térmica, deshidratación, lipotimia, golpe de calor y más accidentes

53. Las radiaciones se clasifican en ionizantes y no ionizantes según:
a) El precio del equipo
b) Su origen natural o artificial
c) Su color
d) Los efectos biológicos que provocan

54. Una radiación son ondas y partículas electromagnéticas emitidas por materias o equipos. La radiación solar es de origen:
a) Artificial
b) Biológico
c) Químico
d) Natural

55. Según la profe, las radiaciones más importantes para vosotros (laboratorio de prácticas) son:
a) Las no ionizantes
b) Los rayos alfa
c) Las ionizantes
d) Los rayos gamma

56. Son campos electromagnéticos (CEM):
a) La luz ultravioleta
b) Los rayos X
c) Las radiofrecuencias y las microondas
d) Los rayos beta

57. Las radiaciones ópticas (RO) son:
a) Alfa y beta
b) Microondas y radiofrecuencias
c) Luz visible, ultravioleta, infrarrojos y láser
d) Rayos X y gamma

58. Efectos a corto plazo de los CEM:
a) Calentamiento de los tejidos, fallo del sistema nervioso, quemaduras con ampollas, náuseas, dolor de cabeza, fatiga y cansancio
b) Hipoacusia
c) Caída del pelo y afectación de las uñas
d) Dedos blancos

59. Mirar un eclipse sin gafas puede causar, por radiación óptica:
a) Hernias
b) Infecciones
c) Daños en los ojos: de conjuntivitis a cataratas o quemaduras de retina
d) Hipotermia

60. La medida preventiva más importante frente a no ionizantes es sobre el medio:
a) Clasificar las zonas de gris a rojo
b) Barreras físicas, separar las zonas de trabajo y señalizar con señales amarillas de peligro (la de no ionizantes parece el símbolo del wifi)
c) Recubrimientos de plomo únicamente
d) Vacunas

61. Rotar a los trabajadores frente a radiaciones no ionizantes es una medida:
a) Organizativa, porque los efectos a largo plazo pueden ser mortales
b) Sobre el foco
c) Sobre el medio
d) Innecesaria

62. Tienen muchísima energía, provocan cambios atómicos y son las radiaciones más peligrosas:
a) Las no ionizantes
b) Los campos electromagnéticos
c) Las radiaciones ópticas
d) Las ionizantes

Bloque D · Ionizantes y químicos (63-80)

63. Las radiaciones ionizantes de ondas son:
a) Microondas
b) Rayos X y rayos gamma
c) Rayos alfa y beta
d) Infrarrojos y láser

64. Las radiaciones ionizantes de partículas son:
a) Luz visible
b) Rayos alfa y rayos beta
c) Radiofrecuencias
d) Rayos X y gamma

65. Vómitos, caída del pelo, afectación de las uñas y síntomas intestinales son efectos de las ionizantes:
a) Inexistentes
b) Tardíos
c) Genéticos
d) Agudos

66. Cataratas, enfermedades de la sangre y cáncer que aparecen años después son efectos de las ionizantes:
a) Térmicos
b) Genéticos
c) Agudos
d) Tardíos

67. Los efectos genéticos de las radiaciones ionizantes afectan al:
a) Sistema reproductivo (y a la descendencia)
b) Sistema digestivo
c) Columna vertebral
d) Oído

68. Las zonas con radiación ionizante se clasifican y señalizan por colores como un semáforo:
a) Todas en amarillo
b) Azul la más grave
c) Gris la más leve y roja la más grave
d) Verde la más grave y roja la más leve

69. NO es una medida frente a las radiaciones ionizantes:
a) Recubrimientos de plomo
b) Clasificación de las personas trabajadoras
c) Aumentar el tiempo de exposición
d) Vigilancia de la salud y EPI

70. El riesgo químico es la posibilidad de sufrir un daño derivado de:
a) La energía mecánica
b) El contacto con seres vivos
c) La exposición a agentes químicos, al manipularlos (líquido, sólido o gaseoso) o cuando se

emiten (polvo, humo, gas, vapores)
d) Las posturas forzadas

71. ¿Qué vía de entrada de los químicos es la más frecuente?
a) Dérmica
b) Digestiva
c) Parenteral
d) Respiratoria

72. La penetración por heridas o discontinuidades de la piel es la vía:
a) Dérmica
b) Respiratoria
c) Digestiva
d) Parenteral

73. Comer, beber o fumar con las manos contaminadas corresponde a la vía:
a) Parenteral
b) Dérmica
c) Digestiva
d) Respiratoria

74. Los químicos son un riesgo para la salud, los lugares de trabajo y el medio ambiente. La profe quiere que sepáis que se clasifican en 3 grandes grupos:
a) Peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente
b) Agudos, tardíos y genéticos
c) Grupos 1, 2, 3 y 4
d) Mecánicos, térmicos y electromagnéticos

75. Los químicos con peligro físico y para la salud son los:
a) Corrosivos
b) Gases a presión
c) Comburentes
d) Peligrosos para el medio ambiente

76. Los productos con sustancias peligrosas deben llevar etiqueta y ficha de seguridad. La etiqueta de seguridad se utiliza para:
a) Poner el precio del producto
b) Decorar el envase
c) Indicar los peligros químicos y su naturaleza
d) Indicar la fecha de compra

77. NO es un elemento obligatorio de la etiqueta:
a) Palabras de advertencia, indicaciones H y consejos P
b) Identificación del producto y cantidad nominal
c) Información del proveedor y pictogramas de peligro
d) El precio del producto

78. En la etiqueta, la H y la P significan:
a) Hospital y Paciente
b) Indicaciones de peligro (H) y consejos de prudencia (P)

c) Higiene y Protección
d) Humedad y Presión

79. Los pictogramas del Sistema Mundialmente Armonizado (GHS) son:
a) Un cuadrado amarillo
b) Un círculo azul
c) Un rombo rojo con símbolo negro
d) Un triángulo verde

80. El pictograma de la llama sobre un círculo indica:
a) Explosivo
b) Comburente
c) Inflamable
d) Gas a presión

Bloque E · Químicos (pictogramas, fases y 5 medidas), biológicos, casos y lo explicado en clase (81-140)

81. La silueta con una estrella en el pecho indica:
a) Inflamable
b) Irritante
c) Peligro grave para la salud (cáncer, mutaciones…)
d) Toxicidad aguda

82. La calavera y tibias indica:
a) Toxicidad aguda
b) Corrosivo
c) Comburente
d) Peligro para el medio ambiente

83. El signo de exclamación indica:
a) Gas a presión
b) Peligro grave para la salud
c) Explosivo
d) Irritante, nocivo, sensibilizante

84. El desinfectante de Antonio es nocivo para los organismos acuáticos; el pictograma es:
a) Árbol y pez muertos (medio ambiente)
b) Bombona de gas
c) Calavera
d) Bomba explotando

85. Un producto que provoca lesiones oculares graves lleva el pictograma de:
a) Bombona de gas
b) Llama
c) Corrosión (gotas sobre mano y metal)
d) Árbol y pez

86. La empresa debe eliminar o reducir al mínimo el riesgo químico. Las 3 fases de la prevención ("importantísimas") son:

a) Controlar → determinar → evaluar
b) Determinar la existencia del agente → evaluar el riesgo → controlar el riesgo
c) Evaluar → comprar EPI → olvidar
d) Vigilar → eliminar → determinar

87. Las fases de la prevención química sirven para que la empresa decida sus acciones de prevención y así:
a) No haga falta etiquetar los productos
b) No haya que cumplir ninguna norma
c) Haya menos accidentes y, si ocurren, sean lo menos graves posible
d) Se elimine el uso de EPI

88. Según la profe, de la diapositiva 12 (evaluación del riesgo químico):
a) Es la pregunta llave
b) No entra: "no os lo pregunto"; lo que quiere son las 3 fases de la diapositiva 11
c) Entra entera y es lo más importante
d) Solo entran los valores numéricos

89. Siguiendo el orden de priorización, la primera medida de control del riesgo químico es:
a) Dar EPI
b) Ventilar
c) Reducir el número de trabajadores
d) Eliminar el agente químico peligroso

90. En el control del riesgo químico, el EPI es:
a) El último recurso
b) Una medida sobre el foco
c) La primera medida
d) Innecesario

91. En químicos, la única medida técnica nueva (3ª medida) es:
a) Vacunar a los trabajadores
b) El almacenamiento: bien etiquetados y guardados, a 2 o 3 cm del suelo, separando incompatibles, en armarios con buena ventilación
c) Usar tapones para los oídos
d) Señalizar las zonas de gris a rojo

92. Según la profe, ¿qué dos productos de limpieza no se deben mezclar nunca?
a) El agua y el jabón
b) El alcohol y el agua
c) La acetona y el agua
d) La lejía y el amoníaco (juntos son tóxicos)

93. Tras eliminar el agente químico, la segunda opción es:
a) Sustituirlo por otro menos peligroso
b) Ignorar el riesgo
c) Aumentar el tiempo de exposición
d) Dar EPI

94. Orden de las medidas frente a cualquier agente ambiental:
a) Origen (foco) – Medio – Receptor

b) Medio – Receptor – Origen
c) Receptor – Medio – Origen
d) Receptor – Origen – Medio

95. Asma, neumonía y bronquitis por químicos afectan al:
a) Aparato respiratorio
b) Sangre
c) Sistema nervioso
d) Riñones e hígado

96. Anemia y leucemia por químicos afectan a:
a) La piel
b) La sangre
c) El corazón
d) El sistema nervioso

97. NO es una asociación correcta de órgano y efecto de los químicos:
a) Corazón → anginas de pecho e infartos
b) Sistema nervioso → anemia
c) Riñones, vesícula e hígado → hepatitis
d) Sistema nervioso → temblores y Parkinson

98. Los efectos de los químicos pueden aparecer:
a) Nunca en la piel
b) Solo al jubilarse
c) De forma aguda o años después (cánceres hasta 40 años)
d) Solo de inmediato

99. El riesgo biológico (seres vivos: virus, bacterias, protozoos…) es la posibilidad de sufrir:
a) Infección, alergia o intoxicación por exposición o contacto con agentes biológicos
b) Sordera por ruido
c) Quemaduras por radiación
d) Hernias por vibraciones

100. El riesgo NO generado por una forma de energía es:
a) El calor
b) El ruido
c) El virus
d) La radiación

101. Según la profe, el contagio biológico:
a) Nunca ocurre por mascotas
b) Solo ocurre en el laboratorio
c) No solo pasa en el trabajo: en casa, con amigos, en el gimnasio o con mascotas también
d) Solo afecta a los médicos

102. Inhalar aerosoles del aire del ambiente laboral es la vía biológica:
a) Parenteral
b) Dérmica
c) Digestiva
d) Respiratoria

103. La vía parenteral de los biológicos consiste en:
a) Inhalar aerosoles
b) Contacto superficial con piel o mucosas
c) Inoculación en las capas profundas de la piel: heridas, pinchazos, cortes, mordeduras
d) Ingerir alimentos o agua contaminados

104. Los efectos de los agentes biológicos dependen de:
a) Solo de la temperatura
b) Solo del color del agente
c) La naturaleza del agente, las condiciones de la exposición y las condiciones del trabajador (inmunidad, embarazo)
d) Solo del EPI

105. Diferencia entre infección y alergia:
a) La infección se puede contagiar a otros (epidemia o pandemia); la alergia solo te afecta a ti
b) Las dos se contagian igual
c) Ninguna afecta a la salud
d) La alergia se contagia y la infección no

106. Además de infecciones y alergias, los agentes biológicos producen:
a) Hipoacusia
b) Síndrome de Raynaud
c) Hipotermia
d) Efectos tóxicos y cáncer

107. El grupo de un agente biológico depende de:
a) Su color
b) Su tamaño
c) El país donde aparece
d) Si existe tratamiento o profilaxis y de lo grave que se ponga la persona

108. Agente biológico poco probable que cause enfermedad (ej. Bacillus subtilis):
a) Grupo 4
b) Grupo 1
c) Grupo 3
d) Grupo 2

109. La gripe (puede causar enfermedad, hay tratamiento) pertenece al:
a) Grupo 2
b) Grupo 4
c) Grupo 1
d) Grupo 3

110. La hepatitis (enfermedad grave, serio peligro, contagio bastante fácil) pertenece al:
a) Grupo 1
b) Grupo 2
c) Grupo 3
d) Grupo 4

111. Un agente mortal, muy contagioso y sin tratamiento eficaz, como el ébola, es del:
a) Grupo 2

b) Grupo 3
c) Grupo 1
d) Grupo 4

112. Las medidas frente al riesgo biológico buscan:
a) Solo usar EPI
b) Aumentar la exposición
c) Romper la cadena de transmisión: foco, medio de difusión y protección individual
d) Eliminar los pictogramas

113. La medida biológica sobre el foco consiste en:
a) Vacunar al trabajador
b) Limitar la proliferación del agente (ej.: actuar sobre el mono infectado antes de que contamine)
c) Evitar la dispersión
d) Señalizar con gris y rojo

114. Cuando el virus ya ha salido del foco y está por el laboratorio, la medida es sobre el medio:
a) Limitar la proliferación
b) Eliminar el agente químico
c) Vacunar
d) Evitar la dispersión

115. Si el mono ha mordido a una trabajadora, la medida es sobre el receptor:
a) Limitar la proliferación
b) Proteger a la persona con vacunas, tratamiento, aislamiento y control
c) Ventilar
d) Evitar la dispersión

116. NO es una actividad laboral con riesgo biológico (según la diapositiva):
a) Trabajo de oficina con ordenador
b) Trabajos sanitarios y post mortem y laboratorios clínicos, veterinarios y de diagnóstico
c) Industria de alimentos, agricultura y trabajo con animales
d) Eliminación de residuos y depuración de aguas residuales

117. ¿Hay exposición a agentes biológicos en Anatomía Patológica?
a) No, nunca
b) Sí: biopsias, citologías, tallado, autopsias; hepatitis B y C, VIH, tuberculosis, hongos, priones
c) Solo en la limpieza
d) Solo con animales

118. En Anatomía Patológica, un pinchazo o corte es vía parenteral; una salpicadura es vía:
a) Parenteral
b) Respiratoria
c) Dérmica
d) Digestiva

119. Una persona manipula productos con etiqueta de 'corrosivo' en un laboratorio. El contaminante es:
a) Físico (ruido)

b) Químico
c) Ergonómico
d) Biológico

120. Un operario conduce una apisonadora de asfalto al sol. Contaminantes:
a) Ninguno
b) Solo ergonómico
c) Solo biológico
d) Físico (vibraciones de cuerpo entero, ruido, calor, radiación solar) y químico por los humos del asfalto

121. Personal con bata y mascarilla en una granja de cerdos. El riesgo principal es:
a) Radiaciones ionizantes
b) Químico
c) Biológico (contacto con animales)
d) Vibraciones

122. La normativa fija los valores de referencia que determinan:
a) El salario del trabajador
b) La temperatura del puesto
c) La posibilidad de sufrir daño auditivo; si se superan los de acción o el límite, la empresa debe adoptar medidas
d) El grupo de riesgo biológico

123. En el ejemplo de 80-85 dB(A), la profe habló de audiometría:
a) Solo al jubilarse
b) Cada 3 años
c) Cada mes
d) Nunca

124. Las 5 medidas de control del riesgo químico, en orden, son:
a) Eliminar → sustituir → técnicas → organizativas → EPI
b) Sustituir → eliminar → EPI → técnicas → organizativas
c) EPI → organizativas → técnicas → sustituir → eliminar
d) Técnicas → EPI → eliminar → organizativas → sustituir

125. Un ejemplo de clase de sustituir un agente químico por otro menos peligroso es:
a) Mezclar lejía y amoníaco
b) Quitar la etiqueta al envase
c) Guardar el producto en el suelo
d) Cambiar un producto de base alcohólica por uno de base acuosa (para esterilizar)

126. Las medidas organizativas frente al riesgo químico consisten en:
a) Almacenar en armarios ventilados
b) Sustituir el agente por otro
c) Limitar el número de personas expuestas, rotar y dar más descansos
d) Eliminar el agente químico

127. La vía parenteral en QUÍMICOS (la profe insistió) es la entrada:
a) Al respirar gases o vapores
b) Por inoculación: un pinchazo o un mordisco

c) Por la boca con alimentos
d) Por una herida o lesión que ya tenías (rasguño, postilla); no hace falta pincharse

128. Te raspas el brazo con una mesa que limpiaron hace 2 horas con un disolvente y entra por la herida. La vía es:
a) Parenteral (químicos: herida que ya tenías)
b) Respiratoria
c) Digestiva
d) Inoculación biológica

129. Son peligros FÍSICOS de los químicos (según la profe):
a) Carcinógenos y mutágenos
b) Alteración del tiroides
c) Sensibilizantes respiratorios
d) Incendio, explosión y corrosión para los metales (ej.: el óxido de los edificios cerca de la playa)

130. Un químico mutágeno es el que:
a) Arde con facilidad
b) Provoca mutaciones en los genes que pueden pasar a la descendencia
c) Provoca cáncer
d) Acelera el fuego de otro

131. ¿Dónde está presente el pictograma de peligro grave para la salud (silueta con estrella en el pecho), según la profe?
a) En la trementina (pintar al óleo) y la gasolina
b) En los fuegos artificiales
c) En los extintores
d) En las cerillas y el oxígeno médico

132. Un aerosol antimosquitos lleva el pictograma de:
a) Gas a presión únicamente
b) Inflamable (llama)
c) Comburente (llama sobre un círculo)
d) Peligro para el medio ambiente

133. El oxígeno de uso médico y las cerillas llevan el pictograma de:
a) Explosivo (bomba)
b) Comburente (llama sobre un círculo): aceleradores del fuego
c) Corrosivo
d) Inflamable (llama)

134. Según la profe, los pictogramas son internacionales para:
a) Sustituir a la ficha de seguridad
b) Que el producto sea más barato
c) Decorar el envase
d) Identificar el riesgo aunque no conozcas el idioma (Sistema Mundialmente Armonizado)

135. Ejemplos de agentes químicos que dio la profe:
a) Ruido, vibraciones y calor
b) Lejía, amoníaco, productos de esterilización, carburantes y comburentes

c) Virus, bacterias y hongos
d) Rayos X y gamma

136. NO es un peligro para la salud de los químicos (es de otro grupo):
a) La corrosión para los metales (es un peligro físico)
b) Peligro por aspiración (la sustancia llega al pulmón)
c) Irritantes para la piel y los ojos
d) Tóxicos para la reproducción (ej.: tabaco)

137. Un niño que bebe detergente del lavavajillas y se quema el estómago es un ejemplo de:
a) Alteración del sistema endocrino (ej.: tiroides)
b) Mutágeno
c) Los tóxicos específicos en determinados órganos (dañan un órgano concreto)
d) Peligro físico

138. En biológicos, la parenteral es por inoculación. Ejemplo de clase:
a) Pincharse con una aguja mal desechada o que te muerda una rata del laboratorio
b) Beber agua
c) Respirar humo
d) Rasparse con una mesa limpiada con disolvente

139. Los fitosanitarios y plaguicidas, el metanol y los biocidas llevan el pictograma de:
a) Corrosivo (como los desatascadores)
b) Toxicidad aguda (calavera y tibias)
c) Gas a presión
d) Signo de exclamación (como los limpiadores)

140. No son riesgos derivados de las condiciones ambientales:
a) Los agentes químicos
b) Los agentes biológicos
c) Los ergonómicos
d) El ruido

✔ SOLUCIONES

1 c	**2 d**	**3 b**	**4 b**	**5 b**	**6 b**	**7 a**	**8 b**	**9 a**	**10 c**
11 a	**12 d**	**13 d**	**14 b**	**15 a**	**16 a**	**17 d**	**18 c**	**19 b**	**20 a**
21 a	**22 b**	**23 d**	**24 d**	**25 d**	**26 b**	**27 c**	**28 d**	**29 d**	**30 c**
31 c	**32 a**	**33 a**	**34 c**	**35 a**	**36 c**	**37 d**	**38 b**	**39 b**	**40 b**
41 d	**42 b**	**43 a**	**44 a**	**45 a**	**46 d**	**47 b**	**48 a**	**49 d**	**50 c**
51 c	**52 d**	**53 d**	**54 d**	**55 a**	**56 c**	**57 c**	**58 a**	**59 c**	**60 b**
61 a	**62 d**	**63 b**	**64 b**	**65 d**	**66 d**	**67 a**	**68 c**	**69 c**	**70 c**
71 d	**72 d**	**73 c**	**74 a**	**75 a**	**76 c**	**77 d**	**78 b**	**79 c**	**80 b**
81 c	**82 a**	**83 d**	**84 a**	**85 c**	**86 b**	**87 c**	**88 b**	**89 d**	**90 a**
91 b	**92 d**	**93 a**	**94 a**	**95 a**	**96 b**	**97 b**	**98 c**	**99 a**	**100 c**

1 c	2 d	3 b	4 b	5 b	6 b	7 a	8 b	9 a	10 c
101 c	102 d	103 c	104 c	105 a	106 d	107 d	108 b	109 a	110 c
111 d	112 c	113 b	114 d	115 b	116 a	117 b	118 c	119 b	120 d
121 c	122 c	123 b	124 a	125 d	126 c	127 d	128 a	129 d	130 b
131 a	132 b	133 b	134 d	135 b	136 a	137 c	138 a	139 b	140 c

Reparto: 35 a · 35 b · 35 c · 35 d.

Puntuación: 126-140 = sobresaliente · 105-125 = notable · 84-104 = aprobado · < 84 = vuelve al Repaso.