

Table A.8 Kolmogorov–Smirnov Critical Values

<i>Degrees of Freedom (N)</i>	<i>D_{0.10}</i>	<i>D_{0.05}</i>	<i>D_{0.01}</i>
1	0.950	0.975	0.995
2	0.776	0.842	0.929
3	0.642	0.708	0.828
4	0.564	0.624	0.733
5	0.510	0.565	0.669
6	0.470	0.521	0.618
7	0.438	0.486	0.577
8	0.411	0.457	0.543
9	0.388	0.432	0.514
10	0.368	0.410	0.490
11	0.352	0.391	0.468
12	0.338	0.375	0.450
13	0.325	0.361	0.433
14	0.314	0.349	0.418
15	0.304	0.338	0.404
16	0.295	0.328	0.392
17	0.286	0.318	0.381
18	0.278	0.309	0.371
19	0.272	0.301	0.363
20	0.264	0.294	0.356
25	0.24	0.27	0.32
30	0.22	0.24	0.29
35	0.21	0.23	0.27
Over 35	$\frac{1.22}{\sqrt{N}}$	$\frac{1.36}{\sqrt{N}}$	$\frac{1.63}{\sqrt{N}}$

Source: F. J. Massey, "The Kolmogorov–Smirnov Test for Goodness of Fit," *The Journal of the American Statistical Association*, Vol. 46, © 1951, p. 70. Adapted with permission of the American Statistical Association.