

Математическая логика

Ипатов Марк

29 апреля 2022 г.

Содержание

| | |
|--|----------|
| 1. Множества, мощность множеств | 1 |
| 1.1 Равномощные множества | 1 |
| 1.2 Об операциях над мощностями | 3 |
| 2. Частично упорядоченные множества | 5 |
| 2.1 Про отношение | 5 |
| 3. Высказывания | 8 |
| 3.1 Высказывания | 8 |

1. Множества, мощность множеств

1.1. Равномощные множества

...тут я ещё не начинал записывать

Определение 1.1. Множества A и B равномощны, если \exists биекция между A и B

Замечание. Равномощность является отношением эквивалентности. Очев.

Возможная, но не совсем корректная трактовка — равномощные множества — содержащие равное количество элементов. Для конечных это действительно верно.

Определение 1.2. Множество называется счётным, если оно равномощно множеству натуральных чисел.

Пояснение: мы считаем натуральными числами множество $\{1, 2, 3, \dots\}$, но никакой разницы с $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ нет, т.к. существует биекция из одного в другое — $i \rightarrow i - 1$.

Пример. Чётные числа — счётное множество. Биекция — $i \rightarrow 2 \times i$

Лемма. A, B — счётны $\Rightarrow A \cup B$ — счётно при $A \cap B = \emptyset$.

Доказательство. $\exists f : N \rightarrow A \Rightarrow A : \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$

Аналогично $B : \{b_1, b_2, b_3, \dots\}$

Тогда запишем:

$C : \{a_1, b_1, a_2, b_2, \dots\}, c_{2i-1} = a_i, c_{2i} = b_i$

□

Следствие. \mathbb{Z} — счётно.

Доказательство. $\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{-1, -2, -3, \dots\}$, первое равномощно \mathbb{N} , как и второе, а значит \mathbb{Z} — счётно по предыдущей лемме. □

Лемма. B — счётное, $A \subset B$, тогда A — конечное или счётное.

Доказательство. B — счётно, тогда можно записать $B : \{b_1, b_2, \dots\}$

Раз A подмножество, то просто часть элементов отсутствует. Тогда мы пойдём сопоставлять числа оставшимся элементам. Первое оставшееся — 1, второе — 2, и т.д. Тогда или в какой-то момент у нас закончатся оставшиеся числа, т.е. найдётся то, после которого нет оставшихся, и тогда A — конечно, или мы построим биекцию между A и натуральными числами. Это биекция, поскольку это инъекция и сюръекция (мы каждому натуральному поставили число, и всем элементам A что-то одно сопоставили) □

Теорема 1.1 (Лемма). Любое бесконечное множество содержит счётное подмножество.

Определение 1.3. Множество X бесконечно, если $\forall i \in \mathbb{N}$ можно найти i различных элементов из X .

Доказательство. Возьмём элемент из X . Назовём его a_1 . Если в X не осталось элементов, значит в нём был всего один элемент. Иначе возьмём из X какой-то другой элемент, назовём его a_2 . Если снова не осталось, то было всего два элемента. И так далее, построили $Y = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, и $Y \subset X, f : \mathbb{N} \Leftrightarrow Y$. □

Пример. Счётное множество, для которого мы таким процессом не докажем счётность: $X = \{1, 2, 3, \dots\}$, $Y = \{2, 4, 6, \dots\}$. Иными словами, мы все элементы из X далеко не обязательно вытаскиваем.

Пример. Множество $(0, 1)$ не является счётным.

Следствие. $A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$ — счётны $\therefore A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ — счётно

Доказательство. Для дизъюнктивных всё хорошо понятно. Для недизъюнктивных:

Посмотрим на A_1 и A_2

A_1 . Оба счётны, а тогда $A_1 \cup A_2 = A_1 \sqcup (A_2 \setminus A_1)$

Теперь воспользуемся индукцией по k : База: A_1, A_2 счётны по условию, тогда $A_1 \cup A_2$ тоже счётно. Тогда $(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots A_k) = ((\dots((A_1 \cup A_2) \cup A_3) \cup \dots) \cup A_k)$ \square

Лемма. A_1, A_2, \dots — счётное число счётных множеств, т.е. для любого $i \exists A_i$.

Тогда $A_1 \cup A_2 \cup \dots$ тоже счётно.

Доказательство. A_1 счётно, тогда $A_1 : \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots\}$. Аналогично $A_2 : \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, \dots\}$ И так далее ещё счётное число строк.

Теперь нам нужно эту таблицу представить в виде последовательности. Будем ходить по диагоналям: $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{13}, a_{22}, a_{31}, \dots$

Утверждение — любой элемент будет выписан. Рассмотрим элемент множества i номер j , тогда оно будет на $i + j$ -ой диагонали, а значит его номер точно не будет превышать $(i + j)^2$. Тогда получаем, что любой элемент будет выписан.

Это всё для непересекающихся множеств, а для пересекающихся — давайте просто не выписывать элементы, которые уже выписали. \square

Упражнение. \mathbb{N}, \mathbb{Z} — счётны. $[0, 1)$ — несчётно (просто знаем), знаем \mathbb{R} — несчётно. \mathbb{Q} — счётно или нет?

Доказательство. \mathbb{Q}_+ счётно. Давайте представим его в виде $A_1 \cup A_2 \cup \dots$, где $A_i = \{\frac{m}{i} | m \in \mathbb{N}\}$. Т.к. любое из \mathbb{Q}_+ так представляется, то в такое объединение попадёт всё \mathbb{Q}_+ . \square

Лемма. A, B — счётны, тогда $A \times B$ — счётно.

Доказательство. A, B — счётны, тогда $A : \{a_1, a_2, \dots\}$, $B : \{b_1, b_2, \dots\}$ Элементы из $A \times B$ выглядят так: (a_i, b_j) , тогда давайте запишем следующее:

$A_1 = a_1 \times B = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), \dots\}$, A_2 аналогично, и так далее. Тогда каждое A_i — счётно, и их счётное число, значит их объединение, которое и есть $A \times B$ счётно, по доказанной лемме. \square

Двигаемся к несчётным множествам.

Лемма. Пусть A бесконечно, а B — конечно. Тогда $A \cup B$ равномощно A .

Доказательство. B заменим на $B' = B \setminus A$. B' или станет пустым, или останется конечным.

Очевидно, что $A \cup B = A \sqcup B'$

У A есть счётное подмножество $A' = \{a_1, a_2, \dots\}$, тогда $A = (A \setminus A') \cup A'$.

Хотим построить биекцию между $A = A' \cup (A \setminus A')$ и $A' \cup B' \cup (A \setminus A')$

Между частями $(A \setminus A')$ построим тождественную биекцию. А a_i будем отображать в b_i , если $i \leq k$, а в a_{i-k} если $i > k$. Понятно, что это биекция. Все элементы возьмём как из B , так и из a_i . \square

Замечание. Доказательство можно модифицировать для случая, когда B счётно. Тогда давайте на последнем шаге чётные отображать в a_i , а нечётные — в b_i .

Теорема 1.2. Множество X последовательностей (бесконечных) из нулей и единиц не счётно. (Бинарные строки бесконечной длины)

Доказательство. От противного: пусть счётен, тогда есть биекция $f: \mathbb{N} \rightarrow X$. Тогда выпишем последовательности $f(1), f(2), f(3), \dots$. А теперь воспользуемся диагональным (методом Кантора): Посмотрим на элемент a_{11} , возьмём элемент $1 - a_{11}$. Затем на элемент a_{22} , возьмём $1 - a_{22}$. И так далее, строим последовательность $1 - a_{ii}$. Получили бесконечную последовательность нулей и единиц, значит она элемент X . Но при этом она не может быть любой i -ой последовательностью, поскольку её i -ый элемент не совпадает с i -ым элементом строки i по тому, как мы строили нашу последовательность. Противоречие. Значит мы не можем вот так вот выписать наши элементы X , значит биекции f не существует. \square

Следствие. Множество чисел из отрезка $[0, 1]$ несчётно.

Доказательство. Покажем равномощность множеству X из теоремы. Из бесконечной последовательности число получить легко — припишем слева «0,», а все элементы последовательности запишем слитно. Могло показаться, что получили биекцию, но нет. У нас разные последовательности могут соответствовать одному числу — $0,100000000\dots$ и $0,011111111\dots$ — разные последовательности, но являются одним числом. Возьмём две последовательности — $0, a_{11}a_{12}a_{13}\dots$, $0, a_{21}a_{22}a_{23}\dots$. Утверждение — они задают одно число тогда и только тогда, когда они имеют один префиксы, а затем у одного числа идёт единица и после только нули, а у второго ноль и затем только единицы. Идём слева направо и найдём первый момент, когда они отличаются. В одном ноль, во втором единица. Далее всё идёт сколько-то, как мы предсказали, затем, что-то разойдётся и там можно оценить, что числа у нас уже отличаются на что-то, что не сможем покрыть дальнейшим. Спасибо Близнецу за успешно закрытую собой доску... Но там в любом случае очев = D А все числа такого вида это просто \mathbb{Q} (или что-то такого рода) ((На самом деле оно даже не \mathbb{Q} , там только дроби вида сумма какого-то конечного числа отрицательных степеней двойки, что есть подмножество \mathbb{Q})). Тогда $X \equiv [0, 1] \sqcup (\mathbb{Q} \cap [0, 1])$. Результат пересечения счётен, а значит объединение равномощно бесконечной левой части, т.е. $X \equiv [0, 1]$ \square

Теперь знаем, что натуральные счётны, чётные счётны, целые счётны, рациональные положительные счётны, просто рациональные счётны. А вот действительные уже несчётны, т.к. содержат $[0, 1]$.

Пример. Множество точек границ треугольника и вписанного круга равномощны, т.к. можно построить биекцию из центра.

ТУТ ПРОПУЩЕНА ЛЕКЦИЯ. ДОСАДНО.

1.2. Об операциях над мощностями

Если хотим сложить множества (мощности), то нам нужна мощность следующего множества

$$A \times \{0\} \cup B \times \{1\}$$

О корректности — если выбирать разные множества одной мощности, то можно построить биекцию и не париться.

Очевидным образом коммутативны.

Произведение мощностей, ожидаемо, мощность произведения множеств.

С возведением в степень чуть сложнее: пусть $|A| = a, |B| = b$, то $a^b = |A^B|$, где последнее — множество всех функций, действующих из B в A .

Хотим проверить, что $A^{B \sqcup C} = A^B \times A^C$. Имеем $g : B \rightarrow A, h : C \rightarrow A$, и функция $f : B \cup C \rightarrow A$ взаимнооднозначно определяет g и h .

Теперь хотим проверить, что $(ab)^c = a^c \times b^c$. Слева имеем $\{f : C \rightarrow A \times B\}$, а справа $\{f : C \rightarrow A\} \times \{g : C \rightarrow B\}$. Но тогда заметим, что там условно у первых функций есть две координаты, мощно рассмотреть проекции на A и на B и всё будет ок.

Остаётся $(a^b)^c = a^{b \times c}$. По сути $a^{b \times c}$ это $\{f | f : B \times C \rightarrow A\}$. Что плюс-минус есть $f_c(x) = f(x, c)$ — как только мы фиксируем c , у нас c отображается в функцию f_c , которая в свою очередь есть функция $B \rightarrow A$, что и написано слева, ура.

Зачем же нам всё это? Ну допустим хотим узнать, чем разны ω^c (ω — мощность счётного множества, c — континуального). Т.е. это есть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$. Знаем, что $\omega^c \leq c^c = (2^\omega)^c = 2^{\omega \times c} \leq 2^{c \times c} = 2^c$, но, в свою очередь $\omega^c \geq 2^c$, т.е. искомое множество зажато между 2^c и 2^c .

Ну или ещё вариант — $c^\omega = (2^\omega)^\omega = 2^{\omega \times \omega} = 2^\omega = c$, но при этом $c^\omega \geq 2^\omega$, снова зажали.

2. Частично упорядоченные множества

2.1. Про отношение

Пусть есть множество A , и ввели отношение эквивалентности $R \subset A \times A$. Оно должно удовлетворять следующим аксиомам:

1. $a \in A, (a, a) \in R$ — рефлексивность
2. $a, b \in A, (a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R$ — симметричность
3. $a, b, c \in A, (a, b), (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$ — транзитивность

Это хорошо, но нам оно не нужно, мы хотим отношение порядка R' , оно должно удовлетворять следующим аксиомам:

1. $a \in A, (a, a) \in R$ — рефлексивность
2. $a, b \in A, (a, b) \in R, (b, a) \in R \rightarrow a = b$ — антисимметричность
3. $a, b, c \in A, (a, b), (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$ — транзитивность

Обычно для него используют значок, например \leq . Можно рисовать более закорючно, но мне влом.

Теперь про частично упорядоченное множество. Возьмём (X, \leq) , всё, получили ЧУМ. Простейшие примеры — натуральные, рациональные, действительные числа и операция меньше-или-равно. Можно взять тривиальное отношение — в нём находятся только пары вида (a, a) , $a \in X$, т.е. $a \leq b : a = b$. Ещё отношение порядка — рассмотрим 2^X , с отношением «являться подмножеством». Аксиомы, очевидно, выполняются.

Рассмотрим функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \leq g \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} f(x) \leq g(x)$. Тут уже явно видно, что бывают несравнимые элементы. Тут, например, это пары функций, у которых на первой половине первая больше второй, а на второй половине — вторая больше первой.

Можно строить по \leq и отношение строгого порядка $<$ — $x < y \Leftrightarrow x \leq y, x \neq y$. Его аксиомы:

1. $a \in A, (a, a) \notin R$ — антирефлексивность
2. $a, b, c \in A, (a, b), (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$ — транзитивность

А теперь давайте размножать ЧУМы.

Пусть X, Y — ЧУМы. Тогда можно строить:

1. $X \sqcup Y$ — внутри одной доли используется старое отношение, а элементы из разных долей просто несравнимы
2. $X + Y$ — считаем, что любой элемент $X \leq$ любого элемента Y . Пример — возьмём натуральные числа и ещё раз натуральные числа. Тогда $5 < 6 < \dots < 1' < 2'$, например.

3. $X \times Y$. Есть два варианта — покоординатно — $(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 \leq x_2$ И $y_1 \leq y_2$.
Второй вариант — лексикографически — $(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1 < x_2)$ ИЛИ $((x_1 = x_2) \text{ И } (y_1 \leq y_2))$

Определение 2.1. ЧУМ — линейный, если \forall два элемента сравнимы.

Определение 2.2. Максимальный элемент — тот, больше которого нет. Наибольший элемент — который больше либо равен всех остальных.

Рассмотрим все подмножества трёхэлементного множества $\{a, b, c\}$. Можно нарисовать картинку, как они расположены, но я пока не гений картинок. В общем, если x наибольший, то он максимальный. В обратную сторону далеко не всегда верно.

Определение 2.3. X, Y — ЧУМы, $\varphi : X \rightarrow Y$ — изоморфизм, тогда и только тогда, когда φ — биекция, и $a \leq b \Leftrightarrow \varphi(a) \leq \varphi(b)$

Пусть ещё пример — $k \leq n - k$ делитель n . И тут мы вспомним, что можно сужать порядок — резать его множество. Давайте сузим наш порядок на множество $\{1, 2, 3, 6\}$ — порядок делимости.

А ещё давайте рассмотрим $2^{<a,b>} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Можно показать, что оно изоморфно предыдущему множеству. Пример изоморфных есть, какие примеры не изоморфны?

Изоморфно ли \mathbb{N}, \leq и \mathbb{R}, \leq ? Нет, т.к. биекции точно нет. Изоморфно ли \mathbb{N}, \leq и \mathbb{Z}, \leq ? Нет, т.к. во втором множестве нет наименьшего элемента, а в первом — есть, а наименьший должен переходить в наименьший (выводится довольно понятно, как)

Изоморфно ли \mathbb{Z}, \leq и \mathbb{Q}, \leq ? Нет, т.к. давайте возьмём 0 и 1 из \mathbb{Z} и отображим их куда-либо, получили $\varphi(0), \varphi(1)$. Между ними где-то есть $\frac{\varphi(0)+\varphi(1)}{2}$. Подействуем на него φ^{-1} , получим, что прообраз должен жить в \mathbb{Z} между 0 и 1. Но там никого нет! Значит наше предположение о существовании биекции неверно.

Рассмотрим (\mathbb{Z}, \leq) и $(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}, \leq)$ Рассмотрим 0 и 0' во втором, между ними находится бесконечное число элементов. Но рассмотрев прообразы, это какие-то два целых, между ними вся бесконечность должна будет поместиться, но нет, т.к. между двумя целыми конечное число элементов.

Определение 2.4. x, y — соседние, есть $x \leq y$ и между x и y нет элементов и порядок линейный.

Определение 2.5. Линейный порядок называется плотным, если $\forall x, y, x < y \rightarrow \exists z : x < z < y$

Теорема 2.1. X, Y — ЧУМ, если они конечные ЧУМ с линейными порядками, то они изоморфны тогда и только тогда, когда $|X| = |Y|$.

Доказательство. Будем брать наименьшие элементы и попарно отображать их друг в друга и удалять. Отношение относительно минимальных и прочих сохраняется, а на меньшем можем построить дальше по индукции. А если размеры не равны, то мы умерли ещё на этапе биекции. \square

Замечание. Важна конечность! Для просто равномоощных бесконечных мы уже видели контр-примеры.

Теорема 2.2. X, Y — счётные ЧУы, имеют плотный и линейный порядок, и в X и Y нет наибольшего и наименьшего элементов, то X изоморфно Y . (такие ЧУМы существуют, например (\mathbb{Q}, \leq))

Доказательство. Выпишем подряд x_i, y_i . Отообразим x_1 в y_1 . А дальше есть x_2 , хотим отобразить куда-то. Отообразим x_2 в такой элемент, который относительно y_1 расположен так же, как x_2 расположен относительно y_1 . Такой найдётся, т.к. нет минимума и максимума. После этого аналогично поступим с y_2 (второй в выписанном списке игреков, если он ещё не взят). Затем так же поступим с x_3 , но теперь уже смотрим на отношения x_3 с x_1, x_2 . Это получится, т.к. нет минимума, максимума и ещё мы плотны. Затем на y_3 и т.д. \square

3. Высказывания

3.1. Высказывания

Начало пропущено, но оно простое.

Высказывание — утверждение, которое может быть ложным или истинным.

Тут был кек про Юрия Зайцева и про то, как из ложного утверждения следует всё, что угодно.

Определение 3.1. Пропозициональная переменная — произвольная переменная, обозначаем x, y, z , могут принимать значения 0 или 1

Определение 3.2. Формула:

1. Пропозициональная переменная является формулой
2. Если A — формула, то $\neg A$ — тоже формула (отрицание)
3. Если есть формулы A, B , то $(A \cap B), (A \cup B), (A \rightarrow B)$ — тоже формулы

Минимальный класс строк, удовлетворяющий * (предыдущей тройке утверждений), называется множеством формул.

Теперь хотим давать значения формулам. Для переменной значение формулы есть просто значение переменной. Отрицание работает как отрицание, логические операции работают согласно таблице истинности (которая очевидна)

Для отсутствия проблем с порядком вычисления у нас есть скобки.

Теорема 3.1. Любая формула допускает единственный разбор.

Доказательство. Когда у нас есть формула, мы однозначно попадаем в один из трёх вариантов. Формально говоря — посмотрим первый символ. Если это переменная, то мы завершаемся, если отрицание — отрицаем и убираем отрицание, если открывающая скобка — то в общем там можно найти операцию, в которой скобонный баланс равен единице и порвать по этой операции и уйти рекурсивно с двумя меньшими строками. \square

Определение 3.3. Тавтология — формула, истинная при любых значениях переменных. Например $x \cup \neg x$, или $(p \rightarrow q) \cup (q \rightarrow p)$

Определение 3.4. Две формулы F_1, F_2 эквивалентны, если F_1 истинно тогда и только тогда, когда F_2 истинно.

На самом деле F_1, F_2 эквивалентны тогда и только тогда, когда $(F_1 \rightarrow F_2) \wedge (F_2 \rightarrow F_1)$ является тавтологией

Определение 3.5. $A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

Теорема 3.2. Следующие формулы являются тавтологиями:

- $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p)$

- $((p \wedge q) \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r))$
- $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
- $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
- $p \vee (p \wedge q) \leftrightarrow p$
- $p \wedge (p \vee q) \leftrightarrow p$
- $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$
- $p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

Теорема 3.3. Пускай есть $f : B^n \rightarrow B$ (из битовых строк длины n в истину/ложь). Утверждение — любая такая f представляется используя \wedge, \vee и \neg , и, мало того, представляется в виде ДНФ: дизъюнктивно-нормальная формула.

Определение 3.6. Конъюнкт — $(x_{i1} \wedge x_{i2} \wedge \dots \wedge x_{ik})$ — набор логических И, возможно с отрицаниями.

Определение 3.7. ДНФ — дизъюнкция конъюнктов — набор конъюнктов, объединённых логическим ИЛИ.

Доказательство. Докажем предыдущую теорему.

Рассмотрим все наборы переменных и значения f на них (рассмотрим таблицу истинности f). Выберем строки, в которых $f = 1$, тогда возьмём переменные оттуда и составим из них конъюнкт — каждую переменную, если она со значением 0, то возьмём в конъюнкт её отрицание, а если со значением 1 — возьмём саму переменную. Тогда полученный конъюнкт будет верен только и только на этом наборе переменных.

Взяв все такие конъюнкты, на наборах переменных которых f истинна, и объединив их через логическое ИЛИ, получим как раз ДНФ, истинную только на тех наборах переменных, на которых была истинна f . \square

Пример. Если кто хочет — можете нарисовать тут таблицу истинности для формулы от трёх переменных и построить по ней описанным алгоритмом ДНФ.

Определение 3.8. КНФ — конъюнкция дизъюнктов — набор дизъюнктов (объединений переменных через \vee), объединённых через логическое И (выполняться должны все скобки).

Теорема 3.4. Для любой формулы можно построить КНФ. Строится аналогично, но выбираем строки с нулём.

КНФ/ДНФ не единственны, и построенные нами не обязательно минимальны.

Можно ли используя другие связки тоже выразить всё?

Давайте выразим всё через $1, \oplus, \wedge$.

Определение 3.9. Одночлен Жегалкина — $1, x, x \wedge y, x \wedge y \wedge w$

Определение 3.10. Многочлен Жегалкина: набор одночленов Жегалкина, объединённых \oplus

Теорема 3.5. Любая функция $f : B^n \rightarrow B$ допускает ровно одно представление в виде полинома Жегалкина.

Доказательство. Любой многочлен можно свести к многочлену Жегалкина: $x^2y \oplus xy \oplus xy = xy \oplus xy \oplus xy = xy$. Единственность — при использовании каждого одночлена не более раза.

Мы знаем, что используя \neg, \vee, \wedge можно записать все формулы. А сами эти операции можно выразить следующим образом: $\neg x = x \oplus 1; x \vee y = xy \oplus x \oplus y; x \wedge y = x \wedge y$. \square

Пример. Если сильно нужен — напишите, добавлю. Можете и сами добавить...

Единственность представления. У нас бывает 2^n одночленов (переменная или входит или не входит). Многочлен это набор одночленов, тогда многочленов 2^{2^n} , но и всех функций 2^{2^n} , и при этом каждой функции соответствует хотя-бы один многочлен, а тогда, т.к. функций столько же, сколько и многочленов, каждой функции соответствует ровно один многочлен. \square

Пусть у нас есть произвольная тернарная функция $f(x, y, z)$ и \wedge . Можем ли мы представить любую функцию таким интересным набором? Хотим иметь критерий на этот счёт.

Займёмся классами функций

Определение 3.11. Сохраняющие ноль функции — функция от всех нулей выдаёт ноль. Пример — тождественный ноль, логическое или.

Сохраняющие единицу функции — функция от всех единиц выдаёт единицу. Пример — тождественная единица, логическое или.

Отрицание не является ни сохраняющей единицу, ни сохраняющей ноль.

Монотонные функции — от увеличения (замены нуля на единицу) любого из параметров значение функции не уменьшается.

Линейные функции — те, для которых многочлен Жегалкина состоит только из \oplus переменных и единиц, иначе говоря, в многочлене Жегалкина которых нет слагаемых степени больше единицы.

Самодвойственные — отрицание всех переменных влечёт отрицание значения функции.

Пример. \wedge — сохраняющая ноль, сохраняющая единицу, монотонная, не самодвойственная функция.

Тождественная функция является самодвойственной.

Теорема 3.6 (Теорема Поста). Набор функций является полным (можно представить любую функцию) тогда и только тогда, когда для любого класса из пяти названных существует f_i , не лежащее в этом классе.

Доказательство. Если нет класса, в котором не лежит хотя-бы одна функция, то мы проиграли, т.к. не сможем выразить какую-либо функцию не из этого класса. Например, любая комбинация сохраняющих ноль/единицу функций тоже является сохраняющей ноль/единицу функцией, и тогда отрицание мы не выразим.

Аналогично с монотонностью — комбинация монотонных функций монотонна. Изменили увеличили какие-то переменные, функции, в которых они были могли только увеличиться, те функции, в которых эти функции как аргументы тоже могли только увеличиться и так далее... В общем, отрицание снова не получим.

Самодвойственность аналогичным образом проходит внутрь, к аргументам функций, которые если тоже функции, то отрицание тоже пройдёт внутрь и так далее, пока не проотрицаем все аргументы, что и есть самодвойственность.

И с линейностью так же будет, но в общем лекция закончилась, теорему доказать не успели. \square