

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

П.І.Б. Пацієнта: Лунін Артем Ігорович

Дата народження: 1975

Увага! Кожен пацієнт повинен зберігати результати МРТ та КТ досліджень та мати їх при собі у разі повторних обстежень.

На серії МР-томограм зважених за T1, T2, PD і в режимі STIR в стандартних проекціях, візуалізовані структури лівого колінного суглобу.

Стегново -великогомільковий суглоб:

- суглобовий хрящ медіальних виростків стегнової та великогомількової кісток - з розволокненням та роз'ятренням суглобового хряща в навантажувальних відділах;

- суглобовий хрящ латеральних виростків стегнової та великогомількової кісток - рівномірної товщини, однорідної структури.

Визначається нерівномірне звуження суглобової щілини з переважанням в медіальних відділах, з наявністю дрібних крайових кісткових розростань в зовнішніх відділах суглобових поверхонь стегнової, великогомількової кісток, зі склерозом кісткового мозку в субхондральних зонах.

Пателло-фemorальное зчленування: надколінник не зміщений (форма по Wiberg - II тип), розташований центрально, руйнування хряща на всю товщину по внутрішній та зовнішньої фасетках, з розвитком реактивних змін в підлягає кістки (набряк та кістоподібна в кістково-мозковій речовині надколінника). Суглобовий хрящ, що покриває передню поверхню стегнової кістки, рівномірний по товщині і інтенсивності МР-сигналу.

Медіальний меніск- в структурі заднього рогу меніска виявляється трикутної форми, неоднорідна ділянка підвищення МР-сигналу, не пов'язана з суглобовими поверхнями.

Латеральний меніск - відзначається зниження висоти тіла меніска, з наявністю в передньому і задньому рогах лінійних ділянок підвищеного МР-сигналу, що не поширюються до суміжних суглобових поверхонь.

Хрестоподібні, колатеральні зв'язки, бічні утримувачі і власна зв'язка надколінка без ознак ушкодження.

Ромбоподібне простір -відзначається незначна надмірна кількість синовіальної рідини в супрапателлярному просторі і бічних заворотах

Периартикулярні тканини - без особливостей.

Висновок: МР-ознаки дегенеративних змін обох менісків (медіального II ступеню, латерального II ступеню, по Stoller), на тлі ДООА лівого колінного суглобу з хондромаліацією медіального виростка стегнової кістки I-II- ступеню, медіального виростка великогомількової кістки I-II ступеню і надколінка IV ступеню (по Outerbridge). Синовіт лівого колінного суглобу.

Рек-но: консультація травматолога-ортопеда

До уваги пацієнтів: висновок не є остаточним діагнозом і вимагає подальшої консультації з лікарем, який надіслав на обстеження.

Дата: 30.05.2023 07:32

Лікар: Кондратенко Олександра Андріївна (Козака Бабури 9)

Рекомендовано повторне відвідування ☐ Не потребується

30.05.2023