

# 1. Описание

Рассмотрим следующую игру. Есть две платежные матрицы:

$$A^L(i, j) = \frac{1}{m} \begin{cases} \frac{i+j}{2}, & i < j \\ 0, & i = j \\ -\frac{i+j}{2}, & i > j \end{cases}$$

$$A^H(i, j) = \frac{1}{m} \begin{cases} \frac{i+j}{2} - m, & i < j \\ 0, & i = j \\ m - \frac{i+j}{2}, & i > j, \end{cases}$$

На первом шаге случай выбирает  $S \in \{H, L\}$ , причем вероятности выбора  $H$  и  $L$  равны  $p(H) = p$  и  $p(L) = (1 - p)$  соответственно. Первый игрок осведомлен о выборе случая, второй игрок знает только вероятностное распределение на  $\{H, L\}$ .

После этого на протяжении  $n \leq \infty$  шагов игроки играют в игру  $A^S$ .

Множество чистых стратегий первого и второго игроков  $i \in I = \{0, 1, \dots, m\}$ ,  $j \in J = \{0, 1, \dots, m\}$ .

Выигрыш каждого из игроков равен суммарному выигрышу за  $n$  шагов.

Для упрощения вычислений умножим платежные матрицы на  $2m$ :

$$A^L(i, j) = \begin{cases} i + j, & i < j \\ 0, & i = j \\ -i - j, & i > j \end{cases} \quad (1)$$

$$A^H(i, j) = \begin{cases} i + j - 2m, & i < j \\ 0, & i = j \\ 2m - i - j, & i > j \end{cases} \quad (2)$$

В дальнейшем будем рассматривать повторяющуюся игру именно с матрицами (1) и (2), которую назовем  $G_n^m(p)$ . При применении первым игроком смешанной стратегий  $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ ,

где  $\sigma_t = (\sigma_t^L, \sigma_t^H)$ , а вторым игроком смешанной стратегии  $\tau = (\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ , выигрыш равен

$$K_n^m(p, \sigma, \tau) = \sum_{t=1}^n \left( pA^H(\sigma_t^H, \tau_t) + (1-p)A^L(\sigma_t^L, \tau_t) \right). \quad (3)$$

## 2. Оценка сверху

Рассмотрим следующую чистую стратегию второго игрока  $\tau^k$ :

$$\begin{aligned} \tau_1^k &= k \\ \tau_t^k(i_{t-1}, j_{t-1}) &= \begin{cases} j_{t-1} - 1, & i_{t-1} < j_{t-1} \\ j_{t-1}, & i_{t-1} = j_{t-1} \\ j_{t-1} + 1, & i_{t-1} > j_{t-1} \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

**Утверждение 1.** При применении стратегии (4) в игре  $G_n^m(p)$  второй игрок может гарантировать себе выигрыш не более:

$$h_n^L(\tau^k) = \sum_{t=0}^{n-1} (2(k-t) - 1)^+, \quad (5)$$

$$h_n^H(\tau^k) = \sum_{t=0}^{n-1} (2(m-k-t) - 1)^+, \quad (6)$$

в состояниях  $L$  и  $H$  соответственно.

*Доказательство.* Проведем доказательство по индукции. Для  $h_n^L(\tau^k)$ :

$$h_1^L(\tau^k) = \max_{i \in I} a_{ik}^L = \max(0, 2k - 1).$$

Таким образом база индукции для  $h_n^L(\tau^k)$  проверена.

Пусть  $\forall t \leq n$  выполнено (5). Докажем, что (5) выполняется при  $t = n + 1$ .

$$h_{n+1}^L(\tau^k) = \max_{i \in I} (a_{ik}^L + h_n^L(\tau^{c(i)})),$$

где

$$c(i) = \begin{cases} k - 1, & i < k \\ k, & i = k \\ k + 1, & i > k. \end{cases}$$

Рассмотрим значение выигрыша в зависимости от действия  $i$  первого игрока:

- $i < k$ :

$$\begin{aligned} h_{n+1}^L(\tau^k) &= 2k - 1 + h_n^L(\tau^{k-1}) = \\ &= 2k - 1 + \sum_{t=0}^{n-1} (2(k - 1 - t) - 1)^+ = \\ &= \sum_{t=0}^n (2(k - t) - 1)^+ \end{aligned}$$

- $i = k$ :

$$h_{n+1}^L(\tau^k) = h_n^L(\tau^k) \leq \sum_{t=0}^n (2(k - t) - 1)^+.$$

- $i > k$ :

$$\begin{aligned} h_{n+1}^L(\tau^k) &= -2k - 1 + h_n^L(\tau^{k+1}) = \\ &= -2k - 1 + \sum_{t=-1}^{n-2} (2(k - t) - 1)^+ \\ &\leq \sum_{t=0}^n (2(k - t) - 1)^+. \end{aligned}$$

Индуктивный переход обоснован, и (5) доказано. Аналогично для (6).

$$h_1^H(\tau^k) = \max_{i \in I} a_{ik}^H = \max(0, 2(m - k) - 1).$$

База индукции для  $h_n^H(\tau^k)$  проверена. Пусть  $\forall t \leq n$  выполнено (6). Докажем, что (6) выполняется при  $t = n + 1$ .

$$h_{n+1}^H(\tau^k) = \max_{i \in I} (a_{ik}^H + h_n^H(\tau^{c(i)})).$$

- $i > k$ :

$$\begin{aligned}
h_{n+1}^H(\tau^k) &= 2m - 2k - 1 + h_n^H(\tau^{k-1}) = \\
&= 2(m - k) - 1 + \sum_{t=0}^{n-1} (2(m - k - 1 - t) - 1)^+ = \\
&= \sum_{t=0}^n (2(m - k - t) - 1)^+
\end{aligned}$$

- $i = k$ :

$$h_{n+1}^H(\tau^k) = h_n^H(\tau^k) \leq \sum_{t=0}^n (2(m - k - t) - 1)^+.$$

- $i < k$ :

$$\begin{aligned}
h_{n+1}^H(\tau^k) &= 2k - 1 - 2m + h_n^H(\tau^{k+1}) = \\
&= 2k - 1 - 2m + \sum_{t=-1}^{n-2} (2(m - k - t) - 1)^+ \\
&\leq \sum_{t=0}^n (2(m - k - t) - 1)^+.
\end{aligned}$$

Таким образом индуктивный переход обоснован и утверждение полностью доказано.  $\square$

Можно заметить, что при  $t > m$  значения (5) и (6) стабилизируются. Таким образом, справедливо следующее

**Утверждение 2.** Для значения бесконечной игры справедливо следующее неравенство:

$$V_{\infty}^m(p) \leq H^m(p) = \min_{j \in J} (p(m - j)^2 + (1 - p)j^2). \quad (7)$$

*Доказательство.*

$$\begin{aligned}
h_{m+1}^H(\tau^j) &= \sum_{t=0}^m (2(m-j-t) - 1)^+ = \\
&= (2 \cdot 0 - 1)^+ + (2 \cdot 1 - 1)^+ + \dots + (2(m-j) - 1)^+ = \\
&= (m-j)(m-j+1) - (m-j) = (m-j)^2 \\
h_{m+1}^L(\tau^j) &= \sum_{t=0}^m (2(j-t) - 1)^+ = \\
&= (2 \cdot 0 - 1)^+ + (2 \cdot 1 - 1)^+ + \dots + (2 \cdot j - 1)^+ = \\
&= j(j+1) - j = j^2 \\
H^m(p) &= \min_{j \in J} (ph_{m+1}^H(\tau^j) + (1-p)h_{m+1}^L(\tau^j)) \\
&= \min_{j \in J} (p(m-j)^2 + (1-p)j^2).
\end{aligned}$$

□

**Лемма 1.** *Функция  $H^m(p)$  является кусочно-линейной функцией, состоящей из  $m$  линейных сегментов, и полностью определяется своими значениями в следующих точках:*

$$\begin{aligned}
H^m(0) &= H^m(1) = 0, \\
H^m\left(\frac{k+1/2}{m}\right) &= \frac{m}{2} + mk - k^2 - k, \quad k = \overline{0, m-1}
\end{aligned}$$

*Доказательство.* Пусть  $\omega(j) = p(m-j)^2 + (1-p)j^2$ .

$$\omega'(j) = 2(j - pt), \quad \omega''(j) = 2.$$

Т.е. минимум  $\omega(j)$  достигается при  $j = pt$ . Тогда при  $p \in \left(\frac{k-1/2}{m}, \frac{k+1/2}{m}\right]$  минимум  $p(m-j)^2 + (1-p)j^2$  достигается при  $j = k$ . Таким образом, показано, что  $H^m(p)$  является кусочно-линейной функцией, которая полностью определяется своими значениями в точках  $p = \frac{k+1/2}{m}$ ,  $k = \overline{0, m-1}$ . Найдём значение

$H^m(p)$  при  $p = \frac{k+1/2}{m}$ :

$$\begin{aligned} H^m\left(\frac{k+1/2}{m}\right) &= \frac{1}{m} \left( (k+1/2)(m-k)^2 + (m-k-1/2)k^2 \right) = \\ &= \frac{1}{m} (m^2/2 + m^2k - mk^2 - mk) = \\ &= \frac{m}{2} + mk - k^2 - k. \end{aligned}$$

Лемма полностью доказана. □

### 3. Оценка снизу

Рассмотрим следующий шаг первого игрока  $\sigma_1^k = (\sigma^H, \sigma^L)$ , где  $\sigma^H = (\sigma_k^H, \sigma_{k+1}^H)$  и  $\sigma^L = (\sigma_k^L, \sigma_{k+1}^L)$ , а  $\sigma_i^S$  – вероятность сделать ставку равную  $i$  в состоянии  $S \in \{H, L\}$ . Т.е. при применении  $\sigma_1^k$  первый игрок делает ставки  $k$  и  $k+1$  с некоторыми заданными вероятностями.

Первый шаг можно также определить, если задать полные вероятности действий  $k$  и  $k+1$  равные  $q_k$  и  $q_{k+1}$ , а также апостериорные вероятности  $p(S|i)$  состояния  $S$ , если на первом шаге игрок сделал ставку  $i$ . При этом вероятности  $\sigma_i^S$  легко рассчитываются по формуле Байеса

$$\sigma_i^S = \frac{p(S|i)q_i}{p(S)}.$$

**Утверждение 3.** При использовании шага  $\sigma_1^k$  первый игрок гарантирует себе следующий одношаговый выигрыш:

$$K_1(p, \sigma_1^k, j) = \begin{cases} 2mp - j - k - q_{k+1}, & j < k, \\ 2mp(H|k+1)q_{k+1} - (2k+1)q_{k+1}, & j = k, \\ (2k+1)q_k - 2mp(H|k)q_k, & j = k+1, \\ j + k - 2mp + q_{k+1}, & j > k+1. \end{cases} \quad (8)$$

*Доказательство.*

$$K_1(p, \sigma_1^k, j) = pA^H(\sigma^H, j) + (1-p)A^L(\sigma^L, j). \quad (9)$$

Распишем одношаговый выигрыш в зависимости от значения  $j$  действия второго игрока и проведем нужные преобразования:



- $j < k$ :

$$\begin{aligned} A^H(\sigma^H, j) &= \sigma_k^H(2m - j - k) + \sigma_{k+1}^H(2m - j - k - 1) = \\ &= (2m - j - k) - \sigma_{k+1}^H, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^L(\sigma^L, j) &= \sigma_k^L(-j - k) + \sigma_{k+1}^L(-j - k - 1) = \\ &= -j - k - \sigma_{k+1}^L, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_1(p, \sigma_1^k, j) &= p(2m - j - k) - p\sigma_{k+1}^H + (1 - p)(-j - k) - (1 - p)\sigma_{k+1}^L = \\ &= 2mp - j - k - (p\sigma_{k+1}^H + (1 - p)\sigma_{k+1}^L) = \\ &= 2mp - j - k - q_{k+1}. \end{aligned}$$

- $j = k$ :

$$A^H(\sigma^H, j) = \sigma_{k+1}^H(2m - j - k - 1),$$

$$A^L(\sigma^L, j) = \sigma_{k+1}^L(-j - k - 1),$$

$$\begin{aligned} K_1(p, \sigma_1^k, j) &= 2mp\sigma_{k+1}^H - (2k + 1)q_{k+1} \\ &= 2mp(H|k + 1)q_{k+1} - (2k + 1)q_{k+1}. \end{aligned}$$

- $j = k + 1$ :

$$A^H(\sigma^H, j) = \sigma_k^H(2k + 1 - 2m),$$

$$A^L(\sigma^L, j) = \sigma_k^L(2k + 1),$$

$$\begin{aligned} K_1(p, \sigma_1^k, j) &= (2k + 1)q_k - 2mp\sigma_k^H \\ &= (2k + 1)q_k - 2mp(H|k)q_k. \end{aligned}$$

- $j > k + 1$ :

$$A^H(\sigma^H, j) = (j + k - 2m) + \sigma_{k+1}^H,$$

$$A^L(\sigma^L, j) = j + k + \sigma_{k+1}^L,$$

$$K_1(p, \sigma_1^k, j) = j + k - 2mp + q_{k+1}.$$

□

Пусть теперь при  $p = \frac{k+1/2}{m}$  и  $p = \frac{k+1}{m}$ , где  $k = \overline{0, m-1}$ , первый игрок делает шаг  $\sigma_1^k$ , такой что полные вероятности использования ставок  $k$  и  $k+1$  равны  $q_k = q_{k+1} = \frac{1}{2}$ , причем апостериорные вероятности, присваиваемые вторым игроком состоянию  $H$  равны  $p(H|k) = p - \frac{1}{2m}$  и  $p(H|k+1) = p + \frac{1}{2m}$ . Обозначим данный шаг через  $\sigma_{eq}^k$ .

**Утверждение 4.** В вышеописанных предположениях при использовании шага  $\sigma_{eq}^k$  первый игрок может гарантировать себе выигрыш в одношаговой игре не менее  $\frac{1}{2}$  при  $p = \frac{k+1/2}{m}$  и не менее 0 при  $p = \frac{k+1}{m}$ .

*Доказательство.* Подставив заданные  $q_k, q_{k+1}, p(H|k), p(H|k+1)$  в (8) получим при  $p = \frac{k+1/2}{m}$ :

- $j < k$ :  $K_1(p, \sigma_1^k, j) = k - j + \frac{1}{2} \geq 1\frac{1}{2}$ ;
- $j = k$ :  $K_1(p, \sigma_1^k, j) = \frac{1}{2}$ ;
- $j = k+1$ :  $K_1(p, \sigma_1^k, j) = \frac{1}{2}$ ;
- $j > k+1$ :  $K_1(p, \sigma_1^k, j) = 1\frac{1}{2}$ .

Аналогично для  $p = \frac{k+1}{m}$ :

- $j < k$ :  $K_1(p, \sigma_1^k, j) = 2\frac{1}{2}$ ;
- $j = k$ :  $K_1(p, \sigma_1^k, j) = 1$ ;
- $j = k+1$ :  $K_1(p, \sigma_1^k, j) = 0$ ;
- $j > k+1$ :  $K_1(p, \sigma_1^k, j) = \frac{1}{2}$ .

Таким образом утверждение полностью доказано. □

Заметим, что если  $p = \frac{k}{m}$  или  $p = \frac{k+1/2}{m}$ , то при применении  $\sigma_{eq}^k$  апостериорные вероятности на последующих шагах игры

всегда принадлежат множеству  $\left\{ \frac{i}{m}, \frac{j+1/2}{m}, \mid i \in \overline{0, m}, j \in \overline{1, m-1} \right\}$ . Таким образом, определив шаг первого игрока при любом значении апостериорной вероятности  $p$ , мы тем самым определим стратегию первого игрока для игры  $G_n^m(p)$  произвольной продолжительности.

В силу рекурсивной структуры игры  $G_n^m(p)$  можно выписать рекуррентную формулу для нижней оценки значения игры  $L_n^m(p)$  при  $p = \frac{k+1/2}{m}$  и  $p = \frac{k+1}{m}$ :

$$\begin{aligned} L_n^m \left( \frac{k + \frac{1}{2}}{m} \right) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left( L_{n-1}^m \left( \frac{k}{m} \right) + L_{n-1}^m \left( \frac{k+1}{m} \right) \right) \\ L_n^m \left( \frac{k+1}{m} \right) &= \frac{1}{2} \left( L_{n-1}^m \left( \frac{k + \frac{1}{2}}{m} \right) + L_{n-1}^m \left( \frac{k + \frac{3}{2}}{m} \right) \right) \\ L_n^m(0) &= L_n^m(1) = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Устремив  $n$  в бесконечность получим рекуррентную формулу для нижней оценки значения игры  $G_\infty^m(p)$ . Перепишем эту рекуррентную формулу в следующем виде:

$$\begin{aligned} L_0 &= 0 \\ L_{2k+1} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(L_{2k} + L_{2k+2}), \quad k = \overline{0, m-1} \\ L_{2k+2} &= \frac{1}{2}(L_{2k+1} + L_{2k+3}), \quad k = \overline{0, m-1} \\ L_{2m} &= 0. \end{aligned} \quad (11)$$

Введем следующее обозначение:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \left. \vphantom{\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}} \right\} (2m-1). \quad (12)$$

Тогда (11) можно переписать следующим образом:

$$\begin{aligned} AL &= b, \\ L_0 &= L_{2m} = 0, \end{aligned}$$

где  $L = (L_1, L_2, \dots, L_{2m-1})^T$ .

Известно, что системы  $Mx = F$  с трехдиагональной матрицей  $M$ , имеющей следующую структуру:

$$M = \begin{pmatrix} c_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & c_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n & c_n \end{pmatrix}$$

можно решать методом прогонки, используя следующие формулы для прогоночных коэффициентов и значения переменного:

$$\begin{aligned} x_i &= \alpha_{i+1}x_{i+1} + \beta_{i+1}, & x_n &= \frac{F_n - a_n\beta_n}{c_n + a_n\alpha_n} \\ \alpha_{i+1} &= -\frac{b_i}{c_i + a_i\alpha_i}, & \alpha_2 &= -\frac{b_1}{c_1} \\ \beta_{i+1} &= \frac{F_i - a_i\beta_i}{c_i + a_i\alpha_i}, & \beta_2 &= \frac{F_1}{c_1} \end{aligned} \quad (13)$$

Матрица  $A$  является трехдиагональной матрицей, в которой  $a_i = b_i = -\frac{1}{2}$ ,  $c_i = 1$ . В этом случае мы можем получить явные выражения для прогоночных коэффициентов и значения  $L$ .

**Утверждение 5.** Прогоночные коэффициенты для матрицы  $A$  выражаются следующим образом:

$$\alpha_i = \frac{i-1}{i} \quad (14)$$

$$\beta_{2i} = \frac{2i}{4}, \beta_{2i+1} = \frac{i^2}{2i+1} \quad (15)$$

*Доказательство.* Проведем доказательство по индукции.

Сначала для  $\alpha_i$ .  $\alpha_2 = \frac{1}{2}/1 = \frac{1}{2}$ . База индукции проверена. Пусть теперь  $\forall i \leq n$  справедливо (14). Докажем, что (14) справедливо при  $i = n + 1$ .

$$a_{n+1} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2} \frac{n-1}{n}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\frac{n+1}{2n}} = \frac{n}{n+1}.$$

Утверждение доказано для  $\alpha_i$ . Аналогично для  $\beta_i$ :  $\beta_2 = \frac{1}{2}$ ,  $\beta_3 = \frac{0+1/2 \cdot 1/2}{1-1/2 \cdot 1/2} = \frac{1}{3}$ . База индукции проверена. Пусть  $\forall i \leq n$  справедливо (15). Докажем, что (15) справедливо при  $i = n + 1$ .

$$\begin{aligned} \beta_{2(n+1)+1} &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{n^2}{2n+1}}{1 - \frac{1}{2} \frac{2n}{2n+1}} = \frac{1}{2} \frac{\frac{(n+1)^2}{2n+1}}{\frac{n+1}{2n+1}} = \frac{2(n+1)}{4} \\ \beta_{2(n+1)+1} &= \frac{\frac{1}{2} \frac{2(n+1)}{4}}{1 - \frac{1}{2} \frac{2n+1}{2(n+1)}} = \frac{n+1}{4} \cdot 2 \cdot \frac{2(n+1)}{2n+3} = \frac{(n+1)^2}{2n+3} \end{aligned}$$

Утверждение полностью доказано.  $\square$

Из утверждения 5 и соображений симметрии, мы можем найти значение  $L_{2m-1} = L_1$ . Действительно,

$$\begin{aligned} L_1 = L_{2m-1} &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{(m-1)^2}{2m-1}}{1 - \frac{1}{2} \frac{2m-1-1}{2m-1}} = \frac{2m-1 + (m-1)^2}{4m-2-2m+2} = \\ &= \frac{2m-1+m^2-2m+1}{2m} = \frac{m}{2}. \end{aligned} \quad (16)$$

Так как

$$L_{2(m+1)} = \frac{1}{2}(L_{2m+1} + L_{2(m+1)+1}),$$

то нам достаточно найти явный вид только для нечетных  $L_i$ . Из (13) и утверждения 5 мы получаем, что

$$\begin{aligned} L_{2i+1} &= \alpha_{2(i+1)}(\alpha_{2(i+1)+1}L_{2(i+1)+1} + \beta_{2(i+1)+1}) + \beta_{2(i+1)} = \\ &= \alpha_{2(i+1)}\alpha_{2(i+1)+1}L_{2(i+1)+1} + \alpha_{2(i+1)}\beta_{2(i+1)+1} + \beta_{2(i+1)} = \\ &= \frac{2i+1}{2i+3}L_{2i+3} + \frac{2(i+1)^2}{2i+3}. \end{aligned} \quad (17)$$

**Утверждение 6.** Решение (16), (17) дается следующей формулой:

$$L_{2k+1} = \frac{m}{2} + mk - k^2 - k. \quad (18)$$

*Доказательство.* Для простоты перепишем (16), (17) в следующем виде:

$$f_{k+1} = \frac{2k+3}{2k+1}f_k - \frac{2(k+1)^2}{2k+1}, \quad f_0 = \frac{m}{2}. \quad (19)$$

Решение этого конечно-разностного уравнения будем искать в следующем виде:

$$f(k) = f^*(k) + Cf^O(k),$$

где  $f^*(k)$  – частное решение неоднородного уравнения, а  $f^O(k)$  – решение однородного уравнения.

Сначала найдем  $f^O(k)$ . Для  $f^O(k)$  выполнено

$$\begin{aligned} f_1^O &= \frac{3}{1}f_0 \\ f_2^O &= \frac{5}{3}f_1 \\ &\dots \\ f_k^O &= \frac{2k+1}{2k-1}f_{k-1}^O \end{aligned}$$

Тогда  $f_k^O = (2k+1)f_0^O$  и можно положить  $f^O(k) = 2k+1$ .

Перейдем к поиску частного решения. Будем искать его в виде  $f^*(k) = ak^2 + bk + c$ . Тогда

$$\begin{aligned} &2k[a(k+1)^2 + b(k+1) + c - ak^2 - bk - c] + \\ &[a(k+1)^2 + b(k+1) + c - 3ak^2 - 3bk - 3c] = -2k^2 - 4k - 2 \\ &2ak^2 + 4ak + a + b - 2c = -2k^2 - 4k - 2 \end{aligned}$$

Положим  $a = -1$ ,  $b = -1$ ,  $c = 0$ . Тогда  $f^*(k) = -k^2 - k$ . Таким образом  $f(k) = -k^2 - k + C(2k+1)$ .

Из граничного условия найдем, что  $C = \frac{m}{2}$  и

$$f(k) = \frac{m}{2} + mk - k - k^2,$$

а значит

$$L_{2k+1} = \frac{m}{2} + mk - k - k^2.$$

Утверждение доказано.  $\square$

Таким образом функция  $L^m(p)$  определена при

$$p \in \left\{ \frac{i}{m}, \frac{j+1/2}{m}, \mid i = \overline{0, m}, j = \overline{0, m-1} \right\}.$$

Для того, чтобы определить эту функцию при  $p$  лежащих внутри соответствующих отрезком нам нужна стратегия, гарантирующая первому игроку выигрыш, лежащий на прямой, соединяющей крайние точки этих отрезком. Данная стратегия дается следующим утверждением.

**Утверждение 7.** *Рассмотрим следующие случаи:*

1. Пусть  $p^a = \frac{k}{m}$ ,  $p^b = \frac{k+1/2}{m}$ ,  $p \in (p^a, p^b)$ ,  $k = \overline{0, m-1}$ . Тогда определим первый шаг  $\sigma_{lot}^k$ , как  $\sigma_1^k$  с  $q_k = 2k + 1 - 2mp$ ,  $q_{k+1} = 2(pt - k)$ ,  $p(H|k) = \frac{k}{m}$ ,  $p(H|k+1) = \frac{k+1/2}{m}$ .
2. Пусть  $p^a = \frac{k+1/2}{m}$ ,  $p^b = \frac{k+1}{m}$ ,  $p \in (p^a, p^b)$ ,  $k = \overline{0, m-1}$ . Тогда определим первый шаг  $\sigma_{lot}^k$ , как  $\sigma_1^k$  с  $q_k = 2(k+1 - mp)$ ,  $q_{k+1} = 2mp - 2k - 1$ ,  $p(H|k) = \frac{k+1/2}{m}$ ,  $p(H|k+1) = \frac{k+1}{m}$ .

В обоих случаях шаг  $\sigma_{lot}^k$  гарантирует первому игроку неотрицательный одношаговый выигрыш. Если на последующих шагах игрок будет применять  $\sigma_{eq}^k$ , то он гарантирует себе выигрыш  $L^m(p)$ , лежащий на прямой, соединяющей  $L^m(p^a)$  и  $L^m(p^b)$ .

*Доказательство.* Проведем доказательство для случая 1. Доказательство для случая 2 проводится аналогично.

Из утверждения 3 подстановкой соответствующих переменных получаем:

- $j < k$ :  $K_1(p, \sigma_{lot}^k, j) = 2mp - j - k - 2mp + 2k = k - j \geq 1$ .
- $j = k$ :  $K_1(p, \sigma_{lot}^k, j) = 2m \frac{k+1/2}{m} q_{k+1} - (2k+1)q_{k+1} = 0$ .
- $j = k+1$ :  $K_1(p, \sigma_{lot}^k, j) = (2k+1)q_k - 2m \frac{k}{m} q_k = q_k > 0$ .
- $j > k+1$ :  $K_1(p, \sigma_{lot}^k, j) = j + k - 2mp + 2mp - 2k = j - k \geq 2$ .

Мы получили, что  $K_1(p, \sigma_{lot}^k, j) \geq 0$ .

Далее заметим, что после применения  $\sigma_{lot}^k$  апостериорные вероятности принадлежат множеству

$$\left\{ \frac{i}{m}, \frac{j+1/2}{m}, \mid i = \overline{0, m}, j = \overline{0, m-1} \right\}$$

. Это означает, что при применении на последующих шагах  $\sigma_{eq}^i$  игрок гарантирует себе  $L^m(p) = q_k L^m(p^a) + q_{k+1} L^m(p^b)$ . Из того, что

$$q_k = \frac{p^b - p}{p^b - p^a}, \quad q_{k+1} = \frac{p - p^a}{p^b - p^a}$$

следует, что  $L^m(p)$  лежит на прямой, соединяющей  $L^m(p^a)$  и  $L^m(p^b)$ . Доказательство закончено.  $\square$

**Лемма 2.** Функция  $L^m(p)$  является кусочно-линейной функцией, состоящей из  $m$  линейных сегментов, и полностью определяется своими значениями в следующих точках:

$$L^m(0) = L^m(1) = 0, \\ L^m\left(\frac{k+1/2}{m}\right) = \frac{m}{2} + mk - k^2 - k, \quad k = \overline{0, m-1}$$

*Доказательство.* Справедливость данной леммы непосредственно следует из утверждений 6 и 7.  $\square$



## 4. Значение игры $G_{\infty}^m(p)$

**Теорема 1.** *Игра  $G_{\infty}^m(p)$  имеет значение*

$$V_{\infty}^m(p) = L^m(p) = H^m(p).$$

*Оптимальная стратегия первого игрока  $\sigma^*$  описывается следующим образом: на каждом шаге игры при*

$$p \in \left\{ \frac{k+1/2}{m}, \frac{k+1}{m} \mid k = \overline{0, m-1} \right\}$$

*первый игрок применяет соответствующую  $\sigma_{eq}^k$ ; при*

$$p \in \left( \frac{k}{m}, \frac{k+1/2}{m} \right), k = \overline{0, m-1},$$

*или*

$$p \in \left( \frac{k+1/2}{m}, \frac{k+1}{m} \right), k = \overline{0, m-1},$$

*игрок применяет соответствующую  $\sigma_{lot}^k$ .*

*Оптимальная стратегия второго игрока  $\tau^*$  описывается следующим образом: при*

$$p \in \left( \frac{k-1/2}{m}, \frac{k+1/2}{m} \right]$$

*второй игрок применяет  $\tau^k$ .*

*Доказательство.* Непосредственно из лемм 1 и 2 следует, что  $\forall \sigma \in \Sigma, \tau \in T$ , где  $\Sigma$  и  $T$  – множество стратегий первого и второго игроков соответственно, справедливо

$$K_{\infty}^m(p, \sigma, \tau^*) \leq K_{\infty}^m(p, \sigma^*, \tau^*) = H^m(p) \leq K_{\infty}^m(p, \sigma^*, \tau).$$

А это значит, что  $\sigma^*$  и  $\tau^*$  – оптимальные стратегии, и значение игры  $V_{\infty}^m(p) = H^m(p)$ .  $\square$