

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

**Васильев Артем Викторович**  
**Выпускная квалификационная работа**

“Эволюционные особенности структуры гена  
*Nxf1* (nuclear export factor) у животных“

Научный руководитель:  
к.б.н., доцент, кафедра генетики и биотехнологии,  
Голубкова Елена Валерьевна

Рецензент:  
заведующая лабораторией, ведущий научный сотрудник,  
лаборатория эволюционной геномики и палеогеномики, ЗИН,  
к.б.н., с.н.с.,  
Абрамсон Наталья Иосифовна

Санкт-Петербург  
2025

## Оглавление

1	Материалы и методы .....	3
2	Результаты/Обсуждение .....	4
3	Таблицы с результатами .....	6
4	Графики и картинки с результатами.....	14
5	Список литературы .....	15

## Материалы и методы

В качестве материалов выступали нуклеотидные и белковые последовательности гена *Nxf1* из открытых баз данных NCBI [1]. Всего было проанализировано X видов, относящихся к разнообразным филогенетическим таксонам.

Поиск гена интереса для разведывательного анализа проводился внутри веб-сервиса NCBI [1].

Полученные данные в большинстве случаев анализировались с помощью пакета pandas v2.2.3 [2] для языка программирования Python v3.12.6 [3]. Большинство этапов последующего анализа реализовано в виде отдельных скриптов, разработанных в рамках данной работы, если не указано другое. Для логического разделения на блоки был использован Jupyter Notebook v1.1.1 [4].

Получение данных для определенных клад производилось с помощью пакета NCBI E-utilities из BioPython v1.85 [5] и NCBI Datasets Command-Line Interface (CLI) v18.0.2 [6]. Для увеличения выборок у конкретных таксономических групп был использован PSI-BLAST [7]. Парсинг результатов, полученных с помощью PSI-BLAST, осуществлялся пакетом BioPython [5] и специально разработанными скриптами. Множественные выравнивания проводились, используя алгоритм MAFFT [8] в программе Unipro UGENE v52.0 [9].

С помощью пакета инструментов MEME Suite v5.5.8 [10] проводился поиск консервативных мотивов внутри интрона. Найденные мотивы анализировались с помощью Tomtom [11] из того же пакета на базе данных Vertebrates (In vivo and in silico).

Построение вторичных структур РНК и выделение интересующих участков цветом осуществлялось локально с помощью инструмента RNAfold v2.7.0 из пакета ViennaRNA [12].

Анализ “силы сайтов сплайсинга” проводился локально в программе MaxEnt-Scan [13].

Филогенетический анализ включал построение деревьев с помощью IQ-TREE v2.4.0 [14] и их визуализацию, используя Figtree v1.4.4 [15].

Работа проводилась в виртуальном окружении Mamba v1.5.5 [16], использованные пакеты, их версии и примеры анализа в Jupyter Notebooks можно найти в GitHub [17] репозитории автора: <https://github.com/ArtemVaska/Diploma>.

Для написания ВКР была использована система верстки LaTeX v4.76 [18]. Все шаги анализа проводились на базе операционной системы Linux Ubuntu 22.04 [19].

## Результаты/Обсуждение

В качестве отправной точки был произведен поиск гена *Nxf1* внутри веб-сервиса NCBI [1]. Полученные данные были сохранены в текстовом формате и загружены в качестве tsv-таблицы с помощью пакета pandas [2] для языка программирования Python (версия 3.12) [3], всего был найден 651 ген для уникальных организмов, большинство из которых относятся к Deuterostomia (Вторичноротые). Большинство этапов последующего анализа реализовано в виде отдельных скриптов, разработанных в рамках данной работы, если не указано другое. Для логического разделения на блоки был использован Jupyter Notebook [4].

По данным из полученной таблицы в разведывательных целях было построено филогенетическое дерево исключительно для найденных генов. Грубое распределение организмов по филогенетическим группам отображено на Изображении 1 (TODO). Для глубокого анализа было принято решение сфокусироваться на организмах, относящихся к группе Protostomia (Первичноротые) за исключением Arthropoda (Членистоногие), которые были проанализированы в бакалаврской работе, а также на некоторых группах из Deuterostomia.

Для найденных организмов с помощью пакета NCBI E-utilities из BioPython [5] и NCBI Datasets Command-Line Interface (CLI) [6] были загружены нуклеотидные последовательности гена, кодирующих участков и мРНК, а также аминокислотные последовательности белка в формате FASTA и аннотации для гена в GenBank-формате, необходимые для получения нуклеотидных последовательностей экзонов и поиска “консервативной кассеты”. Затем были получены и проанализированы интересующие нас участки экзон-интрон-экзонной структуры и созданы файлы со всеми экзонами и “кассетным” интроном для всех организмов, у которых получилось найти “кассету”. Данные файлы будут необходимы для множественного выравнивания.

Учитывая очень маленькую выборку видов в каждой из анализируемых групп, было принято решение по увеличению их количества. Для этой цели, учитывая разнообразия полученных генов даже внутри одной таксономической группы, самым эффективным вариантом оказалось использование PSI-BLAST [7]. В качестве запроса (Query), или референса, использовались белковые последовательности тех организмов, у которых была найдена “кассета”. Для проведения PSI-BLAST были выбраны настройки по-умолчанию за исключением параметра Organism: поиск проводился внутри таксономической группы, к которой принадлежал референс, также референс был исключен из поиска.

Парсинг результатов BLAST также осуществлялся с помощью пакета BioPython [5] и специально разработанных скриптов. Он также включал в себя фильтрацию данных по параметрам процента покрытия (Query Coverage, QC), длине и сходству (Per. Ident) найденных хитов у Subject, а также загрузку нуклеотидных и белковых последовательностей, однако реализация отличалась из-за особенностей баз данных NCBI [1]. Получение “кассеты” было произведено по тому же принципу, но, опять

же, с отличиями. Благодаря данному шагу удалось увеличить выборки суммарно на 128 видов, не включая референсные, хотя изначально их было всего 17. К сожалению, для некоторых таксономических групп увеличение выборки оказалось невозможным технически в связи с отсутствием у некоторых организмов интересующего нас участка, т.к. непонятно, что в этом случае использовать в качестве референса. Множественные выравнивания осуществлялись с помощью алгоритма MAFFT [8] в программе Unipro UGENE [9].

Анализ видов из *Deuterostomia* изначально шел более благоприятно за счет большого сходства последовательностей, в том числе интронных, и большего количества видов в группах. Для них также были загружены все необходимые файлы и произведен поиск и анализ “консервативной кассеты“. Учитывая большую степень сходства интронных последовательностей, с помощью пакета инструментов MEME Suite [10] был произведен поиск консервативных мотивов внутри интрона. Найденные мотивы, у которых  $E\text{-value} < 0.05$  были проанализированы с помощью Tomtom [11] из того же пакета. Для описанного шага была взята база данных для позвоночных (TODO). Попытка того же рода анализа была произведена и для *Protostomia*, однако не увенчалась успехом в связи с отсутствием базы данных мотивов для этой таксономической группы.

Помимо всего перечисленного, с помощью инструмента RNAfold из пакета ViennaRNA [12] были построены вторичные структуры РНК для нуклеотидных последовательностей в двух вариантах (MFE и Centroid), содержащих экзоны и “кассетный интрон“, т.к. мы предполагаем, что избегание интроном сплайсинга может быть опосредовано образованной им специфической вторичной структурой. Также с помощью скриптов цветом были выделены интронные последовательности внутри вторичной структуры. Учитывая данное предположение, разумным шагом также являлся анализ “силы сайтов сплайсинга“, проведенный с помощью MaxEntScan [13].

Для некоторых групп организмов был проведен филогенетический анализ, включающий построение и визуализацию деревьев. Для данной цели использовались самые популярные и проверенные временем инструменты по данным из научных статей (TODO). Построение деревьев осуществлялось с помощью IQ-TREE 2 [14], визуализация - с помощью Figtree [15].

Работа проводилась в виртуальном окружении Mamba [16], использованные пакеты и примеры анализа в Jupyter Notebooks можно найти в GitHub [17] репозитории автора: <https://github.com/ArtemVaska/Diploma>.

Для написания ВКР была использована система верстки LaTeX [18].

## Таблицы с результатами

**Таблица 1:** Сводная таблица с характеристикой кассетного интрона для таксономической группы Actinopterygii. Сортировка по возрастанию количества нуклеотидов до стоп-кодона в кассетной интроне.

Название организма	Кол-во нуклеотидов до стоп-кодона в интроне	Длина 1-го экзона в кассете	Длина кассетного интрона	Длина 2-го экзона в кассете
<i>Chanos chanos</i>	1	110	3568	37
<i>Danio rerio</i>	1	110	3580	37
<i>Denticeps clupeioides</i>	7	110	2629	37
<i>Labrus bergylta</i>	10	110	2684	37
<i>Cottoperca gobio</i>	16	110	2388	37
<i>Xiphophorus couchianus</i>	22	110	2227	37
<i>Larimichthys crocea</i>	22	110	2340	37
<i>Lates calcarifer</i>	22	110	2434	37
<i>Notothenia coriiceps</i>	22	110	2886	37
<i>Betta splendens</i>	22	110	2274	37
<i>Poecilia reticulata</i>	22	110	2262	37
<i>Takifugu rubripes</i>	22	110	2114	37
<i>Salarias fasciatus</i>	22	110	3855	37
<i>Poecilia mexicana</i>	22	110	2247	37
<i>Stegastes partitus</i>	22	110	2900	37
<i>Clupea harengus</i>	22	110	3219	37
<i>Archocentrus centrarchus</i>	22	110	2644	37
<i>Esox lucius</i>	22	110	2848	37
<i>Monopterus albus</i>	22	110	2353	37
<i>Echeneis naucrates</i>	22	110	2314	37
<i>Paralichthys olivaceus</i>	22	110	3148	37
<i>Maylandia zebra</i>	22	110	2565	37
<i>Parambassis ranga</i>	22	110	2484	37
<i>Sander lucioperca</i>	22	110	2494	37
<i>Xiphophorus maculatus</i>	22	110	2231	37
<i>Nothobranchius furzeri</i>	22	110	2290	37
<i>Anabas testudineus</i>	22	110	2352	37
<i>Acanthochromis polyacanthus</i>	22	110	2797	37
<i>Anarrhichthys ocellatus</i>	22	110	2355	37
<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>	22	110	1702	37
<i>Sparus aurata</i>	22	110	2361	37
<i>Oryzias melastigma</i>	22	110	2212	37
<i>Seriola dumerili</i>	22	110	2494	37
<i>Poecilia formosa</i>	22	110	2259	37
<i>Oreochromis niloticus</i>	22	110	2580	37
<i>Kryptolebias marmoratus</i>	22	110	2556	37
<i>Xiphophorus hellerii</i>	22	110	2240	37
<i>Poecilia latipinna</i>	22	110	2261	37
<i>Pundamilia nyererei</i>	22	110	2527	37
<i>Hippocampus comes</i>	22	110	2622	37
<i>Oreochromis aureus</i>	22	110	2579	37
<i>Amphiprion ocellaris</i>	22	110	2752	37
<i>Seriola lalandi dorsalis</i>	22	110	2481	37
<i>Austrofundulus limnaeus</i>	22	110	2541	37
<i>Puntigrus tetrazona</i>	25	110	2440	37
<i>Fundulus heteroclitus</i>	25	110	2476	37
<i>Cyprinodon variegatus</i>	28	110	2533	37

<i>Haplochromis burtoni</i>	31	110	2535	37
<i>Astatotilapia calliptera</i>	31	110	2571	37
<i>Gouania willdenowi</i>	37	110	2616	37
<i>Oryzias latipes</i>	40	110	2331	37
<i>Sphaeramia orbicularis</i>	43	110	2376	37
<i>Pygocentrus nattereri</i>	46	110	2649	37
<i>Astyanax mexicanus</i>	46	110	2791	37
<i>Colossoma macropomum</i>	46	110	2644	37
<i>Ictalurus punctatus</i>	46	110	3166	37
<i>Tachysurus fulvidraco</i>	46	110	3493	37
<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>	46	110	3348	37
<i>Erpetoichthys calabaricus</i>	55	110	3662	37
<i>Perca flavescens</i>	58	110	2378	37
<i>Mastacembelus armatus</i>	64	110	2371	37
<i>Salmo salar</i>	67	110	3553	37
<i>Gadus morhua</i>	67	110	3151	37
<i>Etheostoma spectabile</i>	97	110	2457	37
<i>Scleropages formosus</i>	112	110	3412	37
<i>Myripristis murdjan</i>	112	110	2492	37
<i>Paramormyrops kingsleyae</i>	121	110	2929	37
<i>Carassius auratus</i>	148	110	3854	37
<i>Sinocyclocheilus grahami</i>	148	110	3330	37
<i>Sinocyclocheilus rhinoceros</i>	154	110	3449	37
<i>Sinocyclocheilus anshuiensis</i>	154	110	4202	37
<i>Electrophorus electricus</i>	283	110	2874	37

**Таблица 2:** Сводная таблица с характеристикой кассетного интрона для таксономической группы Amphibia. Сортировка по возрастанию количества нуклеотидов до стоп-кодона в кассетной интроне.

Название организма	Кол-во нуклеотидов до стоп-кодона в интроне	Длина 1-го экзона в кассете	Длина кассетного интрона	Длина 2-го экзона в кассете
Ambystoma mexicanum	1	110	10340	37
Pelobates fuscus	1	110	2424	37
Bufo bufo	7	110	3002	37
Bufo gargarizans	7	110	2879	37
Hyperolius riggenbachi	10	110	3902	37
Rana temporaria	10	110	3036	37
Pseudophryne corroboree	19	110	3561	37
Spea bombifrons	25	110	2840	37
Engystomops pustulosus	25	110	2004	37
Nanorana parkeri	25	110	3038	37
Hyla sarda	25	110	3029	37
Pyxicephalus adspersus	25	110	2917	37
Ranitomeya imitator	37	110	2650	37
Xenopus tropicalis	46	110	2596	37
Xenopus laevis	52	110	3791	37
Geotrypetes seraphini	55	110	3065	37
Rhinatrema bivittatum	103	110	4053	37
Pleurodeles waltl	151	110	3245	37
Microcaecilia unicolor	187	110	2784	37

**Таблица 3:** Сводная таблица с характеристикой кассетного интрона для таксономической группы Cnidaria. Сортировка по возрастанию количества нуклеотидов до стоп-кодона в кассетной интроне.

Название организма	Кол-во нуклеотидов до стоп-кодона в интроне	Длина 1-го экзона в кассете	Длина кассетного интрона	Длина 2-го экзона в кассете
<i>Actinia tenebrosa</i>	10	116	173	37
<i>Dendronephthya gigantea</i>	10	116	328	37
<i>Nematostella vectensis</i>	25	116	991	37
<i>Montipora foliosa</i>	31	116	907	37
<i>Pocillopora verrucosa</i>	34	116	390	37
<i>Acropora digitifera</i>	40	116	670	37
<i>Acropora millepora</i>	40	116	682	37
<i>Acropora muricata</i>	40	116	679	37
<i>Pocillopora damicornis</i>	46	116	392	37
<i>Pocillopora meandrina</i>	46	116	392	37
<i>Porites lutea</i>	61	116	711	37
<i>Porites evermanni</i>	61	116	711	37
<i>Ecaiptasia diaphana</i>	76	86	227	37
<i>Xenia sp. Carnegie-2017</i>	103	116	116	37

**Таблица 4:** Сводная таблица с характеристикой кассетного интрона для таксономической группы Ecdysozoa. Сортировка по возрастанию количества нуклеотидов до стоп-кодона в кассетной интроне.

Название организма	Кол-во нуклеотидов до стоп-кодона в интроне	Длина 1-го экзона в кассете	Длина кассетного интрона	Длина 2-го экзона в кассете
<i>Trichinella spiralis</i>	1	83	417	37
<i>Priapulius caudatus</i>	1	110	2114	37
<i>Galendromus occidentalis</i>	1	110	1491	37
<i>Ixodes scapularis</i>	1	110	3567	37
<i>Limulus polyphemus</i>	1	110	915	37
<i>Parasteatoda tepidariorum</i>	1	110	1725	37
<i>Cryptotermes secundus</i>	1	110	4335	37
<i>Maniola hyperantus</i>	1	110	920	37
<i>Cimex lectularius</i>	1	110	4437	37
<i>Vespa mandarinia</i>	1	113	379	37
<i>Zerene cesonia</i>	1	110	1162	37
<i>Pararge aegeria</i>	1	110	2657	37
<i>Myzus persicae</i>	1	107	772	37
<i>Halyomorpha halys</i>	1	110	7270	37
<i>Diuraphis noxia</i>	1	107	742	37
<i>Sipha flava</i>	1	107	58	37
<i>Manduca sexta</i>	1	110	1796	37
<i>Apis laboriosa</i>	1	113	1254	37
<i>Orussus abietinus</i>	1	113	74	37
<i>Danaus plexippus</i>	1	110	1009	37
<i>Colletes gigas</i>	1	113	379	37
<i>Ostrinia furnacalis</i>	1	110	1946	37
<i>Vespa crabro</i>	1	113	381	37
<i>Venturia canescens</i>	1	113	621	37
<i>Papilio polytes</i>	1	110	1674	37
<i>Vespa velutina</i>	1	113	377	37



<i>Cephus cinctus</i>	1	113	75	37
<i>Bombus pyrosoma</i>	1	113	244	37
<i>Papilio ruthus</i>	1	110	999	37
<i>Vanessa tameamea</i>	1	110	2352	37
<i>Megalopta genalis</i>	1	113	373	37
<i>Vespula pensylvanica</i>	1	113	363	37
<i>Leptopilina heterotoma</i>	1	113	921	37
<i>Acromyrmex echinator</i>	1	113	438	37
<i>Aphidius gifuensis</i>	1	113	240	37
<i>Polistes fuscatus</i>	1	113	400	37
<i>Dirofilaria immitis</i>	7	98	248	37
<i>Odontomachus brunneus</i>	10	113	498	37
<i>Diploscapter pachys</i>	10	110	662	37
<i>Bactrocera dorsalis</i>	13	110	1808	37
<i>Drosophila melanogaster</i>	13	110	1602	37
<i>Ceratitis capitata</i>	19	110	2023	37
<i>Pediculus humanus corporis</i>	19	110	631	37
<i>Aphelenchoides avenae</i>	19	110	441	37
<i>Litomosoides sigmodontis</i>	19	110	242	37
<i>Acanthocheilonema viteae</i>	19	110	225	37
<i>Aethina tumida</i>	19	110	1729	37
<i>Lepeophtheirus salmonis</i>	22	110	1555	37
<i>Anoplophora glabripennis</i>	22	110	3664	37
<i>Varroa jacobsoni</i>	22	110	3077	37
<i>Varroa destructor</i>	22	110	3077	37
<i>Thelazia callipaeda</i>	25	110	209	37
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	25	110	638	37
<i>Acyrtosiphon pisum</i>	28	107	68	37
<i>Anisakis simplex</i>	30	219	665	37
<i>Tetranychus urticae</i>	31	122	648	37
<i>Homarus americanus</i>	31	110	9821	37
<i>Bursaphelenchus okinawaensis</i>	37	110	593	37
<i>Globodera pallida</i>	43	113	47	37
<i>Amphibalanus amphitrite</i>	73	110	369	37
<i>Cotesia glomerata</i>	73	116	236	37
<i>Caenorhabditis angaria</i>	79	110	96	37
<i>Onchocerca ochengi</i>	88	110	243	37
<i>Brugia pahangi</i>	91	110	232	37
<i>Ditylenchus destructor</i>	97	307	1167	37
<i>Mesorhabditis belari</i>	97	110	147	37
<i>Melanaphis sacchari</i>	97	107	71	37
<i>Enterobius vermicularis</i>	100	110	195	37
<i>Pristionchus mayeri</i>	103	110	131	37
<i>Cercopithifilaria johnstoni</i>	103	110	238	37
<i>Steinernema carpocapsae</i>	106	110	131	37
<i>Wuchereria bancrofti</i>	106	125	242	37
<i>Parelaphostrongylus tenuis</i>	112	110	228	37
<i>Toxocara canis</i>	115	110	1062	37
<i>Necator americanus</i>	136	110	243	37
<i>Brugia malayi</i>	139	110	243	37
<i>Caenorhabditis auriculariae</i>	145	110	156	37
<i>Auanema sp. JU1783</i>	145	110	80	37
<i>Pristionchus entomophagus</i>	151	110	154	37
<i>Steinernema hermaphroditum</i>	157	110	131	37
<i>Caenorhabditis brenneri</i>	175	110	130	37
<i>Angiostrongylus cantonensis</i>	181	110	213	37
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	190	110	832	37
<i>Caenorhabditis elegans</i>	193	110	106	37

<i>Cooperia oncophora</i>	205	110	215	37
<i>Caenorhabditis</i> sp. 36 PRJEB53466	205	110	133	37
<i>Caenorhabditis nigoni</i>	214	110	142	37
<i>Pristionchus pacificus</i>	214	110	251	37
<i>Trichostrongylus colubriformis</i>	214	110	224	37
<i>Caenorhabditis briggsae</i>	217	110	145	37
<i>Cylicocyclus nassatus</i>	229	110	239	37
<i>Haemonchus contortus</i>	304	110	220	37
<i>Caenorhabditis bovis</i>	316	110	235	37
<i>Nippostrongylus brasiliensis</i>	316	110	235	37
<i>Dracunculus medinensis</i>	334	110	122	37
<i>Mesorhabditis spiculigera</i>	376	110	173	37
<i>Pollicipes pollicipes</i>	436	110	367	37
<i>Rhopalosiphum maidis</i>	1345	107	69	37

**Таблица 5:** Сводная таблица с характеристикой кассетного интрона для таксономической группы Lepidosauria. Сортировка по возрастанию количества нуклеотидов до стоп-кодона в кассетной интроне.

Название организма	Кол-во нуклеотидов до стоп-кодона в интроне	Длина 1-го экзона в кассете	Длина кассетного интрона	Длина 2-го экзона в кассете
<i>Python bivittatus</i>	1	110	2374	37
<i>Notechis scutatus</i>	1	110	2507	37
<i>Pseudonaja textilis</i>	1	110	2519	37
<i>Anolis sagrei</i>	1	110	4667	37
<i>Pituophis catenifer annectens</i>	1	110	2420	37
<i>Lacerta agilis</i>	1	110	2499	37
<i>Candoia aspera</i>	1	110	2293	37
<i>Sphaerodactylus townsendi</i>	1	110	2825	37
<i>Thamnophis elegans</i>	1	110	2426	37
<i>Ahaetulla prasina</i>	1	110	2432	37
<i>Gekko japonicus</i>	1	110	2924	37
<i>Crotalus tigris</i>	1	110	3091	37
<i>Pogona vitticeps</i>	1	110	2746	37
<i>Podarcis raffonei</i>	1	110	2495	37
<i>Protobothrops mucrosquamatus</i>	1	110	3264	37
<i>Varanus komodoensis</i>	1	110	2658	37
<i>Pantherophis guttatus</i>	1	110	2411	37
<i>Elgaria multicarinata webbiai</i>	1	110	2800	37
<i>Rhineura floridana</i>	1	110	2581	37
<i>Podarcis muralis</i>	1	110	2506	37
<i>Heteronotia binoei</i>	1	110	3002	37
<i>Anolis carolinensis</i>	1	110	4026	37
<i>Erythrolamprus reginae</i>	1	110	2638	37
<i>Sceloporus undulatus</i>	1	110	2380	37
<i>Eublepharis macularius</i>	1	110	2577	37
<i>Euleptes europaea</i>	1	110	2901	37
<i>Hemicordylus capensis</i>	1	110	2830	37
<i>Zootoca vivipara</i>	1	110	2516	37

**Таблица 6:** Сводная таблица с характеристикой кассетного интрона для таксономической группы Sauropsida. Сортировка по возрастанию количества нуклеотидов до стоп-кодона в кассетной интроне.

Название организма	Кол-во нуклеотидов до стоп-кодона в интроне	Длина 1-го экзона в кассете	Длина кассетного интрона	Длина 2-го экзона в кассете
<i>Molothrus aeneus</i>	1	110	745	37
<i>Taeniopygia guttata</i>	1	110	443	37
<i>Lonchura striata</i>	1	110	629	37
<i>Gallus gallus</i>	7	110	1616	37
<i>Cygnus atratus</i>	25	110	1257	37
<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	25	110	1375	37
<i>Phalacrocorax carbo</i>	25	110	1345	37
<i>Grus americana</i>	25	110	1659	37
<i>Haliaeetus albicilla</i>	25	110	1378	37
<i>Oxyura jamaicensis</i>	25	110	1246	37
<i>Anser cygnoides</i>	25	110	1279	37
<i>Ciconia boyciana</i>	25	107	1459	37
<i>Anas acuta</i>	25	110	1346	37
<i>Astur gentilis</i>	25	110	1393	37
<i>Aquila chrysaetos chrysaetos</i>	25	110	1375	37
<i>Aythya fuligula</i>	25	110	1227	37
<i>Struthio camelus</i>	64	110	1405	37
<i>Chelonia mydas</i>	79	110	1674	37
<i>Dermochelys coriacea</i>	79	110	1661	37
<i>Caretta caretta</i>	79	110	1656	37
<i>Ammospiza caudacuta</i>	82	110	3942	37
<i>Aphelocoma coerulescens</i>	85	110	3626	37
<i>Gopherus flavomarginatus</i>	142	110	1655	37
<i>Chelonoidis abingdonii</i>	142	110	1645	37
<i>Malaclemys terrapin pileata</i>	142	110	1652	37
<i>Mauremys mutica</i>	142	110	1662	37
<i>Mauremys reevesii</i>	142	110	1661	37
<i>Trachemys scripta elegans</i>	142	110	1661	37
<i>Chrysemys picta bellii</i>	142	110	1662	37
<i>Emys orbicularis</i>	142	110	1650	37
<i>Alligator sinensis</i>	148	110	1497	37
<i>Alligator mississippiensis</i>	148	110	1618	37
<i>Caloenas nicobarica</i>	184	110	1245	37
<i>Rissa tridactyla</i>	205	110	1388	37
<i>Terrapene triunguis</i>	211	110	1662	37
<i>Emydura macquarii macquarii</i>	223	110	1647	37
<i>Catharus ustulatus</i>	241	110	3252	37
<i>Gopherus evgoodei</i>	301	110	1639	37
<i>Strigops habroptila</i>	457	110	1317	37
<i>Neopsephotus bourkii</i>	502	110	1245	37
<i>Melopsittacus undulatus</i>	517	110	1257	37
<i>Apteryx rowi</i>	541	110	1359	37
<i>Apteryx mantelli</i>	541	110	1359	37
<i>Dromaius novaehollandiae</i>	553	110	1365	37
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	562	110	1373	37
<i>Pezoporus wallicus</i>	568	110	1328	37
<i>Pezoporus flaviventris</i>	568	110	1328	37
<i>Rhea pennata</i>	568	110	1348	37
<i>Pezoporus occidentalis</i>	568	110	1319	37
<i>Pelodiscus sinensis</i>	640	110	1643	37


<i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	892	110	2155	37
<i>Camarhynchus parvulus</i>	1360	110	2456	37
<i>Vidua chalybeata</i>	1519	110	678	37

**Таблица 7:** Сводная таблица с характеристикой кассетного интрона для таксономической группы Spiralia. Сортировка по возрастанию количества нуклеотидов до стоп-кодона в кассетной интроне.


Название организма	Кол-во нуклеотидов до стоп-кодона в интроне	Длина 1-го экзона в кассете	Длина кассетного интрона	Длина 2-го экзона в кассете
<i>Schistosoma haematobium</i>	1	239	652	37
<i>Magallana gigas</i>	1	110	1537	37
<i>Mya arenaria</i>	1	110	1727	37
<i>Crassostrea virginica</i>	1	110	1613	37
<i>Aplysia californica</i>	1	221	4146	37
<i>Gigantopelta aegis</i>	1	110	1869	37
<i>Mercenaria mercenaria</i>	1	110	1690	37
<i>Dreissena polymorpha</i>	1	110	2207	37
<i>Ruditapes philippinarum</i>	1	110	1646	37
<i>Mactra antiquata</i>	1	110	2319	37
<i>Mytilus coruscus</i>	1	110	1234	37
<i>Potamilus streckersoni</i>	1	110	4567	37
<i>Saccostrea echinata</i>	1	110	1556	37
<i>Mytilus edulis</i>	1	110	1360	37
<i>Mytilus trossulus</i>	1	110	1357	37
<i>Pecten maximus</i>	1	110	5000	37
<i>Ostrea edulis</i>	1	110	1643	37
<i>Mizuhopecten yessoensis</i>	1	110	4836	37
<i>Saccostrea cucullata</i>	1	110	1706	37
<i>Ylistrum balloti</i>	1	110	4649	37
<i>Argopecten irradians</i>	1	110	5057	37
<i>Magallana angulata</i>	1	110	1534	37
<i>Mytilus californianus</i>	1	110	1248	37
<i>Pinctada imbricata</i>	1	110	4144	37
<i>Haliotis asinina</i>	1	110	2375	37
<i>Sinanodonta woodiana</i>	1	110	4580	37
<i>Haliotis cracherodii</i>	1	110	2506	37
<i>Haliotis rufescens</i>	1	110	2505	37
<i>Patella caerulea</i>	1	110	1362	37
<i>Patella vulgata</i>	1	110	1384	37
<i>Lymnaea stagnalis</i>	1	221	2705	37
<i>Batillaria attramentaria</i>	1	110	8614	37
<i>Schistosoma turkestanicum</i>	1	239	905	37
<i>Paragonimus westermani</i>	1	239	13971	37
<i>Pomacea canaliculata</i>	1	56	255	37
<i>Bradybaena similaris</i>	1	221	3811	37
<i>Elysia crispata</i>	1	221	8063	37
<i>Elysia chlorotica</i>	1	221	7182	37
<i>Bulinus truncatus</i>	1	221	1873	37
<i>Biomphalaria pfeifferi</i>	1	221	1885	37
<i>Biomphalaria glabrata</i>	1	221	1889	37
<i>Schistosoma guineensis</i>	1	239	652	37
<i>Schistosoma curassoni</i>	1	239	652	37
<i>Schistosoma bovis</i>	1	239	652	37
<i>Schistosoma margrebowiei</i>	1	239	650	37

<i>Schistosoma intercalatum</i>	1	239	652	37
<i>Schistosoma rodhaini</i>	1	239	671	37
<i>Schistosoma japonicum</i>	1	239	847	37
<i>Clonorchis sinensis</i>	1	242	6006	37
<i>Hydatigera taeniaeformis</i>	1	242	375	37
<i>Taenia crassiceps</i>	1	242	278	37
<i>Taenia asiatica</i>	1	242	480	37
<i>Heterobilharzia americana</i>	1	239	2163	37
<i>Trichobilharzia szidati</i>	1	239	1336	37
<i>Trichobilharzia regenti</i>	1	239	996	37
<i>Opisthorchis felineus</i>	1	242	14603	37
<i>Rodentolepis nana</i>	1	242	222	37
<i>Calicophoron daubneyi</i>	1	239	4214	37
<i>Taenia solium</i>	1	242	480	37
<i>Echinococcus granulosus</i>	1	242	521	37
<i>Fasciola hepatica</i>	1	239	2631	37
<i>Fasciola gigantica</i>	1	239	2581	37
<i>Schistosoma mattheei</i>	1	239	649	37
<i>Fasciolopsis buskii</i>	1	239	1303	37
<i>Dicrocoelium dendriticum</i>	1	239	2612	37
<i>Paragonimus heterotremus</i>	1	239	18219	37
<i>Hymenolepis diminuta</i>	1	242	224	37
<i>Solemya velum</i>	4	110	2071	37
<i>Littorina saxatilis</i>	19	218	6746	37

## Графики и картинки с результатами



**Рис. 1:** Количество видов, взятых в анализ для Protostomia+Cnidaria и Deuterostomia.



**Рис. 2:** Количество видов, взятых в анализ для Protostomia+Cnidaria и Deuterostomia.

## Список литературы

1. Database resources of the National Center for Biotechnology Information / E. W. Sayers, E. E. Bolton, J. R. Brister, [et al.] // *Nucleic Acids Research*. — 2022. — Vol. 50, no. D1. — P. D20–D26. — DOI: [10.1093/nar/gkab1112](https://doi.org/10.1093/nar/gkab1112). — URL: <https://doi.org/10.1093/nar/gkab1112>.
2. *McKinney W.* Data Structures for Statistical Computing in Python. — 2010.
3. *Python Software Foundation.* Python, Version 3.12. — 2023. — <https://www.python.org/downloads/release/python-3120/>.
4. Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows / T. Kluyver [et al.]. — 2016. — DOI: [10.3233/978-1-61499-649-1-87](https://doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-87). — URL: <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-87>.
5. Biopython: Freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics / P. J. A. Cock [et al.] // *Bioinformatics*. — 2009. — Vol. 25, no. 11. — P. 1422–1423. — DOI: [10.1093/bioinformatics/btp163](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp163). — URL: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp163>.
6. Exploring and retrieving sequence and metadata for species across the tree of life with NCBI Datasets / N. A. O’Leary [et al.] // *Scientific Data*. — 2024. — Vol. 11, no. 1. — P. 732. — DOI: [10.1038/s41597-024-03571-y](https://doi.org/10.1038/s41597-024-03571-y). — URL: <https://doi.org/10.1038/s41597-024-03571-y>.
7. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs / S. F. Altschul [et al.] // *Nucleic Acids Research*. — 1997. — Vol. 25, no. 17. — P. 3389–3402. — DOI: [10.1093/nar/25.17.3389](https://doi.org/10.1093/nar/25.17.3389). — URL: <https://doi.org/10.1093/nar/25.17.3389>.
8. *Katoh K., Standley D. M.* MAFFT multiple sequence alignment software version 7: improvements in performance and usability // *Molecular Biology and Evolution*. — 2013. — Vol. 30, no. 4. — P. 772–780. — DOI: [10.1093/molbev/mst010](https://doi.org/10.1093/molbev/mst010). — URL: <https://doi.org/10.1093/molbev/mst010>.
9. Unipro UGENE: a unified bioinformatics toolkit / K. Okonechnikov [et al.] // *Bioinformatics*. — 2012. — Vol. 28, no. 8. — P. 1166–1167. — DOI: [10.1093/bioinformatics/bts091](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts091). — URL: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts091>.
10. The MEME Suite / T. L. Bailey [et al.] // *Nucleic Acids Research*. — 2015. — Vol. 43, W1. — W39–W49. — DOI: [10.1093/nar/gkv416](https://doi.org/10.1093/nar/gkv416). — URL: <https://doi.org/10.1093/nar/gkv416>.
11. Quantifying similarity between motifs / S. Gupta [et al.] // *Genome Biology*. — 2007. — Vol. 8, no. 2. — R24. — DOI: [10.1186/gb-2007-8-2-r24](https://doi.org/10.1186/gb-2007-8-2-r24). — URL: <https://doi.org/10.1186/gb-2007-8-2-r24>.

12. ViennaRNA Package 2.0 / R. Lorenz [et al.] // Algorithms for Molecular Biology. — 2011. — Vol. 6, no. 1. — P. 26. — DOI: [10.1186/1748-7188-6-26](https://doi.org/10.1186/1748-7188-6-26). — URL: <https://doi.org/10.1186/1748-7188-6-26>.
13. Yeo G., Burge C. B. Maximum entropy modeling of short sequence motifs with applications to RNA splicing signals // Bioinformatics. — 2004. — Vol. 20, no. 3. — P. 327–335. — DOI: [10.1093/bioinformatics/btg005](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btg005). — URL: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btg005>.
14. IQ-TREE 2: New Models and Efficient Methods for Phylogenetic Inference in the Genomic Era / B. Q. Minh [et al.] // Molecular Biology and Evolution. — 2020. — Vol. 37, no. 5. — P. 1530–1534. — DOI: [10.1093/molbev/msaa015](https://doi.org/10.1093/molbev/msaa015). — URL: <https://doi.org/10.1093/molbev/msaa015>.
15. Rambaut A. FigTree v1.4.4. — 2018. — Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh. <http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/>.
16. QuantStack, contributors mamba. Mamba: The Fast Cross-Platform Package Manager. — 2024. — <https://github.com/mamba-org/mamba>.
17. GitHub, Inc. GitHub. — 2008. — URL: <https://github.com>.
18. Lamport L. LaTeX: A Document Preparation System. — 2nd ed. — Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, 1994.
19. Canonical Ltd. Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish). — 2022. — <https://releases.ubuntu.com/22.04/>.