

## Содержание

1	§1. Производящие функции	2
---	--------------------------	---

# 1 §1. Производящие функции

## Definition 1.1. Производящая функция

Пусть  $(a_n)_{n=0}^{\infty}$  – последовательность. Ее производящая функция – это формальный степенной ряд  $A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$

## Notation 1.1. Элементарные операции

1.  $A(t) \pm B(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) t^n$
2.  $c \in \mathbb{C} \Rightarrow c \cdot A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (ca_n) t^n$
3.  $A(t)B(t) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)t + \dots + (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \dots + a_n b_0)t^n + \dots$

## Definition 1.2. Свертка

Последовательность  $(c_n)_{n=0}^{\infty}$ , где  $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0$  называется сверткой последовательностей  $(a_n)_{n=0}^{\infty}$  и  $(b_n)_{n=0}^{\infty}$

## Remark 1.1.

Множество производящих функций образует коммутативное кольцо с единицей; векторное пространство над полем  $\mathbb{C}$

Вообще это называется коммутативная алгебра с единицей

## Definition 1.3. Композиция производящих функций

Пусть  $b_0 = 0$

$$A(B(t)) = a_0 + a_1 B(t) + a_2 B(t)^2 + \dots = a_0 + a_1 (b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3 + \dots) + a_2 (b_1^2 t^2 + 2b_1 b_2 t^3 + \dots) + a_3 (b_1^3 t^3 + \dots) = a_0 + a_1 b_1 t + (a_1 b_2 + a_2 b_1) t^2 + (a_1 b_3 + 2a_2 b_1 b_2 + a_3 b_1^3) t^3$$

### Example 1.1.

$$A(-t) = a_0 - a_1 t + a_2 t^2 - a_3 t^3 + \dots$$

**Theorem 1.1.**

Пусть  $a_0 \neq 0$ . Тогда  $\exists! B(t)$ , т.ч.  $A(t)B(t) = 1$

*Доказательство:*

Ищем  $B(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots$

$$A(t)B(t) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)t + (a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2)t^2 + \dots = 1$$

$a_0 b_0 = 1 \Rightarrow$  находим  $b_0$

$$\underbrace{a_1 b_0}_{\text{знаем}} + a_0 b_1 = 0 \Rightarrow \text{находим } b_1$$

знаем

$$\underbrace{a_2 b_0 + a_1 b_1}_{\text{знаем}} + a_0 b_2 = 0 \Rightarrow \text{находим } b_2$$

И так далее ...

**Theorem 1.2.**

$b_0 = 0, b_1 \neq 0$ . Тогда  $\exists! A(t)$  и  $C(t)$ , т.ч.  $a_0 = c_0 = 0$  и  $A(B(t)) = B(C(t)) = t$

**Exercise 1.1.**

Доказать теорему 1.2.

**Definition 1.4. Производная**

$$A'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1}$$

$$t \cdot A'(t) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n t^n$$

**Definition 1.5. Первообразная**

$$\int A(t) dt = a_0 t + \frac{a_1}{2} t^2 + \frac{a_2}{3} t^3 + \dots$$

**Remark 1.2.**

$$(\int A(t) dt)' = A(t); \int A'(t) dt = A(t) - a_0$$

**Example 1.2.**

$$1. a_n \equiv 1 \Rightarrow A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$$

Пусть  $(b_n)_{n=0}^{\infty}$  – произвольная последовательность

$$c_n = \underbrace{b_0 + b_1 + \dots + b_n}_{\text{свертка послед. выше}}; C(t) = \frac{B(t)}{1-t}$$

$$2. e^t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t}; \sum_{n=0}^{\infty} n t^n = t \left( \frac{1}{1-t} \right)' = \frac{t}{(1-t)^2}$$

### Example 1.3. Числа Фиббоначи

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \Rightarrow F_{n+2}t^{n+2} = F_{n+1}t^{n+2} + F_nt^{n+2}$$

$$F(t) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n t^n; \quad \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} F_{n+2} t^{n+2}}_{F(t)-t} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1} t^{n+2}}_{t(\sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1} t^{n+1})=tF(t)} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} F_n t^{n+2}}_{t^2 F(t)}$$

$$F(t) - t = tF(t) + t^2 F(t)$$

$F(t) = \frac{t}{1-t-t^2}$  – производящая функция для чисел Фиббоначи

Корни знаменателя ( $t_2 + t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ );  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ;  $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$   
 $1 - t - t^2 = (1 - \varphi t)(1 - \psi t)$

Ищем разложение на простейшие  $\frac{t}{1-t-t^2} = \frac{A}{1-\varphi t} + \frac{B}{1-\psi t} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow t = A(1 - \psi t) + B(1 - \varphi t) \Leftrightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ A\psi + B\varphi = -1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} B = -A \\ A\psi - A\varphi = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{\varphi - \psi} = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ B = -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

Итого:  $F(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1}{1-\varphi t} - \frac{1}{1-\psi t} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \varphi^n t^n - \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n t^n \right)$

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \approx \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

### Notation 1.2. Как решать линейные рекуррентные соотношения?

$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + c_2 a_{n+k-2} + \dots + c_k a_n$ ; знаем  $a_0, a_1 \dots a_{k-1}$

$$A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$

$$a_{n+k} t^{n+k} = c_1 t a_{n+k-1} t^{n+k-1} + c_2 t^2 a_{n+k-2} t^{n+k-2} + \dots + c_k t^k a_n t^n$$

$$\text{Суммируем по } n = 0 : \quad \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k} t^{n+k}}_{A(t) - a_0 - a_1 t - \dots - a_{k-1} t^{k-1}} = c_1 t \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k-1} t^{n+k-1}}_{A(t) - a_0 - a_1 t - \dots - a_{k-2} t^{k-2}} + \dots + c_k t^k \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n}_{A(t)}$$

Получаем уравнение:  $(1 - c_1 t - c_2 t^2 - \dots - c_k t^k) A(t) = \underbrace{P(t)}_{\text{многочлен, знаем}}$

$A(t) = \frac{P(t)}{Q(t)}$  – рациональная функция

$$Q(t) = (1 - \alpha_1 t)^{r_1} (1 - \alpha_2 t)^{r_2} \dots (1 - \alpha_e t)^{r_e}$$

Раскладываем на простейшие вида  $\frac{1}{(1 - \alpha_s t)^m}$

$$\frac{1}{1 - \alpha_s t} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_s^n t^n$$

$$\frac{1}{(1 - \alpha_s t)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \alpha_s^n t^n$$