

Segunda Lista de Exercícios: Vetores no R

Exercício 1. Crie os seguintes vetores:

- (a) $(1, 2, 3, \dots, 19, 20)$;
- (b) $(20, 19, 18, \dots, 2, 1)$;
- (c) $(1, 2, 3, \dots, 19, 20, 19, 18, \dots, 2, 1)$;
- (d) $(0.1^3 0.2^1, 0.1^6 0.2^4, \dots, 0.1^{36} 0.2^{34})$;

Para os próximos itens, use a função `help` para descobrir o funcionamento da função `rep`.

- (d) $(4, 6, 3, 4, 6, 3, \dots, 4, 6, 3)$, em que há 10 ocorrências do número 4;
- (d) $(4, 6, 3, 4, 6, 3, \dots, 4, 6, 3, 4)$, em que há 11 ocorrências do número 4, 10 ocorrências do número 6 e 10 ocorrências do número 3;

Exercício 2. Crie um vetor cujas as entradas são dadas pelo valor de $e^x \cos(x)$ nos pontos $x = 3, 3.1, 3.2, 3.3, \dots, 6$.

Exercício 3. Calcule:

- (a) $\sum_{i=10}^{100} (i^3 + 4i^2)$;
- (b) $\sum_{i=10}^{25} \left(\frac{2^i}{i} + \frac{3^i}{i^2} \right)$.

Exercício 4. A função `sample` é utilizada para realizar sorteios de um dado conjunto. Exemplo: `sample(x = 1:5, size = 10, replace = TRUE)` sorteará 10 (`size = 10`) números do conjunto/vetor $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (`x = 1:5`) com reposição (`replace = TRUE`). Caso se deseje realizar um sorteio sem reposição deve-se utilizar `replace = FALSE`.

Execute as seguintes linhas de comando:

```
xVec <- sample(0:999, 250, replace=T)
yVec <- sample(0:999, 250, replace=T)
```

Suponha que `xVec` seja representado por (x_1, x_2, \dots, x_n) e que o vetor `yVec` seja representado por (y_1, x_2, \dots, y_n) em que $n = 250$.

- (a) Crie um vetor com as entradas ímpares de `xVec`;
- (b) Crie o vetor $(y_2 - x_1, \dots, y_n - x_{n-1})$;

- (c) Crie o vetor $\left(\frac{\text{sen}(y_2)}{\cos(x_1)}, \frac{\text{sen}(y_3)}{\cos(x_2)}, \dots, \frac{\text{sen}(y_{n-1})}{\cos(x_n)}\right)$
- (d) Crie o vetor $(x_1 + 2x_2 - x_3, x_2 + 2x_3 - x_4, \dots, x_{n-2} + 2x_{n-1} - x_n)$;
- (e) Calcule $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{e^{-x_{i+1}}}{x_i + 10}$.

Exercício 5. Este exercício ainda utilizará os vetores **xVec** e **yVec** definidos no Exercício 4. Tente utilizar, a seguir, algumas das seguintes funções: **sort**, **order**, **mean**, **sqrt**, **sum**, **abs**, **max**, **which**.

- (a) Quais são os índices do vetor **yVec** que correspondem a valores maiores do que 600?
- (b) Selecione os valores de **yVec** que sejam maiores do que 600.
- (c) Quais valores do vetor **xVec** correspondem as entradas do vetor **yVec** que são maiores do que 600?
- (d) Crie o vetor $(|x_1 - \bar{x}|^{1/2}, |x_2 - \bar{x}|^{1/2}, \dots, |x_n - \bar{x}|^{1/2})$, em que \bar{x} representa a média do vetor **xVec**.
- (e) Quantos valores do vetor **yVec** estão a uma distância de até 200 do valor máximo deste vetor?
- (f) Quantos números de **xVec** são divisíveis por 2?
- (g) Ordene os valores de **xVec** na ordem que deixa os valores de **yVec** crescentes.
- (h) Selecione os valores de **yVec** que estão nas posições 1, 4, 7, 10,...

Exercício 6. Calcule

$$1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5}\right) + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{6}{7}\right) + \dots + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5} \dots \frac{38}{39}\right)$$

Sugestão: a função **cumprod** pode ser útil.