

Sistema de Gestão e Escala de Anestesia

Indicadores de qualidade e segurança em anestesia

todo o período · sem filtros além do período

COBERTURA DO PERÍODO

Atendimentos com ficha	Fichas concluídas	Fichas com revisão clínica
18	14	3
Fichas incompletas	Itens sem resposta	Acompanhamentos em aberto
4	71	4

As definições clínicas destes indicadores ainda não foram aprovadas pelo responsável técnico de anestesiologia. Os limiares em uso são os padrão do sistema.

MORTALIDADE E MORBIDADE GRAVE

Indicador	Eventos	Elegíveis	Com informação	Sem informação	Taxa	Meta
Óbito em até 24 horas	0	18	15	3 (3 s/ acomp.)	0%	—
Óbito em até 48 horas	0	18	15	3 (3 s/ acomp.)	0%	—
Óbito em até 30 dias	0	18	7	11 (4 s/ acomp.)	0%	—
Parada cardiorrespiratória na sala cirúrgica	0	18	15	3	0%	—
Despertar intraoperatório com recordação explícita	0	15	13	2 (2 s/ acomp.)	0%	—
Disfunção neurológica perioperatória	0	18	15	3 (3 s/ acomp.)	0%	—
Intubação ou ventilação difícil	1	15	13	2	7,7%	—

COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS

Indicador	Eventos	Elegíveis	Com informação	Sem informação	Taxa	Meta
Intubação esofágica	0	13	13	0	0%	—
Broncoaspiração pulmonar perioperatória	0	18	15	3	0%	—
Reintubação não planejada em até 24 horas	0	13	13	0	0%	—
Hipoxemia intraoperatória	2	18	15	3	13,3%	—

COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES

Indicador	Eventos	Elegíveis	Com informação	Sem informação	Taxa	Meta
Hipotensão intraoperatória	4	18	15	3	26,7%	—
Hipertensão grave no intraoperatório	0	18	15	3	0%	—
Isquemia ou infarto do miocárdio perioperatório	0	18	15	3 (3 s/ acomp.)	0%	—
Vasopressor não planejado	2	18	15	3	13,3%	—

OUTROS DESFECHOS CLÍNICOS

Indicador	Eventos	Elegíveis	Com informação	Sem informação	Taxa	Meta
Náusea pós-operatória	4	18	15	3	26,7%	—
Vômito pós-operatório	2	18	15	3	13,3%	—
Dor forte na SRPA	2	18	15	3	13,3%	—
Hipotermia na chegada à SRPA	3	18	15	3	20%	—
Bloqueio neuromuscular residual	1	13	13	0	7,7%	—
Lesão de córnea	0	18	15	3	0%	—
Lesão relacionada ao posicionamento	0	18	15	3	0%	—

PROCESSO

Indicador	Eventos	Elegíveis	Com informação	Sem informação	Taxa	Meta
Checklist de segurança cirúrgica completo	13	18	15	3	86,7%	—
Capnografia contínua quando indicada	13	13	13	0	100%	—
Profilaxia antibiótica no tempo	13	15	15	0	86,7%	—
Monitorização de profundidade quando indicada	10	13	13	0	76,9%	—
Adesão ao protocolo de via aérea difícil	1	1	1	0	100%	—
Carrinho de via aérea difícil checado	15	18	15	3	100%	—
Avaliação pré-anestésica documentada e completa	13	18	15	3	86,7%	—
Medidas de prevenção de hipotermia	11	18	15	3	73,3%	—
Jejum pré-operatório adequado	15	18	15	3	100%	—
Monitorização neuromuscular quando há bloqueador	10	13	13	0	76,9%	—
Relação TOF adequada antes da saída	9	10	10	0	90%	—
Profilaxia de náusea e vômito quando indicada	13	15	15	0	86,7%	—
Passagem de cuidado registrada	15	18	15	3	100%	—
Pesquisa de satisfação aplicada	9	18	15	3	60%	—

DEFINIÇÕES E FÓRMULAS

Óbito em até 24 horas · Mortalidade e morbidade grave

Definição: Óbito do paciente em até 24 horas do término da anestesia, independentemente da causa. A relação com a anestesia é avaliação clínica registrada em separado, evento a evento.

Fórmula: óbitos em até 24 h ÷ atendimentos com acompanhamento de 24 h respondido × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Óbito em até 48 horas · Mortalidade e morbidade grave

Definição: Óbito do paciente em até 48 horas do término da anestesia.

Fórmula: óbitos em até 48 h ÷ atendimentos com acompanhamento de 48 h respondido × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Óbito em até 30 dias · Mortalidade e morbidade grave

Definição: Óbito do paciente em até 30 dias do procedimento.

Fórmula: óbitos em até 30 dias ÷ atendimentos com acompanhamento de 30 dias respondido × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Parada cardiorrespiratória na sala cirúrgica · Mortalidade e morbidade grave

Definição: Parada cardiorrespiratória ocorrida dentro da sala cirúrgica, com necessidade de manobras de reanimação.

Fórmula: paradas na sala ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Despertar intraoperatório com recordação explícita · Mortalidade e morbidade grave

Definição: Suspeita ou confirmação de despertar intraoperatório com recordação explícita, em anestesia geral.

Fórmula: casos suspeitos ou confirmados ÷ anestésias gerais com a pergunta respondida × 100

População elegível: Anestesia geral.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Disfunção neurológica perioperatória · Mortalidade e morbidade grave

Definição: Delirium, disfunção cognitiva, AVC, neuropatia periférica ou outra disfunção neurológica no perioperatório.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Intubação ou ventilação difícil · Mortalidade e morbidade grave

Definição: Dificuldade de intubação ou de ventilação, prevista ou não, com ou sem complicação associada.

Fórmula: casos ÷ anestésias gerais com a pergunta respondida × 100

População elegível: Anestesia geral.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Intubação esofágica · Complicações respiratórias

Definição: Intubação esofágica, com registro separado de reconhecimento imediato ou tardio.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com intubação traqueal e a pergunta respondida × 100

População elegível: Atendimentos com intubação traqueal.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Broncoaspiração pulmonar perioperatória · Complicações respiratórias

Definição: Broncoaspiração de conteúdo gástrico no perioperatório.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Reintubação não planejada em até 24 horas · Complicações respiratórias

Definição: Reintubação não planejada em até 24 horas do término da anestesia.

Fórmula: reintubações ÷ atendimentos com intubação e acompanhamento de 24 h respondido × 100

População elegível: Atendimentos com intubação traqueal.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Hipoxemia intraoperatória · Complicações respiratórias

Definição: Menor SpO2 registrada abaixo do limiar configurado, ou tempo acumulado abaixo dele maior que zero.

Fórmula: atendimentos com SpO2 mínima abaixo do limiar ÷ atendimentos com SpO2 mínima registrada × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Hipotensão intraoperatória · Complicações cardiovasculares

Definição: Menor PAM registrada abaixo do limiar configurado, ou tempo acumulado abaixo dele maior que zero.

Fórmula: atendimentos com PAM mínima abaixo do limiar ÷ atendimentos com PAM mínima registrada × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Hipertensão grave no intraoperatório · Complicações cardiovasculares

Definição: Episódio de hipertensão grave no intraoperatório, conforme o limiar configurado de PA sistólica.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Isquemia ou infarto do miocárdio perioperatório · Complicações cardiovasculares

Definição: Isquemia ou infarto do miocárdio no perioperatório, conforme critério diagnóstico registrado.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Vasopressor não planejado · Complicações cardiovasculares

Definição: Instabilidade hemodinâmica com necessidade de vasopressor não planejado.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Náusea pós-operatória · Outros desfechos clínicos

Definição: Náusea pós-operatória registrada na recuperação, separada do vômito.

Fórmula: atendimentos com náusea ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Vômito pós-operatório · Outros desfechos clínicos

Definição: Vômito pós-operatório registrado na recuperação, separado da náusea.

Fórmula: atendimentos com vômito ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Dor forte na SRPA · Outros desfechos clínicos

Definição: Pontuação de dor na SRPA acima do limiar configurado, na primeira avaliação registrada.

Fórmula: atendimentos com dor acima do limiar ÷ atendimentos com dor avaliada × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Hipotermia na chegada à SRPA · Outros desfechos clínicos

Definição: Temperatura na chegada à SRPA abaixo do limiar configurado.

Fórmula: atendimentos com temperatura abaixo do limiar ÷ atendimentos com temperatura medida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Bloqueio neuromuscular residual · Outros desfechos clínicos

Definição: Suspeita ou confirmação de bloqueio neuromuscular residual na recuperação.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com bloqueador neuromuscular e a pergunta respondida × 100

População elegível: Atendimentos com uso de bloqueador neuromuscular.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Lesão de córnea · Outros desfechos clínicos

Definição: Lesão de córnea identificada no perioperatório.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Lesão relacionada ao posicionamento · Outros desfechos clínicos

Definição: Lesão atribuída ao posicionamento cirúrgico, com tipo e localização registrados.

Fórmula: casos ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Checklist de segurança cirúrgica completo · Processo

Definição: Checklist de segurança cirúrgica realizado e registrado como completo nas três etapas.

Fórmula: atendimentos com checklist completo ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Capnografia contínua quando indicada · Processo

Definição: Uso de capnografia contínua nos atendimentos em que ela foi registrada como indicada.

Fórmula: atendimentos com capnografia utilizada ÷ atendimentos com capnografia indicada e uso respondido × 100

População elegível: Atendimentos com capnografia indicada.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Profilaxia antibiótica no tempo · Processo

Definição: Antibiótico administrado antes da incisão, dentro da janela configurada.

Fórmula: atendimentos com antibiótico dentro da janela ÷ atendimentos com profilaxia indicada e horários informados × 100

População elegível: Atendimentos com profilaxia antibiótica indicada.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Monitorização de profundidade quando indicada · Processo

Definição: Uso de monitorização de profundidade anestésica nos atendimentos em que o protocolo institucional a indica.

Fórmula: atendimentos com monitorização utilizada ÷ atendimentos com indicação e uso respondido × 100

População elegível: Atendimentos com indicação conforme protocolo institucional.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Adesão ao protocolo de via aérea difícil · Processo

Definição: Adesão ao protocolo institucional de via aérea difícil quando a dificuldade era prevista.

Fórmula: atendimentos com adesão ÷ atendimentos com via aérea difícil prevista e adesão respondida × 100

População elegível: Atendimentos com via aérea difícil prevista.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Carrinho de via aérea difícil checado · Processo

Definição: Carrinho de via aérea difícil disponível e checado antes do procedimento.

Fórmula: atendimentos com carrinho checado ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Avaliação pré-anestésica documentada e completa · Processo

Definição: Avaliação pré-anestésica documentada e registrada como completa.

Fórmula: atendimentos com avaliação completa ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Medidas de prevenção de hipotermia · Processo

Definição: Aquecimento ativo e monitorização de temperatura no intraoperatório. Conta como adesão quando os dois foram feitos.

Fórmula: atendimentos com aquecimento ativo e monitorização de temperatura ÷ atendimentos com as duas perguntas respondidas × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Jejum pré-operatório adequado · Processo

Definição: Tempo entre a última ingestão e o início da anestesia igual ou maior que o mínimo configurado para o tipo de alimento ou líquido informado.

Fórmula: atendimentos com jejum dentro do mínimo ÷ atendimentos com horário e tipo de ingestão informados × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Monitorização neuromuscular quando há bloqueador · Processo

Definição: Monitorização neuromuscular nos atendimentos com uso de bloqueador neuromuscular.

Fórmula: atendimentos com monitorização ÷ atendimentos com bloqueador e a pergunta respondida × 100

População elegível: Atendimentos com uso de bloqueador neuromuscular.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Relação TOF adequada antes da saída · Processo

Definição: Último valor da relação TOF igual ou acima do limiar configurado, nos atendimentos com monitorização neuromuscular.

Fórmula: atendimentos com TOF no limiar ÷ atendimentos com monitorização neuromuscular e TOF medido × 100

População elegível: Atendimentos com monitorização neuromuscular.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Profilaxia de náusea e vômito quando indicada · Processo

Definição: Profilaxia de náusea e vômito realizada quando indicada.

Fórmula: atendimentos com profilaxia realizada ÷ atendimentos com indicação e realização respondida × 100

População elegível: Atendimentos com profilaxia de náusea e vômito indicada.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Passagem de cuidado registrada · Processo

Definição: Registro da passagem de cuidado para SRPA ou UTI, com horário e profissionais identificados.

Fórmula: atendimentos com passagem registrada ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

Pesquisa de satisfação aplicada · Processo

Definição: Pesquisa de satisfação do paciente com a experiência anestésica aplicada e registrada.

Fórmula: atendimentos com pesquisa aplicada ÷ atendimentos com a pergunta respondida × 100

População elegível: Todos os atendimentos com ficha de qualidade.

Referência: nenhuma fonte normativa ou técnica registrada para este indicador

EVOLUÇÃO MÊS A MÊS

Óbito em até 24 horas: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)

Óbito em até 48 horas: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)

Óbito em até 30 dias: 2026-07: 0% (0/3) · 2026-08: 0% (0/4) · 2026-09: sem informação (0/0)

Parada cardiorrespiratória na sala cirúrgica: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)

Despertar intraoperatório com recordação explícita: 2026-07: 0% (0/3) · 2026-08: 0% (0/5) · 2026-09: 0% (0/5)

Disfunção neurológica perioperatória: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)
Intubação ou ventilação difícil: 2026-07: 0% (0/3) · 2026-08: 0% (0/5) · 2026-09: 20% (1/5)
Intubação esofágica: 2026-07: 0% (0/3) · 2026-08: 0% (0/5) · 2026-09: 0% (0/5)
Broncoaspiração pulmonar perioperatória: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)
Reintubação não planejada em até 24 horas: 2026-07: 0% (0/3) · 2026-08: 0% (0/5) · 2026-09: 0% (0/5)
Hipoxemia intraoperatória: 2026-07: 25% (1/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 20% (1/5)
Hipotensão intraoperatória: 2026-07: 50% (2/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 40% (2/5)
Hipertensão grave no intraoperatório: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)
Isquemia ou infarto do miocárdio perioperatório: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)
Vasopressor não planejado: 2026-07: 25% (1/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 20% (1/5)
Náusea pós-operatória: 2026-07: 25% (1/4) · 2026-08: 33,3% (2/6) · 2026-09: 20% (1/5)
Vômito pós-operatório: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 16,7% (1/6) · 2026-09: 20% (1/5)
Dor forte na SRPA: 2026-07: 25% (1/4) · 2026-08: 16,7% (1/6) · 2026-09: 0% (0/5)
Hipotermia na chegada à SRPA: 2026-07: 25% (1/4) · 2026-08: 16,7% (1/6) · 2026-09: 20% (1/5)
Bloqueio neuromuscular residual: 2026-07: 0% (0/3) · 2026-08: 0% (0/5) · 2026-09: 20% (1/5)
Lesão de córnea: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)
Lesão relacionada ao posicionamento: 2026-07: 0% (0/4) · 2026-08: 0% (0/6) · 2026-09: 0% (0/5)
Checklist de segurança cirúrgica completo: 2026-07: 75% (3/4) · 2026-08: 83,3% (5/6) · 2026-09: 100% (5/5)
Capnografia contínua quando indicada: 2026-07: 100% (3/3) · 2026-08: 100% (5/5) · 2026-09: 100% (5/5)
Profilaxia antibiótica no tempo: 2026-07: 75% (3/4) · 2026-08: 83,3% (5/6) · 2026-09: 100% (5/5)
Monitorização de profundidade quando indicada: 2026-07: 100% (3/3) · 2026-08: 60% (3/5) · 2026-09: 80% (4/5)
Carrinho de via aérea difícil checado: 2026-07: 100% (4/4) · 2026-08: 100% (6/6) · 2026-09: 100% (5/5)
Avaliação pré-anestésica documentada e completa: 2026-07: 75% (3/4) · 2026-08: 83,3% (5/6) · 2026-09: 100% (5/5)
Medidas de prevenção de hipotermia: 2026-07: 75% (3/4) · 2026-08: 66,7% (4/6) · 2026-09: 80% (4/5)
Jejum pré-operatório adequado: 2026-07: 100% (4/4) · 2026-08: 100% (6/6) · 2026-09: 100% (5/5)
Monitorização neuromuscular quando há bloqueador: 2026-07: 66,7% (2/3) · 2026-08: 80% (4/5) · 2026-09: 80% (4/5)
Relação TOF adequada antes da saída: 2026-07: 100% (2/2) · 2026-08: 100% (4/4) · 2026-09: 75% (3/4)
Profilaxia de náusea e vômito quando indicada: 2026-07: 100% (4/4) · 2026-08: 83,3% (5/6) · 2026-09: 80% (4/5)
Passagem de cuidado registrada: 2026-07: 100% (4/4) · 2026-08: 100% (6/6) · 2026-09: 100% (5/5)
Pesquisa de satisfação aplicada: 2026-07: 50% (2/4) · 2026-08: 66,7% (4/6) · 2026-09: 60% (3/5)

SATISFAÇÃO DO PACIENTE

Respostas com nota	Nota média	Instrumentos
9	8,6	Questionário de satisfação anestésica (exemplo) (9)

INDICADORES DE ESTRUTURA

32 registro(s) no período

Item	Verificados	Disponíveis	Indisponíveis	Taxa
Capnógrafo (essencial)	32	30	2	93,8%
Monitor multiparamétrico (essencial)	32	32	0	100%
Aparelho de anestesia (essencial)	32	32	0	100%
Oxímetro de pulso (essencial)	32	32	0	100%
Aspirador (essencial)	32	32	0	100%
Fonte de oxigênio e reserva (essencial)	32	32	0	100%
Carrinho de via aérea difícil (essencial)	32	28	0	87,5%
Desfibrilador (essencial)	32	31	1	96,9%
Manta ou aquecedor de fluidos	32	32	0	100%
Bomba de infusão	32	32	0	100%
Monitor de bloqueio neuromuscular (TOF)	0	0	0	—
Monitor de profundidade anestésica	0	0	0	—

Carro de parada checado	Sangue disponível
87,5% (28/32)	100% (32/32)
Anestesiologistas por sala	Treinamentos e simulações
1,59	2

COMO LER ESTE RELATÓRIO

Dado ausente não é resultado negativo: o atendimento sem resposta fica em "sem informação", fora do numerador e fora do denominador da taxa. O denominador de cada indicador é a sua população elegível com informação — não o total de atendimentos.

A atribuição de um evento à anestesia é registrada evento a evento, por avaliação clínica, e não é presumida pelo sistema.

Comparações entre profissionais exigem considerar o perfil e o risco dos pacientes de cada um (ASA, caráter do procedimento e volume), que o painel mostra ao lado das taxas.

Este relatório é agregado: não traz identificação de pacientes.