

Квиз #3А

16 ноября 2020 г.

Критические значения.

- $t_{500-6;0.025} = -1.964778$
- $t_{500-6,0.05} = -1.647944$
- $F_{2,1;0.95} = 199.5$
- $Z_{0.025} = -1.959964$
- $Z_{0.05} = -1.644854$
- $F_{1,1;0.95} = 161.4476$.

Условие для задач 1-4.

Рассмотрим модель $y_i = \beta_0 + \beta_1\sqrt{X_{1i}} + \beta_2 X_{1i}^2 + \beta_3 X_{2i} + \beta_4 e^{X_{3i}} + \beta_5 X_{4i} + u_i$, которая оценивается по 700 наблюдениям при помощи МНК. Оценённая модель имеет следующий вид:

$$\hat{y}_i = \underset{(0.05)}{20} + \underset{(0.02)}{4} \sqrt{X_{1i}} + \underset{(9)}{184} X_{1i}^2 - \underset{(0.9)}{1.1} X_{2i} - \underset{(0.01)}{0.3} e^{X_{3i}} + \underset{(0.1)}{15} X_{4i}.$$

В скобках указаны стандартные ошибки оценок коэффициентов. Будем считать, что все предпосылки теоремы Гаусса-Маркова выполнены, и $u \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$. Также известно, что

$$\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = \begin{pmatrix} 0.0025 & -0.04 & 0.001 & -0.001 & 0.47 & -0.1 \\ -0.04 & 0.0004 & 0.09 & 1 & 0.9 & 0.4 \\ 0.001 & 0.09 & 81 & 0.017 & -0.48 & 9 \\ -0.001 & 1 & 0.017 & 0.81 & -0.002 & 4.78 \\ 0.47 & 0.9 & -0.48 & -0.002 & 10^{-4} & 1.17 \\ -0.1 & 0.4 & 9 & -4.78 & 1.17 & 0.01 \end{pmatrix}$$

Задача 1.

- Проверьте коэффициенты β_1 , β_2 и β_5 на значимость на 5% уровне.
- Проверьте коэффициенты β_1 , β_3 и β_4 на значимость на 5% уровне.
- Проверьте коэффициенты β_0 , β_1 и β_3 на значимость на 5% уровне.
- Проверьте коэффициенты β_0 , β_3 и β_5 на значимость на 5% уровне.
- Проверьте коэффициенты β_3 , β_4 и β_5 на значимость на 5% уровне.
- Проверьте коэффициенты β_1 , β_4 и β_5 на значимость на 5% уровне.
- Проверьте коэффициенты β_0 , β_3 и β_4 на значимость на 5% уровне.

Задача 2.

а) Проверьте следующие гипотезы на уровне значимости 5%.

$$\begin{cases} H_0 : \beta_4 = -0.2, \\ H_1 : \beta_4 \neq -0.2 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} H_0 : \beta_2 = 190, \\ H_1 : \beta_2 < 190. \end{cases}$$

б) Проверьте следующие гипотезы на уровне значимости 5%.

$$\begin{cases} H_0 : \beta_3 = -1, \\ H_1 : \beta_3 \neq -1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} H_0 : \beta_5 = 13, \\ H_1 : \beta_5 < 13. \end{cases}$$

с) Проверьте следующие гипотезы на уровне значимости 5%.

$$\begin{cases} H_0 : \beta_1 = 5 \\ H_1 : \beta_1 \neq 5 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} H_0 : \beta_2 = 180, \\ H_1 : \beta_2 > 180. \end{cases}$$

д) Проверьте следующие гипотезы на уровне значимости 5%.

$$\begin{cases} H_0 : \beta_1 = 3, \\ H_1 : \beta_1 \neq 3 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} H_0 : \beta_4 = -0.2, \\ H_1 : \beta_4 < -0.2. \end{cases}$$

Задача 3.

- Постройте 95%-ый доверительный интервал для β_4 .
- Постройте 95%-ый доверительный интервал для β_1 .
- Постройте 95%-ый доверительный интервал для β_5 .
- Постройте 95%-ый доверительный интервал для β_3 .
- Постройте 95%-ый доверительный интервал для β_2 .

Задача 4.

- Постройте 95%-ый доверительный интервал для $\mathbb{E}(y_{701} | X_1 = X_2 = 4, X_3 = 0, X_4 = 1)$.
- Постройте 95%-ый доверительный интервал для $\mathbb{E}(y_{701} | X_1 = X_2 = 0, X_3 = X_4 = 1)$.
- Постройте 95%-ый доверительный интервал для $\mathbb{E}(y_{701} | X_1 = X_2 = 4, X_3 = X_4 = 0)$.
- Постройте 95%-ый доверительный интервал для $\mathbb{E}(y_{701} | X_1 = X_3 = 0, X_2 = X_4 = 1)$.

Задача 5.

Рассмотрим модель $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + u_i$, оцениваемую при помощи МНК. Предположим, что все предпосылки теоремы Гаусса-Маркова выполнены, и $u \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$. Модель оценили на следующих данных:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -5 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Оказалось, что $\hat{\beta} = (1.9 \quad 0.01 \quad -0.4)'$.

- Проверьте регрессию на значимость в целом на уровне значимости 5%.

b) Проверьте гипотезу

$$\begin{cases} H_0 : \beta_1 = \beta_2, \\ H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \end{cases}$$

на уровне значимости 5%, если

$$(X'X)_R^{-1} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.03 \\ 0.03 & 0.02 \end{pmatrix}, \hat{\beta}_R = \begin{pmatrix} 1.4 \\ 0.07 \end{pmatrix}$$

Задача 6.

Рассмотрим модель $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + u_i$, оцениваемую при помощи МНК. Предположим, что все предпосылки теоремы Гаусса-Маркова выполнены, и $u \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$. Модель оценили на следующих данных:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Оказалось, что $\hat{\beta} = (2.3 \quad 0.2 \quad -1.3)'$.

a) Проверьте регрессию на значимость в целом на уровне значимости 5%.

b) Проверьте гипотезу

$$\begin{cases} H_0 : \beta_1 = \beta_2, \\ H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \end{cases}$$

на уровне значимости 5%, если

$$(X'X)_R^{-1} = \begin{pmatrix} 0.28 & -0.04 \\ -0.04 & 0.05 \end{pmatrix}, \hat{\beta}_R = \begin{pmatrix} 1.6 \\ 0.2 \end{pmatrix}$$

Задача 7.

Рассмотрим линейную модель $y = X\beta + u$, оцениваемую при помощи МНК. Пусть $\mathbb{E}(u) = 0$, $\text{Var}(u) = \sigma^2 I$, число наблюдений равно n , число регрессоров, включая константный, равно k . Найдите следующие величины и укажите их размеры

a) $\mathbb{E}(\hat{\beta})$, $\text{Var}(\hat{u})$, $\text{Cov}(\hat{\beta}, \hat{u})$, $\text{Cov}(u, \hat{\beta})$.

b) $\mathbb{E}(\hat{y})$, $\text{Var}(\hat{y})$, $\text{Cov}(\hat{\beta}, \hat{u})$, $\text{Cov}(\hat{u}, u)$.

c) $\mathbb{E}(y)$, $\text{Var}(\hat{\beta})$, $\text{Cov}(u, \hat{u})$, $\text{Cov}(\hat{u}, \hat{y})$.

Задача 8.

Рассмотрим модель парной регрессии

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i,$$

оцениваемую при помощи МНК. Пусть известно, что

y_i	x_i
5	1
1	0
1	4
2	1

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.17 \\ -0.17 & 0.1 \end{bmatrix}$$

- a) Постройте 95%-ый доверительный интервал для $\hat{\beta}_0$, используя стандартные ошибки HC_0 .
- b) Постройте 95%-ый доверительный интервал для $\hat{\beta}_1$, используя стандартные ошибки HC_0 .
- c) Постройте 95%-ый доверительный интервал для $\hat{\beta}_0$, используя стандартные ошибки HC_3 .
- d) Постройте 95%-ый доверительный интервал для $\hat{\beta}_1$, используя стандартные ошибки HC_3 .