

Teorías previas

- En 1915 **Alfred Wegener** expone que hace unos 300 m.a. todos los continentes formaban un único continente llamado **Pangea**.
- La teoría de Wegener, llamada **teoría de la deriva continental** es la primera **teoría movilista** de la Tierra.
- Las teorías movilistas postulan que la Tierra ha cambiado a lo largo de su historia, frente a las **teorías fijistas**, que suponen que nuestro planeta ha tenido una historia estática.


Métodos directos y métodos indirectos

- Métodos directos:
 - Observación de la superficie terrestre.
 - Sondeos y minas.
 - Erupciones volcánicas.
- Métodos indirectos. Están basados en cálculos y deducciones:
 - Magnetismo.
 - Meteoritos.
 - Gravedad.
 - Radioisótopos.

El método sísmico

- Es un método indirecto que destaca por su importancia.
- Se basa en el estudio de la propagación de las vibraciones causadas por los terremotos.
 - Ondas P (principales). Son ondas longitudinales, que se pueden propagar a través de cualquier medio.
 - Ondas S (secundarias). Son ondas transversales, por lo no pueden viajar a través de un medio líquido.
 -

METODO SÍSMICO



Tectónica de placas

- Es la gran teoría unificadora que explica la gran variedad de acontecimientos y características de la Tierra.
- Asunciones:
 - La capa exterior o **litosfera** es rígida y se encuentra fragmentada.
 - La litosfera descansa sobre la **astenosfera**, que es semiplástica, más caliente y débil.
 - Las **placas litosféricas** se desplazan sobre la astenosfera, debido a la presencia de unas corrientes de convección.





Imagen vía blog.educastur.es

- Los movimientos de las placas son los responsables de la aparición de montañas, volcanes, sismos, plegamientos y fallas.
- También dan lugar a la expansión de los océanos y el desplazamiento de los continentes.
- Las principales placas son: **Africana, Antártica, Árabiga, Caribe, Cocos, Euroasiática, Filipina, Indoaustraliana, Norteamericana, Sudamericana** y del **Pacífico**.



Tipos de borde entre placas

Bordes destructivos

- Las placas colisionan y se destruye la litosfera.
- Reciben el nombre de **zonas de subducción**, o **fosas**.
- Se producen terremotos profundos y vulcanismo.
- Da lugar a arcos de islas y cordilleras.

Bordes constructivos

- Las placas se separan y se produce un ascenso de material.
- Da lugar a las **dorsales oceánicas**.

Bordes pasivos

- Las placas se mueven lateralmente una respecto a la otra.
- Se producen terremotos superficiales.
- Da lugar a **fallas transformantes**.





Figura 1.10 Mosaico de las placas rígidas que constituyen la envuelta externa de la Tierra. (Tomado de W. B. Hamilton, U.S. Geological Survey).

Atmósfera e hidrosfera

Atmósfera

- La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la tierra.
- Composición:
 - N_2 : 78%.
 - O_2 : 21%.
 - Argón: 0,93%.
 - CO_2 : 0,04%.
- La atmósfera está compuesta por una serie de capas. Destacamos:
 - Troposfera. Donde se producen los fenómenos meteororológicos.
 - Estratosfera. Donde se encuentra la ozonosfera.
 - Mesosfera.

Atmospheric CO₂ at Mauna Loa Observatory



Hidrosfera

- Está formada por todo el agua de la Tierra, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso.
- El ciclo del agua puede verse como una máquina que funciona con energía solar y que realiza erosión, movilización de materiales y modelado del relieve.

El suelo

Edafogénesis

- Es el proceso mediante el cual se forma a partir de las rocas el suelo.
- Etapas:
 - Alteración de la roca madre. Debido a los procesos de meteorización, tanto física como química.
 - Instalación de los seres vivos.
 - Mezcla de los componentes.

Factores que influyen en la edafogénesis

- La pendiente del terreno. La inclinación dificulta la formación del suelo.
- El clima. La humedad y la temperatura facilitan la edafogénesis.
- El tiempo. La formación del suelo es un proceso largo (hasta miles de años).

Tipos de suelo

- Arenosos. Son los más extendidos del mundo. Se encuentran en las zonas áridas y semiáridas. Poca capacidad de retener el agua. Sostiene herbáceas y bosques ligeros.
- Limosos. Capacidad intermedia de retener el agua.
- Arcillosos. Tienen una gran capacidad de retener el agua.
- **Francos**. Tiene mezcla de arenas, limos y arcillas. Son ideales para los cultivos. Tienen buen drenaje y buena capacidad para retener el agua.
- Calcáreos. En regiones áridas. Vegetación escasa.
- Congelados.
- Volcánicos. Suelen ser muy fértiles.
- Pedregosos. Típicos de las zonas montañosas.

Riesgos naturales


- Se puede definir como la vulnerabilidad de una población o región a una amenaza o un peligro natural.

Clasificación

- Geológicos:
 - Vulcanismo
 - Terremotos
 - Tsunamis
 - Deslizamientos, aludes...
- Meteorológicos, climatológicos e hidrológicos:
 - Nieve y hielo
 - Lluvias intensas, granizo y tormentas
 - Inundaciones
 - Olas de frío y de calor
 - Vientos fuertes
- Biológicos: plagas y epidemias

Predicción y prevención

- **Predecir** es anunciar con anticipación. Una de las medidas más comunes es la realización de *mapas de riesgo*.
- **Prevención**. Consiste en la aplicación de una serie de medidas adecuadas para mitigar los daños. Pueden ser de dos tipos:
 - **Medidas estructurales**. Se modifican las estructuras geológicas o las construcciones.
 - **Medidas no estructurales**:
 - *Ordenación del territorio*
 - *Protección civil*
 - *Educación*



Minerales

- Un mineral es una sustancia natural, de composición química definida, normalmente sólido e inorgánico y que tiene una cierta estructura cristalina (sus átomos se disponen de manera ordenada, en figuras geométricas).

Clasificación de los minerales

Los minerales se dividen en clases según el grupo con carga negativa predominante:

- Elementos nativos. Están formados por una única especie de átomos. Ejemplos: oro, plata, cobre, diamante, grafito...
- Sulfuros y sulfosales. Son combinaciones del azufre con metales o semimetales. Ejemplos: Galena (PbS) y Pirita (FeS_2)
- Halogenuros. Combinación de halógeno con metal. Ejemplo: halita ($NaCl$)
- Carbonatos y nitratos.
- Sulfatos.
- Fosfatos.
- Silicatos.

Clasificación de las rocas

Las rocas se clasifican según su modo de formación u origen en tres grupos:

- Ígneas
- Sedimentarias
- Metamórficas

Rocas ígneas

- Las rocas ígneas, también conocidas como magmáticas son todas aquellas que se han formado por la solidificación de un material rocoso, caliente y fluido denominado **magma**.
- Cuando la solidificación que se produce dentro de la litosfera, la roca resultante se denomina **plutónica**.
- Cuando la solidificación se produce en la superficie, la roca resultante se denomina **volcánica**.
- Debido a que el enfriamiento en el interior de la Tierra ocurre más lentamente, los cristales de las rocas plutónicas están más desarrollados (son más grandes) que los de las rocas volcánicas.

ROCAS	PLUTÓNICAS (grano grueso)	 GRANITO	 SIENITA	 DIORITA	 GABRO	 PERIDOTITA
	VOLCÁNICAS (grano fino)	 RIOLITA	 TRAQUITA	 ANDESITA	 BASALTO	Son muy poco frecuentes con estas características

CARACTERÍSTICAS	COLOR	Predominan minerales claros				Predominan minerales oscuros
	COMPOSICIÓN	QUÍMICA	Altas en sílice			Bajas en sílice
			Bajas en Fe y Mg			Altas en Fe y Mg
	MINERAL	CUARZO	FELDESPATO	SILICATOS FERROMAGNESIANOS		

Rocas metamórficas

- Las rocas metamórficas resultan de la transformación de rocas preexistentes que han sufrido ajustes estructurales y de composición bajo ciertas condiciones físicas o químicas, principalmente la presión y la temperatura.
- La roca original se transforma sin que pierda su estado sólido.
- Se clasifican según el tipo de metamorfismo.

Metamorfismo regional

- Es el mayoritario
- Ocurre en áreas muy grandes que están sometidas a temperaturas, presiones y deformaciones extremas.
- Característico de zonas de convergencia entre placas.

Metamorfismo de contacto

- Se da cuando el calor y los fluidos magmáticos actúan para producir el cambio.

Metamorfismo dinámico

- Se origina debido a la presión.
- Se asocia con zonas de fallas.