

# 11.12245 – תשובה

str – "abc" chr – 'a'	str – "abc" chr – 'b'	str – "bc" chr – 'c'	str – "bc" chr – 'a'	str – "c" chr – 'd'	str – "d" chr – 'c'
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

i = 0

X

WWW(items, 0) → 2

0 == 5 || 0 == 6 → X

WWW(items[0], items[1]) → ✓

WWW(items[0], 0) → true

0 == 3 → X

'a' == 'a' → ✓

WWW(items[1], 0) → true

0 == 3 → X

'a' == 'b' → X

WWW(items[1], 1) → true

1 == 3 → X

'b' == 'b' → ✓

true == true

1 + WWW(items, 2) → 1 + 1 = 2

2 == 5 || 2 == 6 → X

WWW(items[2], items[3]) → false

WWW(items[2], 0) → true

0 == 2 → X

'b' == 'c' → X

WWW(items[2], 1)

1 == 2 → X

'c' == 'c' → ✓

WWW(items[3], 0) → false

0 == 2 → ✗

'b' == 'a' → ✗

WWW(items[3], 1) → false

1 == 2 → ✗

'c' == 'a' → ✗

WWW(items[3], 2) → false

2 == 2 → ✓

true == false → ✗

WWW(items, 4) → true

i == 5 || i == 6 → ✗

WWW(items[4], items[5]) → true

WWW(items[4], 0) → false

0 == 1 → ✗

'c' == 'd' → ✗

WWW(items[4], 1) → false

1 == 1 → ✓

WWW(items[5], 0) → false

0 == 1 → ✗

'd' == 'c' → ✗

WWW(items[5], 1) → false

1 == 1 → ✓

false == false → ✓

1 + WWW(items, 6) → 1 + 0 = 1

i == 5 || == 6 → ✓

## ב

items[5] = "d" 'd'

## ג

מונה כל 2 תאים יש את בהם את אותו היחס בין המחרוזת לתו (אם התו נמצא במחרוזת או לא) אם אין את אותו היחס היא מדלגת על 2 התאים ועוברת לשניים הבאים