

# Około dwustu łatwych zadań z języków formalnych i złożoności obliczeniowej\* (i jedno chyba trudne)

Jerzy Marcinkowski

luty 2016

## 1 Deterministyczne Automaty Skończone

**Zadanie 1.** Rozważmy język  $L = \{w0s : |s| = 9\}$ , złożony z tych słów nad alfabetem  $\{0, 1\}$  których dziesiąty symbol od końca to 0. Udowodnij, że DFA rozpoznający ten język ma co najmniej 1024 stany.

**Zadanie 2.** Jaką minimalną liczbę stanów musi mieć deterministyczny automat skończony rozpoznający zbiór tych wszystkich słów nad alfabetem  $\{a, b, c\}$ , które wśród ostatnich trzech znaków mają po jednym wystąpieniu każdej z liter alfabetu?

**Zadanie 3.** Jaką minimalną liczbę stanów musi mieć deterministyczny automat skończony, rozpoznający język tych słów nad alfabetem  $\{a, b, c\}$ , które mają przynajmniej 4 symbole i których ostatnie 4 symbole są jednakowe?

**Zadanie 4.** Udowodnij, że język  $L = \{a^n b^{2n} : n \in \mathbb{N}\}$  nie jest regularny.

**Zadanie 5.** (za 2 punkty) Niech  $L$  będzie dowolnym podzbiorem  $L(0^*)$ . Udowodnij, że  $L^*$  jest językiem regularnym.

**Zadanie 6.** Udowodnij, że język  $L$  tych słów nad alfabetem  $\{0, 1\}$ , które są zapisem binarnym liczby pierwszej, nie jest regularny.

**Definicja.** Dla danego słowa  $w$ , nad pewnym ustalonym alfabetem, niech  $w^R$  oznacza „ $w$  czytane od końca”, tzn.  $\varepsilon^R = \varepsilon$  i  $(aw)^R = w^R a$  jeśli  $a$  należy do alfabetu, zaś  $w$  jest dowolnym słowem.

**Zadanie 7.** Czy język  $L = \{ww^R x : w, x \in \{0, 1\}^* \text{ i } w, x \neq \varepsilon\}$  jest regularny? Czy język  $L = \{xwx : w, x \in \{0, 1\}^* \text{ i } x \neq \varepsilon\}$  jest regularny?

**Zadanie 8.** Rozważmy alfabet  $A_n$  składający się z liter  $a, b_1, b_2, \dots, b_n$ . Niech język  $L_n^1$  składa się z tych słów nad  $A_n$ , które mają parzystą liczbę wystąpień wzorca  $b_1 b_2$ . Niech język  $L_n^2$  składa się z tych słów nad  $A_n$ , które mają parzystą liczbę wystąpień wzorca  $b_2 b_3$ , itd. Niech wreszcie język  $L_n^n$  składa się z tych słów nad  $A_n$ , które mają parzystą liczbę wystąpień wzorca  $b_n b_1$ . Zdefiniujmy język  $L_n$  jako przecięcie  $L_n^1 \cap L_n^2 \cap \dots \cap L_n^n$ . Jaką minimalną liczbę stanów musi mieć deterministyczny automat skończony rozpoznający  $L_n$ ?

---

\*Jest to kolejna edycja zbioru zadań, stanowiącego podstawę ćwiczeń z przedmiotu *Języki formalne i złożoność obliczeniowa*, który prowadzę corocznie w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstanie tej wersji zbioru było możliwe dzięki temu, że pan Kacper Król zechciał poświęcić swój czas na odtworzenie zaginionych źródeł L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xowych poprzedniej wersji, za co jestem mu ogromnie wdzięczny.

## 2 Twierdzenie o indeksie

**Zadanie 9. (Twierdzenie o indeksie)** Niech  $L \subseteq \mathcal{A}^*$ . Relację  $\sim_L \subseteq \mathcal{A}^* \times \mathcal{A}^*$  definiujemy w następujący sposób:  $w \sim_L w'$  w.t.w gdy  $\forall v \in \mathcal{A}^* (wv \in L \Leftrightarrow w'v \in L)$ . Udowodnij następujące *twierdzenie o indeksie*:  $L$  jest regularny wtedy i tylko wtedy gdy liczba klas abstrakcji relacji  $\sim_L$  jest skończona. Minimalna liczba stanów DFA rozpoznającego  $L$  jest wtedy równa liczbie tych klas abstrakcji.

Niech  $\Sigma$  będzie skończonym alfabetem i niech  $L \subseteq \Sigma^*$ . Jak pamiętamy, relacja  $\sim_L$  z *Twierdzenia o indeksie* zdefiniowana jest, na zbiorze  $\Sigma^*$  jako:  $w \sim_L v$  wtedy i tylko wtedy gdy  $\forall x \in \Sigma^* (wx \in L \Leftrightarrow vx \in L)$ . Podobnie możemy zdefiniować relację równoważności  $\sim_L^{inf}$ . Mianowicie  $w \sim_L^{inf} v$  zachodzi wtedy i tylko wtedy gdy  $\forall x, y \in \Sigma^* (xwy \in L \Leftrightarrow xvy \in L)$ .

Niech  $i_L$  (od słowa *indeks*) będzie równe  $|\Sigma^* / \sim_L|$  (czyli  $i_L$  to liczba klas abstrakcji na jakie  $\sim_L$  dzieli  $\Sigma^*$ ). Podobnie, niech  $i_L^{inf} = |\Sigma^* / \sim_L^{inf}|$ .

Kolejne trzy zadania dotyczą wzajemnych relacji między liczbami  $i_L$  i  $i_L^{inf}$ .

**Zadanie 10.** Udowodnij, że jeśli jedna z liczb  $i_L, i_L^{inf}$  jest skończona, to obie są skończone (z Twierdzenia o Indeksie wiemy, że ma to miejsce wtedy i tylko wtedy gdy  $L$  jest regularny). Dokładniej mówiąc:

- a. udowodnij, że  $i_L \leq i_L^{inf}$ ;
- b. udowodnij, że  $i_L^{inf} \leq i_L$ .

**Zadanie 11.** W zadaniu tym należy pokazać, że szacowanie z punktu **b** poprzedniego zadania nie może być poprawione. Dokładniej mówiąc:

a. Udowodnij, że jeśli  $\Sigma = \{a, b, c\}$  to dla każdego skończonego zbioru  $Q$  istnieje minimalny DFA  $A$ , o zbiorze stanów  $Q$  i funkcji przejścia  $\delta$ , taki że dla każdej funkcji  $f : Q \rightarrow Q$  istnieje słowo  $w$  dla którego dla każdego  $q \in Q$  zachodzi:  $\delta(q, w) = f(q)$ . Przez automat minimalny rozumiemy tu taki, w którym każdy stan jest osiągalny ze stanu początkowego, i w którym dla każdych dwóch stanów  $q, q'$  istnieje słowo  $w$  takie że dokładnie jeden ze stanów  $\delta(q, w), \delta(q', w)$  jest akceptujący.

b. Korzystając z tezy punktu **a.** udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej  $n$  istnieje język  $L$  taki, że  $i_L \leq n$  zaś  $n^n \leq i_L^{inf}$ .

**Zadanie 12.** Pokaż, że jeśli  $|\Sigma| = 1$  to  $i_L^{inf} = i_L$ .

## 3 Wyrażenia regularne

**Zadanie 13.** Skonstruuj automat skończony rozpoznający i wyrażenie regularne definiujące, nad alfabetem  $\{0, 1\}$ , język słów, które zawierają tyle samo jedynek co zer i w których każdym prefiksie liczba zer różni się co najwyżej o dwa od liczby jedynek.

**Zadanie 14.** Skonstruuj automat skończony rozpoznający i wyrażenie regularne definiujące, nad alfabetem  $\{a, b\}$ , język słów, które nie zawierają wzorca *baba*.

**Zadanie 15.** Dodanie do definicji wyrażeń regularnych pozwolenia na użycie symbolu  $\cap$ , oznaczającego przekrój języków nie umożliwia reprezentowania nowych zbiorów, wyrażenia jednak stają się krótsze. Udowodnij, że użycie  $\cap$  może wykładniczo skrócić wyrażenie.

*Wskazówka: rozważ język składający się z 1 słowa  $(\dots((a_0a_1)^2a_2)^2\dots)^2$ .*

**Zadanie 16.** Skonstruuj automat skończony rozpoznający i wyrażenie regularne definiujące, nad alfabetem  $\{a, b, c, d\}$ , język słów, które zawierają tyle samo symboli  $a$  co  $b$ , tyle samo symboli  $c$  co  $d$  i w których każdym prefiksie liczba symboli  $a$  różni się co najwyżej o jeden od liczby symboli  $b$ , zaś liczba symboli  $c$  różni się co najwyżej o jeden od liczby symboli  $d$ .

**Zadanie 17.** Czy istnieje wyrażenie regularne  $\phi$ , takie że  $L_{a\phi} = L_{\phi b}$ ? Czy istnieje wyrażenie regularne  $\phi$ , takie że  $L_{a^*\phi} = L_{\phi b^*}$ ?

## 4 Zadania o deterministycznych wyrażeniach regularnych.

*Deterministic regular expressions*, znane również jako *unambiguous regular expressions* pojawiają się, jak się wydaje niechętnie, w definicji standardu XML

**Definicja.** Niech  $\phi$  będzie wyrażeniem regularnym nad alfabetem  $\mathcal{A}$ , a  $w$  słowem nad tym alfabetem. Niech  $f$  będzie funkcją, której argumentami są wystąpienia liter alfabetu w słowie  $w$  (czyli "kolejne litery słowa  $w$ "), a wartościami są wystąpienia liter w wyrażeniu  $\phi$ . Powiemy, że  $f$  jest **poprawnym mapowaniem**  $w$  na  $\phi$ , jeśli zachodzi któryś z warunków:

1.  $\phi$  jest słowem nad  $\mathcal{A}$ ,  $\phi = w$  i  $f$  jest identycznością lub  $\phi = \varepsilon$  i  $w$  jest puste;
2.  $\phi = \phi_1 + \phi_2$  i  $f$  jest poprawnym mapowaniem  $w$  na  $\phi_1$  lub  $f$  jest poprawnym mapowaniem  $w$  na  $\phi_2$ ;
3.  $\phi = \phi_1\phi_2$ ,  $w = w_1w_2$  i  $f$  ograniczona do  $w_1$  jest poprawnym mapowaniem tego słowa na  $\phi_1$ , zaś  $f$  ograniczona do  $w_2$  jest poprawnym mapowaniem tego słowa na  $\phi_2$ ;
4.  $\phi = \psi^*$ ,  $w = w_1w_2 \dots w_k$ , dla jakiegoś  $k \geq 0$  i dla każdego  $1 \leq i \leq k$  funkcja  $f$  ograniczona do  $w_i$  jest poprawnym mapowaniem  $w_i$  na  $\psi$ .

Intuicja jest taka, że poprawne mapowanie słowa przyporządkowuje każdej jego literze, literę wyrażenia z której ta litera słowa "się wzięła". Wyrażenie  $\phi$  jest **deterministycznym wyrażeniem regularnym**, jeśli dla każdego  $w \in L_\phi$  istnieje dokładnie jedno poprawne mapowanie  $w$  na  $\phi$ . Deterministyczne wyrażenie regularne pozwala odczytać, które litery w słowie biorą się z których liter w wyrażeniu, ale to odczytanie następuje dopiero, gdy znamy całe słowo. inaczej jest dla deterministycznych on-line wyrażen regularnych. Wyrażenie regularne  $\phi$  jest **deterministyczne on-line**, jeśli dla każdego słów  $ww_1$ ,  $ww_2 \in L_\phi$  i każdej funkcji  $f_1, f_2$ , będących poprawnymi mapowaniami słów (odpowiednio)  $ww_1$  i  $ww_2$  na  $\phi$ , funkcje  $f_1$  i  $f_2$  zgadzają się na prefiksie  $w$ .

**Zadanie 18. A.** Które z poniższych wyrażen są deterministyczne, a które są deterministyczne on-line? i.  $0^*10^* + 0^*$   
ii.  $(0 + 1)^*1(0 + 1)$   
iii.  $(0 + 1)(0 + 2)^* + (1 + 2)(0 + 1)^* + (0 + 2)(1 + 2)^*$

**B.** Znajdź deterministyczne wyrażenie regularne oznaczające język tych wszystkich słów nad alfabetem zerojedynkowym, które zawierają wzorzec 101.

**Zadanie 19.** Czy dla każdego języka regularnego istnieje deterministyczne on-line wyrażenie regularne, które go definiuje?

**Zadanie 20.** Znajdź deterministyczne on-line wyrażenie regularne oznaczające język tych wszystkich słów nad alfabetem zerojedynkowym, które zawierają jedną lub dwie jedynki.

## 5 Niedeterministyczne Automaty Skończone

**Zadanie 21.** Skonstruuj niedeterministyczny automat skończony rozpoznający język tych słów nad  $\{0,1\}^*$  które, jako liczba w systemie dwójkowym, dzielą się przez 5, przy czym

liczba jest wczytywana

- a) począwszy od najbardziej znaczącego bitu,
- b) począwszy od najmniej znaczącego bitu.

**Zadanie 22.** Udowodnij, że jeśli dla pewnego języka  $L$  istnieje rozpoznający go  $NFA$ , to istnieje również  $NFA$  rozpoznający język  $L^R = \{w : w^R \in L\}$

**Zadanie 23.** Wiadomo, że  $L$  jest językiem regularnym. Pokaż, że w takim razie język  $\{w : \exists n \in \mathbb{N} \exists v \in L w^n = v\}$  jest też językiem regularnym. Przez  $w^n$  rozumiemy tu słowo  $w$  skonstruowane ze sobą  $n$  razy.

**Zadanie 24.** Udowodnij, że jeśli  $L_1$  i  $L_2$  są językami regularnymi nad pewnym alfabetem  $A$  to również języki  $L_1 \cup L_2$ ,  $L_1 \cap L_2$ , i  $A^* - L_1$  są językami regularnymi.

**Zadanie 25.** (za 2 punkty) Załóżmy, że  $L$  jest pewnym językiem regularnym. Czy język  $L/2 = \{w : \exists v vw \in L \wedge |v| = |w|\}$  jest regularny?

**Zadanie 26.** Podaj algorytm rozstrzygający, dla danych dwóch niedeterministycznych automatów skończonych czy języki rozpoznawane przez te automaty są równe.

**Zadanie 27.** Minimalny  $DFA$  rozpoznający język  $L$  ma zawsze tyle samo stanów co minimalny  $DFA$  rozpoznający dopełnienie  $L$ . Stwierdzenie to przestaje być prawdziwe, jeśli rozważamy automaty niedeterministyczne. Udowodnij, że istnieje język  $L$ , który daje się rozpoznać za pomocą  $NFA$  o mniej niż 20 stanach, ale którego dopełnienie nie daje się rozpoznać żadnym  $NFA$  o mniej niż 200 stanach. *Wskazówka: wystarczy rozważyć alfabet jednoelementowy.*

**Zadanie 28.** Niech  $L_k = \{0^n : k \text{ nie dzieli } n\}$ . Dla języka regularnego  $L$ , niech  $d(L)$  oznacza minimalną liczbę stanów automatu deterministycznego rozpoznającego  $L$ , zaś  $n(L)$  niech oznacza minimalną liczbę stanów automatu niedeterministycznego rozpoznającego  $L$ . Podaj nieskończenie wiele liczb naturalnych  $k$ , dla których zachodzi  $d(L_k) = n(L_k)$  i nieskończenie wiele  $k$  naturalnych, dla których ta równość nie zachodzi.

W kolejnych dwóch zadaniach niech  $p \geq 5$  będzie pewną liczbą pierwszą, a  $L_p$  językiem tych słów nad  $\{0, 1\}$  które czytane jako liczba w zapisie binarnym dają, jako resztę z dzielenia przez  $p$ , jedną z liczb  $\{1, 2, \dots, (p-1)/2\}$ , przy czym liczby czytamy „od prawej”, czyli od najmniej znaczącego bitu (to znaczy pierwszy znak słowa jest ostatnią cyfrą liczby).

**Zadanie 29.** Czy istnieje niedeterministyczny automat skończony o mniej niż  $p+3$  stanach rozpoznający język  $L_p$ ?

**Zadanie 30.** Czy istnieje deterministyczny automat skończony o mniej niż  $2p$  stanach rozpoznający język  $L_p$ ?

**Zadanie 31.** Język  $L \in \{0, 1\}^*$  jest regularny. Czy wynika z tego, że język

$$\sqrt{L} = \{w \in \{0, 1\}^* : \exists x \in \{0, 1\}^* \exists y \in L \ wx = y \wedge |y| = |w|^2\}$$

jest regularny?

W kolejnych dwóch zadaniach niech  $M_n$  będzie językiem tych słów nad alfabetem  $\{1, 2, \dots, n\}$  (gdzie  $n$  jest pewną liczbą parzystą) w których występują wszystkie litery alfabetu oprócz być może jednej. Przez  $\overline{M_n}$  rozumiemy dopełnienie języka  $M_n$  do zbioru  $\{1, 2, \dots, n\}^*$ .

**Zadanie 32. a.** Jaką minimalną liczbę stanów musi mieć deterministyczny automat skończony rozpoznający  $\overline{M_n}$ ?

**b.** Jaką minimalną liczbę stanów musi mieć niedeterministyczny automat skończony rozpoznający  $\overline{M_n}$ ?

**Zadanie 33.** Udowodnij, że każdy niedeterministyczny automat skończony rozpoznający język  $M_n$  musi mieć więcej niż  $2^{\frac{n}{2}-1}$  stanów.

*Wskazówka.* Dla liczby naturalnej  $k$ , takiej, że  $1 \leq k \leq n/2$  nazwijmy parę liczb  $\{2k-1, 2k\}$  rodziną. Powiemy że słowo  $x \in \{1, 2, \dots, n\}^*$  nie rozdziela rodzin, jeśli zawsze wtedy, gdy jedna z liter z jakiejś rodziny występuje w słowie  $x$ , w słowie tym występuje również druga z tych liczb. Powiemy że słowo  $x$  jest rosnące, gdy każda jego kolejna litera jest liczbą większą niż poprzednia. Ile jest słów nie należących do  $M_n$ , które są rosnące i nie rozdzielają rodzin?

Na potrzeby kolejnych trzech zadań zdefiniujemy indukcyjnie następującą ternarną relację  $\ominus$  na słowach nad alfabetem  $\Sigma$ :

- $\ominus(\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon)$
- $\ominus(aw, v, ax)$  jeśli  $\ominus(w, v, x)$
- $\ominus(w, av, ax)$  jeśli  $\ominus(w, v, x)$  gdzie  $a \in \Sigma$  and  $w, v, x \in \Sigma^*$

Dla języka  $L \subseteq \Sigma^*$  i słowa  $w \in \Sigma^*$  zdefiniujemy:

$$L_{\exists w} = \{x \in \Sigma^* : \exists y \in \Sigma^* (\ominus(w, x, y) \wedge y \in L)\}$$

$$L_{\forall w} = \{x \in \Sigma^* : \forall y \in \Sigma^* (\ominus(w, x, y) \Rightarrow y \in L)\}$$

**Zadanie 34.** Załóżmy, że  $L$  jest językiem regularnym, zaś  $w$  jest pewnym ustalonym słowem z  $\Sigma^*$ . Czy wynika z tego że  $L_{\forall w}$  jest językiem regularnym?

**Zadanie 35.** Załóżmy, że  $L$  jest językiem regularnym, zaś  $w$  jest pewnym ustalonym słowem z  $\Sigma^*$ . Czy wynika z tego że  $L_{\exists w}$  jest językiem regularnym?

**Zadanie 36.** Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej  $k$  istnieje język  $L \subseteq \{a, b, c\}^*$  dający się rozpoznawać deterministycznym automatem skończonym o mniej niż  $kK^2$  stanach i taki, że język  $L_{\exists c^k}$  nie daje się rozpoznawać deterministycznym automatem skończonym o mniej niż  $2^{kK}$  stanach, gdzie  $K = 2^k$ .

*Wskazówka:* Być może przyda nam się pamiętać, że suma pierwszych  $n$  liczb pierwszych jest zawsze mniejsza niż  $n^2 \log n$ , zaś ich iloczyn zawsze jest większy od  $2^{n \log n}$ .

## 6 Zadania o hipotezie Černego

Kolejne zadania mają związek z – otwartą od pół wieku – hipotezą Černego. Mówi ona, że jeśli zbiór  $\text{sync}(Q)$  jest niepusty, to zawiera on jakieś słowo o długości nie większej niż  $(|Q|-1)^2$  (znany jest automat, z niepustym  $\text{sync}(Q)$ , dla którego najkrótsze słowo w  $\text{sync}(Q)$  ma długość dokładnie  $(|Q|-1)^2$ ).

**Definicja.** Dla danego deterministycznego automatu skończonego  $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_0, F, \delta \rangle$  i zbioru  $S \subseteq Q$ , przez  $\text{sync}(S)$  oznaczmy zbiór  $\{w \in \Sigma^* : \forall q, q' \in S \ \hat{\delta}(q, w) = \hat{\delta}(q', w)\}$ . Zauważ, że definicja nie zależy od wyboru stanów  $q_0$  i  $F$  a tylko od zbioru stanów  $Q$ , od alfabetu  $\Sigma$  i od funkcji przejścia  $\delta$ .

**Zadanie 37.** Język  $L \subseteq \Sigma^*$  nazywany jest regularnym ideałem jeśli jest regularny i jeśli dla każdego słowa  $w \in L$  i każdych słów  $v, v' \in \Sigma^*$  zachodzi  $vvwv' \in L$ .

a. Czy dla każdego automatu  $\mathcal{A}$  i zbioru  $S$  zawartego w zbiorze stanów automatu  $\mathcal{A}$  język  $\text{sync}(S)$  jest regularny?

b. Czy dla każdego automatu  $\mathcal{A}$  i zbioru  $S$  zawartego w zbiorze stanów automatu  $\mathcal{A}$  język  $\text{sync}(S)$  jest regularnym ideałem?

c. Czy dla każdego automatu  $\mathcal{A}$  język  $\text{sync}(Q)$  jest regularnym ideałem? ( $Q$  jest ponownie zbiorem stanów automatu  $\mathcal{A}$ ).

**Zadanie 38. a.** Udowodnij, że jeśli  $S$  jest dwuelementowy i zbiór  $\text{sync}(S)$  jest niepusty, to zawiera on jakieś słowo o długości nie większej niż  $|Q|^2$ .

b. Udowodnij, że jeśli zbiór  $\text{sync}(Q)$  jest niepusty, to zawiera on jakieś słowo o długości nie większej niż  $|Q|^3$ . *Wskazówka: skorzystaj z a.*

**Zadanie 39.** Udowodnij, że dla każdego dostatecznie dużego  $n$  naturalnego istnieje automat  $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_0, F, \delta \rangle$ , gdzie  $\Sigma = \{a, b\}$ ,  $n = |Q|$ , i dwuelementowy zbiór  $S \subseteq Q$ , takie że zbiór  $\text{sync}(S)$  jest niepusty, ale nie zawiera słowa o długości mniejszej niż  $n^2/4$ .

W kolejnych trzech zadaniach rozważamy Częściowo Deterministyczne Automaty Skończone (PDFA). PDFA różni się od DFA tym, że funkcja przejścia  $\delta$  może być w nim funkcją częściową, to znaczy  $\delta(q, a)$  może nie być określona dla niektórych par  $\langle q, a \rangle$ , gdzie  $q \in Q$  i  $a \in \Sigma$ .

W rezultacie, dla niektórych słów  $w \in \Sigma^*$  i stanów  $q \in Q$ , wartość  $\hat{\delta}(q, w)$  może być nieokreślona.

Dla danego PDFA  $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_0, F, \delta \rangle$  i zbioru  $S \subseteq Q$ , przez  $\text{csync}(S)$  („zbiór słów ostrożnie synchronizujących  $S$ ”) oznaczmy zbiór takich słów  $w \in \Sigma^*$  że dla każdego  $q \in S$  wartość  $\hat{\delta}(q, w)$  jest określona, oraz dla każdych dwóch stanów  $q, q' \in S$  zachodzi  $\hat{\delta}(q, w) = \hat{\delta}(q', w)$ . Zauważ, że definicja nie zależy od wyboru stanów  $q_0$  i  $F$  a tylko od zbioru stanów  $Q$ , od alfabetu  $\Sigma$  i od funkcji przejścia  $\delta$ .

**Zadanie 40.** Załóżmy, że dla każdego dwuelementowego  $S \subseteq Q$  zbiór  $\text{csync}(S)$  jest niepusty. Czy wynika z tego, że  $\text{csync}(Q)$  jest niepusty?

**Zadanie 41.** Niech  $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_0, F, \delta \rangle$  będzie PDFA.

a. Załóżmy że dla pewnego trzelementowego  $S \subseteq Q$  zbiór  $\text{csync}(S)$  jest niepusty. Pokaż, że w takim razie istnieje  $w \in \text{csync}(S)$  o długości nie większej niż  $2|Q|^3$ .

b. Udowodnij, że jeśli zbiór  $\text{csync}(Q)$  jest niepusty, to zawiera on jakieś słowo o długości nie większej niż  $2^{|Q|}$ .

**Zadanie 42.** Udowodnij, że dla każdego (dostatecznie dużego)  $n$  istnieje PDFA  $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_0, F, \delta \rangle$ , taki że  $|Q| = n$  i że...

**Wersja M.** ...istnieje trzelementowy  $S \subseteq Q$  taki że zbiór  $\text{csync}(S)$  jest niepusty ale nie zawiera słowa krótszego niż  $n^3/10000$ .

**Wersja L.** ... $\text{csync}(Q)$  jest niepusty ale nie zawiera słowa krótszego niż  $p(n)$ , gdzie  $p$  jest dowolnym, ustalonym wcześniej, wielomianem. Zakładamy, że  $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ .

**Wersja XL.** ... $\text{csync}(Q)$  jest niepusty ale nie zawiera słowa krótszego niż  $p(n)$ , gdzie  $p$  jest dowolnym, ustalonym wcześniej, wielomianem. Zakładamy, że  $\Sigma = \{0, 1\}$ .

*Wskazówka.* Rozwiązując wersję M warto może pamiętać, że między każdym naturalnym  $k$  a  $2k$  znajduje się liczba pierwsza. Rozwiązując wersje L i XL warto być może wiedzieć, że suma pierwszych  $n$  liczb pierwszych jest zawsze mniejsza niż  $n^2 \log n$ , zaś ich iloczyn zawsze jest większy od  $2^{n \log n}$ .

## 7 Relacje automatyczne

Zdefiniujmy funkcję  $l : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{N}$  jako:  $l(\varepsilon) = 0$ ,  $l(0w) = 2l(w)$ ,  $l(1w) = 2l(w) + 1$ .

Dla liczby naturalnej  $k$  zdefiniujmy  $\Sigma_k = \{0, 1\}^k$ .

Dla liczb naturalnych  $j \leq k$  zdefiniujmy funkcję  $\Pi_k^j : \Sigma_k^* \rightarrow \{0, 1\}^*$  jako:  $\Pi_k^j(\varepsilon) = \varepsilon$ ,

$\Pi_k^j(\langle a_1, a_2, \dots, a_j, \dots, a_k \rangle w) = a_j \Pi_k^j(w)$ , gdzie  $\langle a_1, a_2, \dots, a_j, \dots, a_k \rangle \in \Sigma_k$ .

Relację  $R \subseteq \mathbb{N}^k$  nazwiemy na tej liście zadań *automatyczną*, jeśli język  $L_R$  złożony z tych słów  $w \in \Sigma_k^*$ , dla których zachodzi  $R(l(\Pi_k^1(w)), l(\Pi_k^2(w)), \dots, l(\Pi_k^k(w)))$ , jest regularny.

**Zadanie 43.** Czy relacja dodawania jest automatyczna? Przez relację dodawania rozumiemy tu  $\{\langle a, b, c \rangle \in \mathbb{N}^3 : a + b = c\}$ .

**Zadanie 44.** Czy relacja mnożenia jest automatyczna? Przez relację mnożenia rozumiemy tu  $\{\langle a, b, c \rangle \in \mathbb{N}^3 : ab = c\}$ .

**Zadanie 45.** Udowodnij, że rzut relacji automatycznej jest relacją automatyczną. Innymi słowy, jeśli  $R \subseteq \mathbb{N}^k$  jest relacją automatyczną, to również relacja  $R' = \{r \in \mathbb{N}^{k-1} : \exists m \in \mathbb{N} \langle r, m \rangle \in R\}$  jest relacją automatyczną (dla uproszczenia możesz przyjąć, że  $k = 2$ ).

## 8 Gramatyki bezkontekstowe i automaty ze stosem

**Zadanie 46.** Zbuduj automat ze stosem rozpoznający język *dobrze rozstawionych nawiasów dwóch rodzajów* generowany przez gramatykę:

$$S \rightarrow SS|(S)|[S]|\varepsilon$$

która ma jeden symbol nieterminalny  $S$  i cztery symbole terminalne  $(, ), [, ]$ .

**Zadanie 47.** Zbuduj gramatykę bezkontekstową generującą język:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : |w|_0 = 2|w|_1 \wedge |w|_1 \text{ jest liczbą parzystą}\}.$$

**Zadanie 48.** Czy język  $L = \{w \in \{0, 1\}^* : |w|_0 \leq |w|_1 \leq 2|w|_0\}$  jest bezkontekstowy?

**Zadanie 49.** Czy język  $L = \{w \in \{0, 1\}^* : \exists n \in \mathbb{N} \ 2n|w|_0 \leq |w|_1 \leq (2n+1)|w|_0\}$  jest bezkontekstowy?

**Zadanie 50.** Podaj algorytm rozstrzygający dla danej gramatyki bezkontekstowej  $G$ , czy  $L(G)$  jest niepusty.

**Zadanie 51.** Pokaż, że  $L \subseteq \{0\}^*$  jest bezkontekstowy wtedy i tylko wtedy gdy jest regularny.

**Zadanie 52.** Niech  $G$  będzie gramatyką generującą poprawnie zbudowane formuły rachunku zdań ze zmiennymi zdaniowymi  $p$  i  $q$ . Symbolami terminalnymi w  $G$  są  $p, q, (, ), \neg, \Rightarrow$ , zaś produkcjami  $S \rightarrow \neg S | (S \Rightarrow S) | p | q$ .

Znajdź gramatykę w postaci normalnej Chomsky'ego generującą ten sam język.

**Zadanie 53.** Czy język  $L_3 = \{w \in \{0, 1, 2\}^* : \neg \exists x \in \{0, 1, 2\}^* \ w = xx\}$  jest bezkontekstowy?

**Zadanie 54.** Czy dopełnienie języka  $L_3$  z poprzedniego zadania, język  $L_4 = \{w \in \{0, 1, 2\}^* : \exists x \in \{0, 1, 2\}^* \ w = xx\}$  jest bezkontekstowy?

*Wskazówka:* (1) rozważ język  $L_4 \cap L$  gdzie  $L = L_0^* L_1^* L_2^* L_3^* L_4^*$ .

(2) Skorzystaj z lematu o pompowaniu, pamiętaj że podział  $w = sztyx$ , którego istnienie postuluje lemat jest taki, że  $|zty| \leq c$ , gdzie  $c$  jest stałą z lematu.

**Zadanie 55.** Zbuduj *NDPDA* i gramatykę bezkontekstową  $G$  dla języka  $\{0,1\}^* - \{www : w \in \{0,1\}^*\}$ .

**Zadanie 56.** (Za 3 punkty, bardzo trudne) Czy istnieje gramatyka bezkontekstowa generująca zbiór tych słów nad alfabetem  $\{0,1\}$ , które nie są postaci  $vww$  dla żadnych słów  $w, v$ , takich że  $|v| = |w|$ ?

**Zadanie 57.** Czy język  $L$  złożony z tych wszystkich słów nad alfabetem  $\{0,1\}$ , które są postaci  $wwv$ , dla pewnych słów  $w, v$ , takich że  $|w| = |v|$  jest bezkontekstowy?

**Zadanie 58.** Czy język  $L$  będący dopełnieniem języka  $L$  z poprzedniego zadania do  $\{0,1\}^*$  jest bezkontekstowy?

**Zadanie 59.** Czy język  $L = \{vww : v, w \in \{a,b,c\}^*, w \neq \varepsilon\}$  jest bezkontekstowy?

**Zadanie 60.** Niech  $L_0$  będzie językiem tych słów nad alfabetem  $\{0,1\}$ , które mają tyle samo zer co jedynek, a  $L_1$  niech będzie językiem wszystkich palindromów. Czy przekrój  $L_0$  z dopełnieniem  $L_1$  jest językiem bezkontekstowym? (mamy tu na myśli dopełnienie do  $\{0,1\}^*$ )

**Zadanie 61.** Niech  $L_0$  będzie językiem tych słów nad alfabetem  $\{0,1\}$ , które mają tyle samo zer co jedynek, a  $L_1$  niech będzie językiem wszystkich palindromów. Czy przekrój  $L_0$  z  $L_1$  jest językiem bezkontekstowym?

**Zadanie 62.** Czy język  $L = \{0^n 1^{n^2} : n \in \mathbb{N}\}$  jest bezkontekstowy?

**Zadanie 63.** Czy zbiór takich słów nad alfabetem  $\{0,1\}$ , które mają parzystą długość, i w których pierwszej połowie jest przynajmniej tyle samo jedynek, co w drugiej połowie, jest bezkontekstowy?

## 9 Więcej zadań o językach regularnych i bezkontekstowych

**Zadanie 64.** Na wykładzie udowodniliśmy, że rozszerzenie definicji automatu skończonego o możliwość poruszania się po słowie wejściowym w obie strony nie zmieni klasy rozpoznawanych języków. Czy podobnie jest w przypadku automatów ze stosem? Mówiąc dokładniej, rozważamy automaty, których relacja przejścia zawiera się w

$$(Q \times T \times U) \times (Q \times U^* \times \{L, R\})$$

gdzie  $Q$  jest skończonym zbiorem stanów („w jakim stanie jestem”),  $T$  jest zbiorem symboli taśmowych („co widzę na taśmie”),  $U$  zbiorem symboli stosowych (z analogicznymi jak dla zwykłych automatów ze stosem założeniami dotyczącymi symbolu dna stosu), zaś  $L$  i  $R$  należy rozumieć jako instrukcje „idź w lewo” i „idź w prawo”. Automaty takie są uruchamiane dla słów, których koniec i początek zaznaczone są dodatkowym symbolem taśmowym, nie występującym wewnątrz słowa. Czy każdy język jaki można rozpoznać przy pomocy takiego automatu jest bezkontekstowy? *Wskazówka: wystarczy rozważać takie deterministyczne automaty akceptujące po osiągnięciu jakiegoś końcowego stanu akceptującego.*

**Zadanie 65.** (za 2 punkty) *Splecenie* definiujemy w tym zadaniu jako najmniejszą relację ternarną na słowach nad pewnym ustalonym alfabetem  $\mathcal{A}$  spełniającą warunki:

- spleceniem słowa pustego ze słowem pustym jest słowo puste;



- jeśli  $w$  jest spleceniem słowa  $s$  ze słowem  $t$ , to jest również spleceniem słowa  $t$  ze słowem  $s$
- jeśli  $v = at$ ,  $a \in \mathcal{A}$  i  $w$  jest spleceniem słowa  $s$  ze słowem  $t$  to  $aw$  jest spleceniem słowa  $s$  ze słowem  $v$

Dla danych dwóch języków  $L_1, L_2 \subseteq \mathcal{A}^*$  zdefiniujemy ich splecenie jako zbiór wszystkich  $w$ , które są spleceniami pewnego  $s \in L_1$  z pewnym  $t \in L_2$ .

Czy splecenie dwóch języków regularnych zawsze jest językiem regularnym?

Czy splecenie dwóch języków bezkontekstowych zawsze jest językiem bezkontekstowym?

Niech  $\mathcal{A}$  będzie skończonym alfabetem i niech  $L \subseteq \mathcal{A}^*$ . Przez  $\text{Lustro}(L)$  będziemy w kolejnych trzech zadaniach rozumieli język  $\{wv^R \in \mathcal{A}^* : wv \in L\}$

**Zadanie 66.** Pokaż, że jeśli  $L$  jest regularny, to  $\text{Lustro}(L)$  również jest regularny.

**Zadanie 67.** Pokaż, że deterministyczny automat skończony rozpoznający język  $\text{Lustro}(L)$  może potrzebować liczby stanów wykładniczo większej niż deterministyczny automat skończony rozpoznający język  $L$ .

**Zadanie 68.** Czy teza Zadania 66. pozostanie prawdziwa, jeśli oba wystąpienia słowa „regularny” zmienimy w nim na „bezkontekstowy”?

Niech języki  $L_{\forall w}$  i  $L_{\exists w}$  będą zdefiniowane jak w Zadaniach 34 – 36.

**Zadanie 69.** Załóżmy, że  $L$  jest CFL, zaś  $w$  jest pewnym ustalonym słowem z  $\Sigma^*$ . Czy wynika z tego że  $L_{\forall w}$  jest CFL?

**Zadanie 70.** Załóżmy, że  $L$  jest CFL, zaś  $w$  jest pewnym ustalonym słowem z  $\Sigma^*$ . Czy wynika z tego że  $L_{\exists w}$  jest CFL?

Przez *język rodzynekowy* będziemy przez chwilę (to znaczy w kolejnych trzech zadaniach i ani chwili dłużej) rozumieć język będący podzbiorem  $L_{a^*ba^*}$ .

Dla danego języka regularnego  $L$  napis  $i(L)$  będzie oznaczał na tej liście indeks języka  $L$ , czyli minimalną liczbę stanów deterministycznego automatu rozpoznającego  $L$ .

**Zadanie 71.** Czy istnieje język rodzynekowy  $L$  taki, że  $L^*$  jest bezkontekstowy ale nie jest regularny?

**Zadanie 72.** Dla ustalonego  $n$  naturalnego niech  $L_n$  będzie językiem składającym się ze wszystkich słów postaci  $a^i b a^j$ , gdzie  $0 \leq i, j \leq 2n$  oraz  $|i - j| \leq 1$ . Udowodnij, że  $i(L_n^*)$  szacuje się (z dokładnością do stałej multiplikatywnej) przez  $n^2$ .

*Wskazówka:* Warto rozważyć słowa postaci  $a^k (ba^{2n})^l$ , dla odpowiednich liczb  $k$  i  $l$ .

**Zadanie 73.** Udowodnij, że dla każdego naturalnego  $n$  istnieje język rodzynekowy  $L_n$ , taki że  $i(L_n L_n) \geq c 2^i(L_n)$ , gdzie  $c$  jest pewną stałą niezależną od  $n$ . Jeśli nie potrafisz pokazać takiego wykładniczego dolnego ograniczenia na wzrost  $i(L_n L_n)$ , to dostaniesz punkty również za inne ograniczenie, jeśli nie będzie mniejsze niż  $ci(L_n)^3$ .

O języku  $A \subseteq \Sigma^*$  powiemy, w kolejnych trzech zadaniach, że jest *konfluentny*, jeśli:

$$\forall w, v \in \Sigma^* \exists x \in \Sigma^* \forall y \in \Sigma^* (wxy \in A \Leftrightarrow vxy \in A).$$

O języku  $A \subseteq \Sigma^*$  powiemy, że jest *jednostajnie konfluentny*, jeśli istnieje taka stała  $c \in \mathbb{N}$ , że:

$$\forall w, v \in \Sigma^* \exists x \in \Sigma^* (|x| \leq c \wedge \forall y \in \Sigma^* (wxy \in A \Leftrightarrow vxy \in A)).$$

**Zadanie 74.** Czy każdy język regularny jest konfluentny?  
Czy każdy język konfluentny jest regularny?

**Zadanie 75.** Pokaż, że jeśli język regularny jest konfluentny, to jest jednostajnie konfluentny.

**Zadanie 76.** Pokaż, że istnieje konfluentny język bezkontekstowy który nie jest jednostajnie konfluentny.

## 10 Zbiory i funkcje rekurencyjne

**Zadanie 77.** Rozszerz definicję zbioru rekurencyjnego tak, aby można było rozważać rekurencyjne zbiory par liczb naturalnych i udowodnij, że jeśli zbiór  $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{N}^2$  jest rekurencyjny, to zbiór  $\{n : \exists m [n, m] \in \mathcal{A}\}$ , czyli rzut  $\mathcal{A}$  na pierwszą oś, jest zbiorem rekurencyjnie przeliczalnym.

**Zadanie 78.** Pokaż, że każdy zbiór rekurencyjnie przeliczalny jest rzutem pewnego zbioru rekurencyjnego, to znaczy jeśli  $B$  jest r.e. to istnieje taki rekurencyjny  $A \subseteq \mathbb{N}^2$  rekurencyjny, że  $B = \{n : \exists m [n, m] \in A\}$ .

**Zadanie 79.** Powtórz, podany na wykładzie, dowód nierozstrzygalności problemu stopu, to znaczy faktu, że zbiór  $K = \{n : \phi_n(n) \in \mathbb{N}\}$  nie jest rekurencyjny.

**Zadanie 80.** Pokaż, że  $\{n : |Dom(\phi_n)| \geq 7\}$  jest rekurencyjnie przeliczalny.

**Zadanie 81.** Niech  $A, B, C, D$  będą zbiorami rekurencyjnie przeliczalnymi, takimi że każda liczba naturalna należy do dokładnie dwóch z nich. Udowodnij, że w takim razie wszystkie cztery zbiory są rekurencyjne.

**Zadanie 82.** Udowodnij, że jeśli  $\phi$  jest niemalejącą całkowitą funkcją rekurencyjną, to zbiór  $\phi(\mathbb{N})$  jej wartości jest rekurencyjny. Czy pozostaje to prawdą bez założenia o całkowitości  $\phi$ ?

**Zadanie 83.** Udowodnij, że każdy niepusty zbiór rekurencyjnie przeliczalny jest postaci  $\phi(\mathbb{N})$  dla pewnej całkowitej funkcji rekurencyjnej  $\phi$ .

**Zadanie 84.** Udowodnij, że każdy nieskończony zbiór rekurencyjnie przeliczalny jest postaci  $\phi(\mathbb{N})$  dla pewnej całkowitej, różnowartościowej funkcji rekurencyjnej  $\phi$ .

**Zadanie 85.** Udowodnij, że zbiór  $\{n : Dom(\phi_n) = \mathbb{N}\}$  nie jest rekurencyjnie przeliczalny.

**Zadanie 86.** (Długie, więc za 2 punkty) Załóżmy, że  $f$  jest funkcją rekurencyjną, całkowitą. Które z poniższych implikacji są prawdziwe?

- jeśli  $A$  jest rekurencyjny, to  $f(A)$  też;
- jeśli  $A$  jest rekurencyjny, to  $f^{-1}(A)$  też;
- jeśli  $A$  jest r.e., to  $f(A)$  też;
- jeśli  $A$  jest r.e., to  $f^{-1}(A)$  też.

Co zmieni się, jeśli założymy, że  $f$  jest funkcją częściową?

**Zadanie 87.** Nie korzystając z tw. Rice'a udowodnij, że zbiór  $B = \{n : \text{Dom}(\phi_n) \text{ i } \mathbb{N} - \text{Dom}(\phi_n) \text{ są nieskończone}\}$  nie jest rekurencyjny.

**Zadanie 88.** Udowodnij, że zbiór  $B = \{n : \text{Dom}(\phi_n) \text{ i } \mathbb{N} - \text{Dom}(\phi_n) \text{ są nieskończone}\}$  z poprzedniego zadania nie jest nawet rekurencyjnie przeliczalny.

**Zadanie 89.** Udowodnij, że zbiór numerów tych programów, które zatrzymują się dla wszystkich argumentów oprócz co najwyżej skończonej liczby, nie jest rekurencyjnie przeliczalny.

**Zadanie 90.** Udowodnij podane na wykładzie twierdzenie Rice'a.

**Zadanie 91.** Poniższe zbiory nie są rozstrzygalne:

1. zbiór numerów tych maszyn Turinga, które obliczają funkcje o dziedzinie różnej od  $\mathbb{N}$ ;
2. zbiór numerów tych maszyn Turinga, które obliczają funkcje całkowitą i których czas działania jest rosnący względem rozmiaru danych;
3. zbiór numerów tych maszyn Turinga, których czas działania dla żadnych danych nie jest liczbą pierwszą;
4. zbiór numerów tych maszyn Turinga, które obliczają funkcje częściowe, których wartościami są wyłącznie liczby pierwsze.

Nierozstrzygalność których z nich daje się udowodnić wprost z twierdzenia Rice'a?

**Zadanie 92.** Udowodnij nierozstrzygalność zbioru z punktu 2. poprzedniego zadania.

**Zadanie 93.** Niech  $A, B \subseteq \mathbb{N}$ . Mówimy, że  $A \leq_{rek} B$  jeśli istnieje całkowita funkcja rekurencyjna  $f$  (zwana redukcją), taka że  $f(x) \in B$  wtedy i tylko wtedy gdy  $x \in A$ . Pokaż, że dla każdych dwóch zbiorów  $A, B \subseteq \mathbb{N}$  istnieje ich najmniejsze ograniczenie górne w sensie  $\leq_{rek}$ , to znaczy taki zbiór  $C$ , że:

- i)  $A \leq_{rek} C$  i  $B \leq_{rek} C$ ,
- ii) jeśli  $D$  jest taki, że  $A \leq_{rek} D$  i  $B \leq_{rek} D$  to  $C \leq_{rek} D$ .

**Zadanie 94.** Czy  $K \leq_{rek} \overline{K}$ ? Czy  $\overline{K} \leq_{rek} K$ ?

**Zadanie 95.** Niech  $T$  będzie zbiorem tych par liczb  $\langle n, m \rangle$  dla których  $\phi_n$  i  $\phi_m$  to ta sama funkcja częściowa.

- i) Pokaż, że  $T$  nie jest rekurencyjnie przeliczalny.
- ii) Czy dopełnienie zbioru  $T$  jest rekurencyjnie przeliczalne?

**Zadanie 96** (Hierarchia arytmetyczna). Niech  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  będzie pewną ustaloną obliczalną bijekcją. Oznaczmy klasę zbiorów rekurencyjnych jako  $\Sigma_0$ . Dla danego  $\Sigma_i$  niech  $\Pi_i = \{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \in \Sigma_i\}$ , zaś  $A \in \Sigma_{i+1}$ , jeśli istnieje  $B \in \Pi_i$ , takie że  $A = \{n \in \mathbb{N} : \exists m f(n, m) \in B\}$ .

Niech  $L$  będzie zbiorem numerów tych niepustych funkcji rekurencyjnych których dziedzina jest skończona. Niech  $i$  jest najmniejsze dla którego zachodzi  $L \in \Sigma_i$ ?

**Zadanie 97.** Niech  $A, B$  będą podzbiorami zbioru liczb naturalnych. Załóżmy, że  $f$  jest redukcją świadczącą o tym, że  $A \leq_{rek} B$ . Załóżmy, że  $f$  jest „na” (tzn. jej obrazem jest cały zbiór liczb naturalnych). Pokaż, że w takim razie zachodzi również  $B \leq_{rek} A$ .

**Zadanie 98.** Podzbiór zbioru liczb naturalnych nazywamy co-r.e. jeśli jego dopełnienie jest rekurencyjnie przeliczalne. Odcinkami początkowymi zbioru liczb naturalnych nazywamy zbiory postaci  $\{1, 2, \dots, n\}$  dla  $n \in \mathbb{N}$ . Oznaczmy przez  $B$  zbiór numerów tych programów, których dziedziny są odcinkami początkowymi zbioru liczb naturalnych.

a. Czy zbiór  $B$  jest co-r.e.?

b. Udowodnij, że istnieje zbiór trójek liczb naturalnych  $A$ , który jest co-r.e. i którego rzut na pierwszą oś jest zbiorem  $B$ . *Uwaga. Wymaga to oczywiście milczącego rozszerzenia definicji zbiorów co-r.e. na zbiory trójek liczb.*

**Zadanie 99.** Niech  $f$  będzie pewną całkowitą funkcją rekurencyjną. O każdym z następujących warunków rozstrzygnij, czy implikuje on rekurencyjność zbioru  $f(\mathbb{N})$ , to znaczy obrazu zbioru wszystkich liczb naturalnych przez funkcję  $f$ .

a. Istnieje skończony podzbiór  $A$  zbioru liczb naturalnych, taki że jeśli  $f(i) > f(i+1)$  to  $i+1 \in A$ .

b. Istnieje skończony podzbiór  $A$  zbioru liczb naturalnych, taki że jeśli  $f(i) > f(i+1)$  to  $f(i+1) \in A$ .

**Zadanie 100.** Niech  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Udowodnij że następujące warunki są równoważne:

- $\mathcal{D}$  jest przeliczalny;
- istnieje  $B \subseteq \mathbb{N}$  taki że dla każdego  $A \in \mathcal{D}$  zachodzi  $A \leq_{rek} B$ .

*Wskazówka:* Dla ustalonej całkowitej funkcji rekurencyjnej  $f$  i zbioru  $B \subseteq \mathbb{N}$ , ile może być takich zbiorów  $A \subseteq \mathbb{N}$ , że  $f$  jest redukcją, świadczącą o tym, że  $A \leq_{rek} B$ ?

**Zadanie 101.** Oznaczmy przez  $Tot$  zbiór  $\{n \in \mathbb{N} : Dom(M_n) = \mathbb{N}\}$ , zaś przez  $Nemp$  zbiór  $\{n \in \mathbb{N} : Dom(M_n) \neq \emptyset\}$ .

(a) Czy prawdą jest, że  $Nemp \leq_{rek} Tot$ ?

(b) Czy prawdą jest, że  $Tot \leq_{rek} Nemp$ ?

**Zadanie 102.** Czy każda częściowa funkcja rekurencyjna jest podzbiorem jakiejś całkowitej funkcji rekurencyjnej?

**Zadanie 103.** Czy każdy nieskończony podzbiór  $\mathbb{N}$  zawiera jako swój podzbiór jakiś nieskończony zbiór rekurencyjnie przeliczalny? *Wskazówka: Inteligentna diagonalizacja.*

## 11 Maszyny Turinga

**Uwaga:** Rozwiązując zadania z tego rozdziału należy dość dokładnie podać ideę konstrukcji, ale nie wymaga się wypisywania listy instrukcji konstruowanej maszyny.

**Zadanie 104.** Udowodnij, że zastąpienie w definicji maszyny Turinga taśmy nieskończoną płaszczyzną nie zmienia klasy funkcji obliczalnych.

**Zadanie 105.** Skonstruuj maszynę Turinga rozpoznającą język  $A = \{ww^R : w \in \{0,1\}^*\}$

**Zadanie 106** (Maszyna Minsky'ego). (za 2 punkty) a. Zauważ, że problem stopu dla maszyn podobnych do dwukierunkowego automatu ze stosem, lecz posiadających dwa stosy, jest nierozstrzygalny. Dokładniej mówiąc, instancją problemu jest teraz lista instrukcji dla automatu o dwóch stosach, ale bez taśmy wejściowej. Pytamy natomiast o to, czy automat uruchomiony w stanie  $q_0$  i przy dwóch pustych stosach, kiedykolwiek się zatrzyma.

b. Wywnioskuj z a. że analogiczny problem pozostaje nierozstrzygalny jeżeli dwa stosy zastąpimy czterema licznikami (tzn. stosami o jednym symbolu stosowym, nie licząc symbolu dna stosu).

c. Wywnioskuj z b. że analogiczny problem pozostaje nierozstrzygalny jeżeli cztery liczniki zastąpimy dwoma.

**Zadanie 107.** *Skanująca maszyna Turinga* będzie dana przez piątkę  $\langle \Sigma, Q, q_0, q_F, \delta \rangle$ , gdzie  $\Sigma$  jest skończonym alfabetem taśmowym,  $Q$  skończonym zbiorem stanów,  $q_0, q_F \in Q$  to odpowiednio stany początkowy i końcowy, zaś  $\delta : (Q \setminus \{q_F\}) \times \Sigma \rightarrow Q \times (\Sigma \cup \{B\})$  jest funkcją przejścia. Maszyna działa tak, że na początku głowica ustawiona jest w stanie  $q_0$  na pierwszym symbolu słowa wejściowego. Gdy w stanie  $q$  głowica widzi symbol  $a \in \Sigma$ , to przechodzi do stanu  $q'$ , zamiast  $a$  wpisuje  $a'$ , gdzie  $\delta(q, a) = (q', a')$ . Następnie jest przesuwana o jedną komórkę w prawo, chyba że  $a$  było blankiem, wtedy wiadomo że przeskanowano cały dotychczas używany fragment taśmy i głowica jest przesuwana (w aktualnym stanie) ponownie nad pierwszy symbol na taśmie, skąd ponownie wędruje w prawo itd. Obliczenie kończy się, gdy głowica znajduje się w stanie  $q_F$ .

Czy problem ustalenia, dla danej skanującej maszyny Turinga  $M$  i słowa wejściowego  $w$ , czy  $M$  uruchomiona na  $w$  się zatrzyma, jest rozstrzygalny?

**Zadanie 108.** Tak samo jak w poprzednim zadaniu, tylko odpowiedni fragment brzmi: "Maszyna działa tak, że na początku głowica ustawiona jest w stanie  $q_0$  na pierwszym symbolu słowa wejściowego. Gdy w stanie  $q$  głowica widzi symbol  $a \in \Sigma$ , to przechodzi do stanu  $q'$ , zamiast  $a$  wpisuje  $a'$ , gdzie  $\delta(q, a) = (q', a')$ . Następnie jest przesuwana o jedną komórkę w prawo, chyba że  $a$  było blankiem, wtedy wiadomo że przeskanowano cały dotychczas używany fragment taśmy i głowica zawraca, to znaczy po wykonaniu każdej kolejnej instrukcji przesuwana jest o jedną komórkę w lewo, aż w końcu ponownie znajdzie się nad pierwszym symbolem na taśmie. Wtedy ponownie zawraca w prawo itd."

## 12 Nierozstrzygalność. Kanoniczne zadania.

**Zadanie 109.** Powtórz, podany na wykładzie, dowód nierozstrzygalności Problemu Odpowiedniości Posta.

**Zadanie 110.** Dla gramatyki bezkontekstowej  $G$  niech  $L_G$  oznacza generowany przez nią język. Skorzystaj z nierozstrzygalności problemu odpowiedniości Posta aby pokazać, że zbiór tych par gramatyk  $G, H$  dla których zachodzi  $L_G \cap L_H \neq \emptyset$  nie jest rekurencyjny. Czy jest on rekurencyjnie przeliczalny?

**Zadanie 111.** (za 2 punkty) Udowodnij, że nie istnieje algorytm rozstrzygający, dla danej gramatyki bezkontekstowej  $G$  i alfabetu  $A$ , czy  $A^* = L(G)$

**Zadanie 112.** Czy istnieje algorytm rozstrzygający, dla danych dwóch gramatyk bezkontekstowych  $G$  i  $H$ , czy  $L(G) = L(H)$ ?

**Zadanie 113.** Udowodnij nierozstrzygalność problemu sprawdzenia dla danego procesu Thuego  $\Pi$  i słowa  $w$  czy zbiór  $A_w = \{v : w \xrightarrow{\Pi}^* v\}$  jest skończony.

*Wskazówka (nieobowiązkowa, jak wszystkie wskazówki): Rozważ maszyny Turinga z dodanym gdzieś na taśmie licznikiem, który jest zwiększany o jeden przy każdym ruchu wykonywanym przez maszynę. Naśladuj dowód nierozstrzygalności problemu słów.*

**Zadanie 114.** (za 2 punkty) Rozpatrzmy skończony zbiór par słów  $P$  i binarną relację  $\rightarrow$  na słowach zdefiniowaną jak następuje:  $w \rightarrow_p v$  wtedy i tylko wtedy gdy istnieje para  $\langle a, b \rangle \in P$  taka, że  $w = ax$  i  $v = xb$  gdzie  $x$  jest pewnym słowem. Niech  $\xrightarrow_p^*$  będzie przechodnim domknięciem  $\rightarrow_p$  (to znaczy najmniejszą relacją przechodnią zawierającą  $\rightarrow_p$ ).

Czy problem: dane  $P, x, y$ , czy  $x \xrightarrow_p^* y$ ? jest rozstrzygalny?

**Zadanie 115.** (trudne, za 2 punkty) Funkcję  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  nazywamy funkcją Conway'a jeśli istnieją liczby naturalne  $p, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_p, b_p$  takie, że dla każdego  $n$  jeśli  $n = k \bmod p$  to  $f(n) = na_k/b_k$ . Pokaż, że nie ma algorytmu, który dla danych  $p, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_p, b_p$  odpowiedziałby, czy dla definiowanej przez te współczynniki funkcji Conway'a istnieje  $m$  takie, że  $f^m(2) = 1$  gdzie  $f^m$  oznacza funkcję  $f$  złożoną  $m$  razy ze sobą.

**Zadanie 116.** (za 2 punkty) Udowodnij nierozstrzygalność następującego problemu: dany jest skończony zbiór kolorów  $C$ , zawierający co najmniej kolory: *czerwony* i *biały*, oraz zbiór  $N \subseteq C^4$  czwórek kolorów, uznanych za *nieestetyczne*. Mamy nieskończenie wiele kwadratowych kafelków każdego koloru o boku długości 1. Czy istnieje kwadrat (o całkowitych wymiarach i boku nie mniejszym niż 2), który można wypełnić kafelkami w taki sposób by w lewym dolnym i w lewym górnym narożniku znalazł się czerwony kafelek, pozostałe kafelki dolnego i górnego brzegu były białe, oraz by w całym kwadracie nie pojawiła się nieestetyczna sekwencja kafelków, tj. cztery sąsiadujące kafelki:

$c_1$	$c_2$
$c_3$	$c_4$

takie że  $(c_1, c_2, c_3, c_4) \in N$ .

Na wykładzie mówiliśmy o nierozstrzygalności **dziesiątego problemu Hilberta** (nazwijmy go H10). Problem ten polega na tym, aby dla danego układu równań diofantycznych, to znaczy równań między wielomianami wielu zmiennych o współczynnikach całkowitych, odpowiedzieć, czy układ ten ma rozwiązanie w liczbach naturalnych.

**Zadanie 117.** Niech H10prim będzie problemem ustalenia, dla danego układu równań diofantycznych, czy układ ten ma rozwiązanie w liczbach całkowitych.

**a (od -1 do 6 punktów).** Pokaż, że  $H10prim \leq_{rek} H10$ .

**b (od -1 do 6 punktów)** Pokaż, że  $H10 \leq_{rek} H10prim$ .

**Zadanie 118.** Niech H10bis będzie problemem H10 w którym ograniczamy się jedynie do równań diofantycznych, w którym każdy wielomian jest stopnia co najwyżej dwa. Czy H10bis pozostaje nierozstrzygalny?

*Wskazówka (do tego zadania i poprzedniego):* W jednym z zadań możesz zechcieć odwołać się do faktu, że każda liczba naturalna daje się przedstawić jako suma czterech kwadratów liczb naturalnych.

## 13 Nierozstrzygalność. Różne inne zadania.

**Zadanie 119.** Udowodnij, że problem z dziesiątego problemu Hilberta (H10), to znaczy problem czy dany układ równań diofantycznych (czyli równań między wielomianami wielu zmiennych o współczynnikach całkowitych) ma rozwiązanie w liczbach całkowitych, pozostaje nierozstrzygalny jeśli, zamiast o rozwiązanie w liczbach całkowitych, będziemy pytać o rozwiązanie w liczbach całkowitych nieparzystych. Wolno oczywiście skorzystać z nierozstrzygalności H10.

**Zadanie 120.** Czy istnieje algorytm rozstrzygający, dla danej gramatyki bezkontekstowej  $G$ , czy istnieje słowo  $w$ , takie że  $ww^R w \in L(G)$ ?

**Zadanie 121.** Dla danych funkcji  $f, g, h : \{0, 1, \dots, p-1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, p-1\}$  i danego nieskończonego ciągu liczb naturalnych  $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ , niech  $F_{f,g,h}(a_1, a_2, \dots)$  będzie ciągiem liczb naturalnych, którego  $i$ -ty element jest równy  $f(a_{i-1}) +_p g(a_i) +_p h(a_{i+1})$ , gdzie  $+_p$  oznacza dodawanie modulo  $p$  (przyjmujemy, że  $a_0 = 0$ ). Udowodnij, że problem:

Dane funkcje  $f, g$  i  $h$  oraz skończone ciągi  $(b_1, b_2, \dots, b_k)$  i  $(c_1, c_2, \dots, c_k)$ . Czy istnieje liczba iteracji  $n$  taka, że  $F_{f,g,h}^n(b_1, b_2, \dots, b_k, 0, 0, 0, \dots) = (c_1, c_2, \dots, c_k, 0, 0, 0, \dots)$ ? jest nierozstrzygalny.

**Zadanie 122.** Jak każdy pamięta, deterministyczny automat ze stosiem, to urządzenie zadane przez skończony zbiór instrukcji w formacie: *jeśli widzisz na taśmie wejściowej a, jesteś*

w stanie  $q$ , a z czubka stosu zdjąć  $b$ , to przejdź do stanu  $q'$ , a na czubek stosu włóż słowo  $w$ . Taki automat czyta słowo wejściowe litera po literze, zmieniając przy tym stan jak zwykły automat skończony, a do tego jeszcze buduje sobie stos. Czy istnieje algorytm odpowiadający, dla danych dwóch deterministycznych automatów ze stosem, czy istnieje niepuste słowo wejściowe, po przeczytaniu którego, oba te automaty będą miały na swoich stosach takie same ciągi symboli?

**Zadanie 123.** Przez gramatykę bezkontekstową z kontekstowym znikaniem będziemy w tym zadaniu rozumieć obiekt różniący się od gramatyki bezkontekstowej jedynie obecnością – w zbiorze produkcji – dodatkowych reguł postaci  $w \rightarrow \varepsilon$ , gdzie  $w$  jest słowem złożonym z nieterminali, zaś  $\varepsilon$  jest jak zwykle słowem pustym.

Przez problem znikania rozumiemy w tym zadaniu problem w którym dana jest gramatyka ze znikaniem, mająca symbol początkowy  $S$  i zbiór produkcji  $\Pi$ , i w którym pytamy czy  $S \xrightarrow{*}_{\Pi} \varepsilon$ , gdzie  $\varepsilon$  jest jak zwykle słowem pustym.

Udowodnij, że problem znikania jest nierozstrzygalny

**Zadanie 124.** Powiemy, że semiproces Thuego  $\Pi$  jest bezkontekstowy, jeśli dla każdej pary  $[w, v] \in \Pi$  słowo  $w$  składa się z jednej litery. Czy problem słów dla bezkontekstowych semiprocesów Thuego jest rozstrzygalny?

**Zadanie 125.** Powiemy, że semiproces Thuego  $\Pi$  jest prawie bezkontekstowy, jeśli dla każdej pary  $[w, v] \in \Pi$  jedno ze słów  $w$  i  $v$  składa się tylko z jednej litery, drugie zaś z dwóch liter. Czy problem słów dla prawie bezkontekstowych semiprocesów Thuego jest rozstrzygalny?

*Uwaga: Użyta w tym i poprzednim zadaniu nomenklatura (pojęcia procesów bezkontekstowych i prawie bezkontekstowych) została wymyślona tylko by po to, by wygodniej było sformułować te zadania i nie ma wiele wspólnego z jakimkolwiek standardem.*

**Zadanie 126.** Semiproces Thuego  $\Pi$  nad alfabetem  $\{0, 1\}$  nazwiemy, na potrzeby tego zadania, fajnym, jeśli każda produkcja  $\langle l, r \rangle \in \Pi$  ma własność  $|l|_1 = |r|_1$  (to znaczy ma po lewej stronie tyle samo jedynek co po prawej). Udowodnij, że problem czy dla danego słowa  $w$  i danego fajnego semiprocesu Thuego  $\Pi$  zachodzi  $1111 \xrightarrow{*}_{\Pi} w$ , jest nierozstrzygalny. Wskazówka: Typowe i mało skomplikowane.

**Zadanie 127.** Automat *niedeterministyczny ruszający dwiema nogami* zdefiniujemy sobie w tym zadaniu jako piątkę  $\langle \Sigma, Q, q_0, F, \delta \rangle$ , gdzie  $\Sigma$  jest skończonym alfabetem,  $Q$  skończonym zbiorem stanów,  $q_0 \in Q$  jest stanem początkowym,  $F \subseteq Q$  jest zbiorem stanów akceptujących, a  $\delta \subseteq Q \times \Sigma \times \Sigma \times Q \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$  jest relacją przejścia.

Relacja przejścia jest rozumiana następująco: jeśli  $\delta(q, a_1, a_2, q', b_1, b_2)$ , to gdy automat jest w stanie  $q$ , lewą nogę ma na symbolu  $a_1$ , a prawą nogę na symbolu  $a_2$ , to możemy przejść do stanu  $q'$ , przesunąć lewą nogę o  $b_1$  symboli w prawo i przesunąć prawą nogę o  $b_2$  symboli w prawo.

Automat rozpoznaje pary słów  $w_l, w_p$  z których każde jest postaci  $a(\Sigma \setminus \{a, z\})^*z$ , dla pewnych ustalonych symboli  $a, z \in \Sigma$ .

Na początku działania automat jest w stanie  $q_0$  i ma lewą nogę na pierwszej literze (czyli  $a$ ) słowa  $w_l$ , a prawą na pierwszej literze (czyli  $a$ ) słowa  $w_p$ . Automat akceptuje parę słów, jeśli możliwe jest aby znalazł się oboma nogami na literach  $z$  i przeszedł wtedy w stan  $q \in F$ .

Czy problem totalności automatu niedeterministycznego ruszającego dwiema nogami jest rozstrzygalny? Przez problem totalności rozumiemy tu dopełnienie problemu istnienia jakiegokolwiek pary słów, o podanej powyżej postaci, ale nie akceptowanej przez dany automat.

**Zadanie 128.** Przez funkcję liniową będziemy w tym zadaniu rozumieć funkcję postaci  $h(x) = ax + b$ , gdzie  $a, b$  są liczbami naturalnymi.

*Instancją problemu skaczącej pchły* będzie w tym zadaniu skończony ciąg funkcji liniowych  $= \langle f_1, g_1, \dots, f_k, g_k \rangle$ . Powiemy, że *instancja*  $\mathbf{c} = \langle f_1, g_1, \dots, f_k, g_k \rangle$  *problemu skaczącej pchły ma rozwiązanie* jeśli istnieje niepusty ciąg  $s_1, s_2, \dots, s_l$  liczb ze zbioru  $\{1, 2, \dots, k\}$  taki, że punkt  $\langle f_{s_l} f_{s_{l-1}} \dots f_{s_1}(0), g_{s_l} g_{s_{l-1}} \dots g_{s_1}(0) \rangle$  leży na prostej  $y = x$  (zatem wyobrażamy sobie, że pchła zaczyna skakać w punkcie  $\langle 0, 0 \rangle$ , w każdym kolejnym skoku umie przemieścić się z punktu  $\langle x, y \rangle$  do dowolnego spośród  $\langle f_i(x), g_i(y) \rangle$ ; pytamy o to, czy potrafi kiedykolwiek znów znaleźć się w punkcie o obu współrzędnych równych).

Pokaż, że problem skaczącej pchły, to znaczy problem czy dla danej instancji istnieje rozwiązanie, jest nierozstrzygalny.

**Zadanie 129.** Niech  $\phi(x, y)$  będzie pewną formułą arytmetyki liczb naturalnych z dodawaniem i mnożeniem, z dwiema zmiennymi wolnymi.

Napisz zdanie  $\psi$  arytmetyki liczb naturalnych z dodawaniem i mnożeniem, które będzie prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją liczba  $l \geq 1$  i skończony ciąg liczb naturalnych  $a_1, a_2, \dots, a_l$ , taki, że  $a_1 = 1$ ,  $a_l = 2$ , oraz taki, że dla każdego  $1 \leq i \leq l-1$  zachodzi  $\phi(a_i, a_{i+1})$ .

*Wskazówka:* Możesz na przykład użyć chińskiego twierdzenia o resztach (choć są również inne rozwiązania). Posłuż się makrami, podobnymi do tych, których używaliśmy na wykładzie — na przykład *Pierwsza(z)*, *Kolejne-Pierwsze(z, t)*.

W kolejnych dwóch zadaniach, po napisanym na skończonej taśmie słowie poruszają się żuczki. Dwa albo trzy. Każdy z żuczków jest rodzajem dwukierunkowego deterministycznego automatu skończonego, to znaczy ma skończony zbiór stanów i funkcję przejścia (inną dla każdego żuczka), która w zależności od tego w jakim jest stanie, jaki symbol widzi w aktualnej komórce taśmy, i które z pozostałych żuczków znajdują się wraz z nim w aktualnej komórce taśmy każe mu odpowiednio zmienić stan i poruszyć się w lewo lub w prawo (dla porządku zakładamy, że końce słowa oznaczone są unikalnymi symbolami, dzięki czemu żuczek nigdy nie opuści taśmy i że na początku wszystkie żuczki stoją na początku słowa, w pewnym ustalonym stanie początkowym). Kolejny ruch żuczka, czyli wykonanie funkcji przejścia, następuje zawsze wtedy, gdy usłyszy on tyknięcie zegara.

Przez *problem niepustości* rozumiemy pytanie, czy dla danych funkcji przejścia żuczków istnieje słowo, które żuczki zaakceptują, to znaczy takie, na którym któryś z nich osiągnie, po skończonej liczbie kroków, ustalony stan akceptujący.

**Zadanie 130.** Dwa synchroniczne żuczki. Pokaż, że problem niepustości jest nierozstrzygalny jeśli rozważamy pary (funkcji dla) żuczków i zakładamy, że są one synchroniczne, to znaczy oba słyszą tykanie tego samego zegara.

**Zadanie 131.** Trzy asynchroniczne żuczki. Pokaż, że z tezy Zadania 130 wynika, że nierozstrzygalny jest również problem niepustości dla trójek (funkcji dla) żuczków jeśli zakładamy, że są one asynchroniczne, to znaczy w każdej komórce taśmy słychać osobny zegarek, który tyka jak chce (np. czasem wolniej czasem szybciej). *Uwaga.* Różne zachowania zegarków mogą tu skutkować różnymi obliczeniami, czyli różnymi zachowaniami żuczków. Myślimy o tym jak o obliczeniu niedeterministycznym: słowo zostaje zaakceptowane, gdy istnieje zachowanie zegarków, które prowadzi do obliczenia akceptującego.

**Komentarz.** Nie znam rozwiązania zadania o dwóch asynchronicznych żuczkach.

W kolejnych dwóch zadaniach rozważamy płaszczyznę, po której biega  $k$  psów. Startują one jednocześnie z początku układu współrzędnych, a następnie każdy z nich, w każdej jednostce czasu, przesuwa się o jednostkę odległości na północ, południe, wschód lub zachód (zatem po każdym takim kroku psy znajdują się w punktach kratowych płaszczyzny). O kierunku kolejnego ruchu psa decyduje jego funkcja przejścia (psy są różne, i mogą mieć różne funkcje przejścia). Argumentami funkcji przejścia są: aktualny stan psa (każdy pies ma



skończoną liczbę stanów) oraz zapach punktu kratowego aktualnie zajmowanego przez psa. Przez zapach pola rozumiemy tu informację o tym, które psy odwiedziły już to pole.

Wśród stanów każdego psa wyróżniamy jeden stan szczekający.

Mówiąc bardziej formalnie, funkcja przejścia  $i$ -tego psa  $\delta_i$  ma typ  $\delta_i : Q_i \times Z \rightarrow Q_i \times \{N, S, E, W\}$ , gdzie  $Q_i$  to skończony zbiór stanów  $i$ -tego psa, zaś  $Z = \mathcal{P}(\{1, \dots, k\})$  jest zbiorem zapachów (czyli rodziną wszystkich podzbiorów zbioru wszystkich biegających psów). Funkcja ruchu  $i$ -tego psa  $\hat{\delta}_i$  definiowana jest przy pomocy  $\delta_i$  w naturalny dla teorii automatów skończonych sposób. Wreszcie zapach  $z(p, t)$  punktu kratowego  $p$  w chwili  $t$  jest równy  $z(p, t-1) \cup S(p, t-1)$ , gdzie  $S(p, t)$  to zbiór numerów psów znajdujących się w punkcie  $p$  w chwili  $t$ . W chwili zerowej zapachem wszystkich punktów jest zapach pusty.

Problem szczeku dla układu  $k$  psów jest następujący: dane funkcje przejścia  $k$  psów, oraz informacja o tym które stany są szczekające. Czy któryś z biegających zgodnie z tymi funkcjami psów osiągnie kiedyś stan szczekający?

**Zadanie 132.** Czy problem szczeku dla układu 3 psów jest rozstrzygalny?

**Zadanie 133.** Czy problem szczeku dla układu z jednym psem jest rozstrzygalny?

**Zadanie 134.** Czy problem niepustości języka  $L_G \cap L_G L_G$ , dla danej gramatyki bezkontekstowej  $G$ , jest rozstrzygalny?

**Zadanie 135.** Automat skończony z dwoma stoperami czyta słowo wejściowe jak zwykły **niedeterministyczny** automat skończony, ale oprócz skończonego zbioru stanów ma dwa stopery. Automat może, gdy uzna to za stosowne, uruchomić<sup>1</sup> lub zatrzymać, każdy ze stoperów, z tym że raz zatrzymanego stopera nie da się już ponownie uruchomić. Uruchomiony stoper działa jak licznik, zwiększający się o 1 z każdym krokiem automatu. Po zatrzymaniu obu stoperów automat umie porównać ich wskazania i uzależnić swój kolejny stan od tego czy te wskazania są równe czy różne (zwróć uwagę, że to jest jedyny sposób w jaki automat może dowiedzieć się czegośkolwiek o wskazaniach stoperów). Pokaż, że problem totalności dla automatów skończonych z dwoma stoperami jest nierozstrzygalny.

## 14 Niedeterministyczne maszyny Turinga i klasa NP

**Zadanie 136.** Pokaż, że wielomianową maszynę niedeterministyczną można przerobić tak, aby zgadywała rozwiązanie wcześniej niż pozna dane. Dokładniej rzecz ujmując, udowodnij że jeśli zbiór  $A$  należy do klasy NP, to istnieją wielomiany  $p, q$  oraz niedeterministyczna maszyna Turinga  $M$  rozpoznająca  $A$ , działająca dla danego  $n$  w następujący sposób:  $M$  wyznacza na taśmie blok klatek o długości  $p(|n|)$  - zatem interesuje ją wielkość  $n$ , ale nie jego dokładna wartość - po czym niedeterministycznie i nie czytając  $n$  zapełnia ten blok ciągiem zer i jedynek. Dopiero następnie czyta  $n$  i przechodzi do fazy, w której obliczenie jest już deterministyczne i nie zabiera więcej niż  $q(|n|)$  kroków.

**Zadanie 137.** Pokaż, że jeśli zbiór  $A \subseteq \mathbb{N}^2$  jest w P i  $p$  jest wielomianem, to zbiór  $\{n : \exists m |m| \leq p(|n|) \text{ i } [n, m] \in A\}$ , czyli rodzaj rzutu  $A$  na pierwszą oś, jest w NP.

**Zadanie 138.** Pokaż, że każdy zbiór w NP jest rzutem pewnego zbioru z P to znaczy jeśli  $B$  jest w NP, to istnieje wielomian  $p$  i zbiór  $A \subseteq \mathbb{N}^2$  należący do P i taki, że  $B = \{n : \exists m |m| \leq p(|n|) \text{ i } [n, m] \in A\}$ .

---

<sup>1</sup>Z wartością równą zero.

## 15 Redukcje wielomianowe i NP-trudność

**Zadanie 139.** Pokaż, że  $5SAT \leq_p 3SAT$ .

**Zadanie 140.** (za 2 punkty) Problem STASI<sup>2</sup> jest taki: mamy dany graf nieskierowany i liczbę  $k$ . Czy da się rozstawić  $k$  agentów w wierzchołkach grafu tak, aby każdy wierzchołek w którym nie stoi agent miał (co najmniej jednego) agenta za sąsiada? Pokaż, że  $3SAT \leq_p STASI$ .

*Wskazówka: To nie jest trudne. Idea jest podobna jak przy dowodzie faktu, że  $3SAT \leq_p 3COL$ , który był na wykładzie. Tylko łatwiej*

**Zadanie 141.** (za 2 punkty) Niech  $H$  oznacza problem cyklu Hamiltona dla grafów nieskierowanych (tzn. język tych wszystkich grafów nieskierowanych, w których istnieje ścieżka zamknięta przechodząca dokładnie raz przez każdy wierzchołek).

Niech  $H_d$  oznacza problem cyklu Hamiltona dla grafów skierowanych. Pokaż, że  $H \leq_p H_d$  i  $H_d \leq_p H$ .

*Wskazówka: W trudniejszą stronę trzeba każdy wierzchołek zastąpić trzema.*

**Zadanie 142.** (za 2 punkty) Klauzula nazywa się *hornowską* jeśli co najwyżej jeden z jej literalów jest niezanegowany. Pokaż, że problem HORNSAT spełnialności formuł, w postaci CNF, których każda klauzula jest hornowska, jest w P.

**Zadanie 143.** (za 2 punkty) Pokaż, że problem spełnialności formuł w koniunkcyjnej postaci normalnej, w których każda klauzula jest alternatywą co najwyżej dwóch literalów jest w klasie  $\mathcal{P}$ . (Patrz definicja na stronie 375 polskiego wydania książki Hopcrofta i Ullmana. Tłumaczka z bożej łaski tłumaczy CNF jako PNK).

**Zadanie 144.** Pokaż, że  $3SAT \leq_p 3SAT_3$ . To ostatnie to 3SAT ograniczony tylko do formuł, w których żadna zmienna nie występuje więcej niż 3 razy.

**Zadanie 145.** (za 2 punkty) Udowodnij, że problem cyklu Hamiltona jest NP-zupełny.

**Zadanie 146.** Problem komiwojażera jest taki: dany jest graf nieskierowany pełny, którego krawędzie etykietowane są liczbami całkowitymi. Waga drogi w grafie jest definiowana jako suma wag krawędzi należących do tej drogi. Dana liczba  $k$ . Czy istnieje w grafie cykl Hamiltona o wadze mniejszej niż  $k$ ?

Pokaż, że problem komiwojażera jest NP-zupełny. Wolno skorzystać z NP-zupełności problemu Hamiltona.

*Komentarz: Problem komiwojażera to jedyny kawałek teorii informatyki, który trafił do kultury masowej, stając się w ten sposób kolegą Myszkii Miki.*

**Zadanie 147.** Pokaż, że jeśli istnieje wielomianowy algorytm wskazujący, dla danego przykładu problemu komiwojażera, cykl nie więcej niż dwa razy dłuższy od optymalnego, to  $\mathcal{P} = \text{NP}$ .

*Wskazówka: To wcale nie jest trudne zadanie, z całą pewnością nie zasługuje na dwie gwiazdki. Podobnie jak w poprzednim trzeba się odwołać do NP-zupełności problemu Hamiltona.*

**Zadanie 148.** Pokaż, że jeśli ograniczymy się do przykładów problemu komiwojażera, w których wagi krawędzi spełniają nierówność trójkąta, to znaczy dla każdych wierzchołków  $v_1, v_2, v_3$  zachodzi  $d(v_1, v_2) + d(v_2, v_3) \geq d(v_1, v_3)$ , to istnieje wielomianowy algorytm znajdujący cykl Hamiltona o wadze nie więcej niż dwa razy większej od optymalnej.

**Zadanie 149.** Jaka jest złożoność problemu  $SAT_2$ , tzn. problemu spełnialności formuł w postaci CNF, w których żadna zmienna nie występuje więcej niż 2 razy?

<sup>2</sup>To się naprawdę nazywa "Problem zbioru dominującego". Zadanie sformułowałem, tak jak jest teraz sformułowane, w latach 90, kiedy było modne śmiać się z NRD (wiecie co to było NRD?), bo wydawało się, że u nas było inaczej. Wydawało się.

**Zadanie 150.** Udowodnij, że problem istnienia w danym grafie o  $n$  wierzchołkach klikli mającej  $n/2$  wierzchołków jest NP-zupełny.

**Zadanie 151.** (za 2 punkty) Udowodnij, że jeśli istnieje wielomianowy algorytm znajdujący w danym grafie klikę wielkości co najmniej połowy klikli maksymalnej<sup>3</sup>, to istnieje również wielomianowy algorytm znajdujący w danym grafie klikę wielkości co najmniej  $1/\sqrt{2}$  klikli maksymalnej.

**Zadanie 152.** Rozważmy następujący *problem spełnialności dla zdecydowanej większości klauzul*: Dane różne klauzule rachunku zdań  $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ . Czy można podstawić wartości 0 i 1 za zmienne zdaniowe tak aby więcej niż  $9/10$  spośród klauzul  $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$  przyjęła wartość logiczną 1? Udowodnij, że *problem spełnialności dla zdecydowanej większości klauzul* jest NP-zupełny. Przypominam, że klauzulą nazywamy formułę postaci  $l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_k$ , gdzie  $l_i$  są literałami, to znaczy zmiennymi zdaniowymi lub ich negacjami.

*Wskazówka: Skorzystaj z NP-zupełności SAT.*

**Zadanie 153.** Niech  $\text{KLIKA}_c$  będzie problemem istnienia w danym grafie o  $n$  wierzchołkach klikli zawierającej nie mniej niż  $n/c$  wierzchołków. Pokaż, że dla każdych  $c, c'$  zachodzi  $\text{KLIKA}_c \leq_p \text{KLIKA}_{c'}$ .

**Zadanie 154.** Rozważmy następujący *problem smutnych strażników*. Dany jest pewien zbiór strażników  $s_1, s_2, \dots, s_l$ . Strzegą oni obiektów  $a_1, a_2, \dots, a_k$ . Odbywa się to tak, że każdy strażnik  $s_i$  ma w swoim kantorku dwa ekrany telewizyjne  $E_i$  i  $F_i$  i na każdym z tych ekranów widzi, za pośrednictwem nieruchomej kamery, pewien niezmienny zbiór obiektów (odpowiednio  $Z_{E_i}$  i  $Z_{F_i}$ , zbiory te oczywiście niekoniecznie muszą być parami rozłączne). Powiemy, że *strażników można rozweselić* jeśli da się przestawić u każdego z nich jeden telewizor na kanał gdzie akurat transmitują mecz, ale w taki sposób, że każdy obiekt ze zbioru  $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$  pozostaje pod obserwacją na jakimś nieprzestawionym telewizorze.

Pokaż, że problem rozstrzygnięcia, dla danego przykładu problemu smutnych strażników, czy strażników da się rozweselić, jest NP-zupełny.

**Zadanie 155.** Udowodnij, że następujący *problem podziału  $n$  harcerzy na 4 drużyny* jest NP-zupełny.

Dany jest hufiec  $H$  harcerzy i lista  $E \subseteq H^2$  par harcerzy, którzy się nie lubią. Czy da się podzielić  $H$  na cztery drużyny tak, aby spełnione były warunki: drużyny mają być z grubsza równej wielkości: do każdej z nich musi należeć przynajmniej jedna piąta wszystkich harcerzy z  $H$ . W żadnej drużynie nie mogą jednocześnie znaleźć się dwaj harcerze, którzy się nie lubią.

**Zadanie 156.** W Pewnej Wschodniej Krainie wszystkim rządzą trzej gangsterzy, pan K, pan G i pan B. Każda firma, która chce mieć spokój i dostawać koncesje i kontrakty, musi mieć wśród członków swojej rady nadzorczej przyjaciół przynajmniej dwóch spośród tych trzech gangsterów. Kłopot polega jednak na tym, że: gangsterzy za sobą nawzajem nie przepadają, więc każdy członek rady może przyjaźnić się co najwyżej z jednym gangsterem. Rady nadzorcze różnych firm niekoniecznie muszą być rozłączne.

Udowodnij, że problem: *Dane listy członków rad nadzorczych pewnej liczby firm, czy da się osoby figurujące na tych listach pozaprzyjaźniać z panami K, G i B w taki sposób, aby wszystkie z tych firm miały spokój?*

Jest NP-zupełny.

**Zadanie 157.** Jaka jest złożoność następującego *problemu klasy udającej się na wycieczkę*. Klasa ma udać się na wycieczkę do Świeradowa. Jednak ze względu na trawiący ją wewnętrzny konflikt, niektórzy z młodych ludzi obwarowują kwestię swojego wyjazdu pewnymi

<sup>3</sup>Nie wiemy czy istnieje taki algorytm.

warunkami. Warunki te mają następującą postać:

Ja (jadę — nie jadę) jeśli  $X$  (jedzie — nie jedzie)

gdzie  $X$  przebiega zbiór uczniów klasy. Każdy uczeń może przedstawić Pani Wychowawcy-ni dowolną liczbę takich warunków. Jaka jest złożoność problemu sprawdzenia, czy da się zorganizować wycieczkę w sposób uwzględniający wszystkie postawione warunki? Wielkością zadania jest tu łączna liczba warunków.

**Zadanie 158.** Udowodnij, że problem istnienia dla danego grafu nieskierowanego, takiego kolorowania wierzchołków tego grafu trzema kolorami, aby każdy wierzchołek sąsiadował z co najwyżej jednym wierzchołkiem tego samego koloru, jest NP-zupełny.

**Zadanie 159.** Przykładem problemu pokrycia zbioru podzbiorami rozłącznymi (PZPR) jest skończona rodzina  $A = \{A_1, A_2, \dots, A_N\}$  skończonych zbiorów.  $A \in PZPR$  jeśli istnieje rodzina  $B \subseteq A$  zbiorów rozłącznych, taka że suma wszystkich zbiorów z  $B$  jest równa sumie wszystkich zbiorów z  $A$ . Udowodnij, że  $3SAT \leq_p PZPR$ .

*Wskazówka: pokaż, że  $3SAT \leq_p PZPR$  gdzie  $3SAT$  to problem spełnialności dla formuł w postaci 3CNF w których każda zmienna występuje co najwyżej 3 razy.*

**Zadanie 160.** Jaka jest złożoność problemu istnienia, dla danej formuły boolowskiej w postaci CNF, wartościowania przy którym w każdej klauzuli wszystkie literały przyjmują wartość 1 albo wszystkie literały przyjmują wartość 0?

**Zadanie 161.** Niech  $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$  będzie bijekcją obliczalną w czasie wielomianowym. Czy wynika z tego, że  $f^{-1}$  też jest bijekcją obliczalną w czasie wielomianowym?

**Zadanie 162.** Udowodnij, że problem komiwojażera pozostaje NP-zupełny, gdy ograniczymy się do przykładów, w których funkcja wagi krawędzi  $d$  spełnia *mocny warunek trójkąta*:  $d(x, y) < d(x, z) + d(z, y)$ .

**Zadanie 163.** Rozważmy następujący problem  $P_{28}$ . Dane: graf nieskierowany  $G = (V, E)$  i  $A \subseteq V$ . Czy można wybrać zbiór  $B \subseteq A$  tak aby:

1. zbiór  $B$  był dominujący w  $G$ , tzn. dla każdego  $x \in V \setminus B$  istniał  $y \in B$  taki, że  $E(x, y)$ ;
2. zbiór  $B$  był niezależny w  $G$ , tzn. dla żadnych  $x, y \in B$  nie zachodziło  $E(x, y)$ ;
3. dla każdego  $x \in V$  istniał co najwyżej jeden  $y \in B$  taki, że  $E(x, y)$

Pokaż, że problem  $P_{28}$  jest NP-zupełny.

**Zadanie 164.** Jaka jest złożoność następującego problemu: Dany graf nieskierowany. Czy istnieje taki sposób pokolorowania jego krawędzi dwoma kolorami, czerwonym i niebieskim, aby każda krawędź była pokolorowana i aby nie pojawił się żaden niebieski cykl nieparzystej długości ani żaden czerwony cykl nieparzystej długości?

W Pewnej (Wschodniej) Krainie odbyły się wybory, w wyniku których do parlamentu weszła pewna liczba partii. Żadna z nich nie uzyskała większości, konieczne stało się zatem wyłonienie koalicji rządowej dysponującej więcej niż połową głosów. Każda z partii złożyła w związku z tym oświadczenie o następującej formie: *wejdziemy do koalicji wtedy i tylko wtedy gdy otrzymamy następujące stanowiska: lista stanowisk*. Listy stanowisk żądanych przez partie przecinają się czasem niepusto, a partie w swych żądaniach są nieugięte.

Oznaczmy przez  $KOAL$  problem istnienia większościowej koalicji, przy której można zaspokoić oczekiwania tworzących ją partii. Dane stanowi tu lista partii, wraz z ilością mandatów jakimi każda partia rozporządza i listą stanowisk jakich się domaga. Przez  $KOAL_j^i$  oznaczmy wariant problemu  $KOAL$ , w którym każda partia może żądać co najwyżej  $i$  stanowisk, a każdego stanowiska żąda co najwyżej  $j$  partii (brak któregoś z indeksów oznacza, że nie ograniczamy tego parametru).

**Zadanie 165.** Jaka jest złożoność problemu  $KOAL_2$ ?

*Wskazówka:* Wolno skorzystać z NP-zupełności problemu istnienia, w grafie nieskierowanym o  $n$  wierzchołkach, zbioru wierzchołków niezależnych o mocy  $n/4$ .

**Zadanie 166.** Jaka jest złożoność problemu  $KOAL_3$ ?

**Zadanie 167.** Jaka jest złożoność problemu  $KOAL_2^2$ ?

**Komentarz:** Nie potrafiłem niestety rozstrzygnąć jaka jest złożoność problemu  $KOAL^2$ . Dlatego pomyślałem, że może lepiej będzie, jeśli nie umieszczę tu takiego zadania.

**Zadanie 168.** Jaka jest złożoność problemu 3-kolorowania grafów, jeśli ograniczymy się do grafów o stopniu wierzchołków równym co najwyżej 4?

**Zadanie 169.** Rozważmy następujący Problem Trójek Klasowych (PTK).

Rodzice uczniów każdej klasy w szkole wybierają spośród siebie (do różnych niezmiernie ważnych zadań) trójkę – zwaną trójką klasową. Ponieważ można być rodzicem więcej niż jednego dziecka w szkole, można być członkiem więcej niż jednej takiej trójki.

Spśród członków tych trójek dyrektor szkoły chce powołać szkolny komitet rodzicielski, do którego należy **dokładnie jeden** członek każdej trójki klasowej. PTK jest problemem rozstrzygnięcia czy, dla danej listy trójek klasowych, powołanie takiego komitetu jest możliwe.

Udowodnij, konstruując odpowiednią redukcję, że  $3COL \leq_P PTK$ .

**Zadanie 170.** Jaka będzie złożoność problemu z poprzedniego zadania, jeśli każde wystąpienie słowa *trójka* zamienimy w nim słowem *dwójka*?

**Zadanie 171.** Przez *liczbę chromatyczną grafu nieskierowanego*  $G = \langle V, E \rangle$  rozumiemy najmniejszą liczbę naturalną  $n$  dla której istnieje funkcja  $l : V \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$  taka, że zachodzi formuła  $\forall x, y \in V \quad E(x, y) \Rightarrow l(x) \neq l(y)$ . Liczbę chromatyczną grafu  $G$  oznaczamy przez  $\chi(G)$

Udowodnij, że jeżeli istnieje wielomianowy algorytm który, dla danego grafu  $G$ , zwróci zawsze jedną z liczb  $\{\chi(G), \chi(G) + 1\}$ , to  $P = NP$

Przez *pokrycie cyklowe* nieskierowanego grafu  $G = \langle V, E \rangle$  rozumiemy zbiór rozłącznych (wierzchołkowo) cykli o wierzchołkach w  $V$  i krawędziach w  $E$ , taki, że każdy wierzchołek ze zbioru  $V$  należy do któregoś z tych cykli. *Moc pokrycia cyklowego* to liczba cykli z których to pokrycie się składa. Dla grafu  $G$  przez  $\sigma(G)$  oznaczmy, w kolejnych trzech zadaniach, minimalną moc pokrycia cyklowego  $G$  (ponieważ wierzchołek jest sam w sobie cyklem, więc liczba  $\sigma(G)$  jest zawsze określona i nie większa od liczby wierzchołków  $G$ ).

**Zadanie 172.** Niech  $c > 3$ . Jaka jest złożoność problemu stwierdzenia, dla danego grafu  $G$ , czy  $\sigma(G) \leq n/c$ , gdzie  $n$  to liczba wierzchołków  $G$ ?

**Zadanie 173.** Załóżmy, że istnieje wielomianowy algorytm, który dla każdego grafu  $G$  takiego że  $\sigma(G) = 1$  zwraca pokrycie cyklowe  $G$  składające się z nie więcej niż dwóch cykli. Pokaż, że w takim razie  $P = NP$ .

**Zadanie 174.** Pokaż, że jeśli  $P$  jest różne od  $NP$  to funkcja  $\sigma(G)$  nie może być, przez żaden wielomianowy algorytm, aproksymowana z dokładnością do stałej multiplikatywnej. Mówiąc dokładniej, pokaż że nie istnieje wtedy wielomianowy algorytm  $M$  i liczba  $c > 0$  taka, że dla

każdego grafu  $G$  algorytm  $M$  uruchomiony dla  $G$  zwróci jego pokrycie cyklowe o mocy nie większej niż  $c\sigma(G)$ .

**Zadanie 175.** Czy istnieje język  $L \in PTIME$ , który nie daje się rozpoznawać, na maszynie Turinga, w czasie kwadratowym? (Przez *czas kwadratowy* rozumiemy czas ograniczony przez  $c(n^2+1)$  gdzie  $n$  jest wielkością wejścia a  $c$  pewną stałą niezależną od wielkości wejścia).

Niech  $G = \langle V, E \rangle$  będzie grafem nieskierowanym. Przypominam, że kliką w  $G$  nazywamy zbiór  $U \subseteq V$  taki, że  $\forall x, y \in U \{x, y\} \in E$ , zaś zbiorem niezależnym w  $G$  nazywamy zbiór  $U \subseteq V$  taki, że  $\forall x, y \in U \{x, y\} \notin E$ .

W poniższych dwóch zadaniach wolno korzystać ze wszystkiego, czego w czasie wykładu i ćwiczeń dowiedzieliście się o złożoności różnych wersji problemu spełnialności formuł bołowskich. Nie wolno natomiast korzystać z zadań o złożoności problemu klik, ani innych problemów grafowych.

**Zadanie 176. a.** Jaka jest złożoność problemu rozstrzygnięcia, dla danego grafu  $G = \langle V, E \rangle$ , czy istnieje klika  $U \subseteq V$  taka, że  $V \setminus U$  jest zbiorem niezależnym?

**b.** Jak zmieni się złożoność problemu z punktu **a.**, jeżeli dodatkowo zażądamy, aby moc  $U$  była dokładnie połową mocy  $V$ ?

**Zadanie 177.** Jaka jest złożoność problemu rozstrzygnięcia, dla danego grafu  $G = \langle V, E \rangle$ , czy istnieją klika  $U \subseteq V$  i zbiór niezależny  $Y \subseteq V$ , oba o mocy nie mniejszej niż jedna czwarta mocy  $V$ .

**Zadanie 178.** Problem *wesołego dwukolorowania* zdefiniujemy w tym zadaniu następująco. Instancją problemu jest graf nieskierowany. Pytamy, czy da się pokolorować wierzchołki tego grafu dwoma kolorami w taki sposób, aby każdy wierzchołek miał wśród swoich sąsiadów przynajmniej po jednym wierzchołku każdego koloru. Pokaż, że problem wesołego dwukolorowania jest NP-zupełny.

*Wskazówka: Wolno skorzystać z NP-zupełności problemu not-all-equal-3-SAT. Instancjami tego problemu są formuły w postaci 3-CNF, a pytamy, czy istnieje takie wartościowanie zmiennych, że w każdej klauzuli jest przynajmniej jeden literal zwartościowany jako prawdziwy i przynajmniej jeden literal zwartościowany jako fałszywy.*

Na planecie Nijak używa się logiki o trzech wartościach: T (prawda), F (fałsz) i M (mhm). Spójniki logiczne  $\vee, \wedge$  i  $\neg$  są dla wartości T i F określone tak jak na Ziemi,  $\neg(M) = M$ , zaś  $\vee$  i  $\wedge$  są symetryczne i  $M \vee M = M \wedge M = M$ ,  $T \vee M = T \wedge M = T$  i  $F \vee M = F \wedge M = F$ . Definicje postaci CNF, 2CNF itd. są na Nijak takie same jak na Ziemi. Podobnie, formuła jest na Nijak *spełnialna* jeśli istnieje wartościowanie zmiennych przy którym ma ona wartość logiczną T.

**Zadanie 179.** Jaka jest na Nijak złożoność problemu spełnialności formuł w postaci 2CNF?

**Zadanie 180.** Jaka jest na Nijak złożoność problemu spełnialności formuł w postaci 3CNF? W zadaniu tym zakładamy, że literalami są zmienne, negacje zmiennych, oraz stałe T, F i M.

**Zadanie 181.** Jaka jest na Nijak złożoność problemu spełnialności formuł w postaci 3CNF? W zadaniu tym zakładamy, że literałami są zmienne i negacje zmiennych, ale nie są nimi stałe T, F i M.

**Zadanie 182.** Jaka jest złożoność problemu rozstrzygnięcia, dla danej formuły w postaci 2CNF, czy istnieje wartościowanie spełniające przynajmniej  $3/4$  wszystkich klauzul w tej formule?

**Zadanie 183.** Jaka jest złożoność problemu rozstrzygnięcia, dla danej formuły w postaci 2CNF, czy istnieje wartościowanie spełniające przynajmniej  $3/4$  spośród pierwszych stu klauzul w tej formule, oraz wszystkie pozostałe?

**Zadanie 184.** Melmażelon z planety Melmak umie odpowiedzieć, zawsze zgodnie z prawdą, na jedno pytanie o spełnialność formuły boolowskiej. Dokładniej mówiąc, melmażelon pożera formułę, po czym, jeśli formuła jest spełnialna to robi się cały seledynowy, zaś jeśli jest niespełnialna robi się cały pomarańczowy. Po czym, w obu przypadkach, rusza tak śmiesznie łapkami i zaraz zdycha.

Oznaczmy przez  $\text{PTIME}^M$  klasę problemów, które można rozwiązać w deterministycznym czasie wielomianowym kosztem jednego melmażelona. To znaczy takich problemów, dla których istnieje wielomianowy algorytm, działający w czasie wielomianowym, zadający, w trakcie swojego działania, co najwyżej jedno pytanie do melmażelona o spełnialność jakiejś formuły, i uzależniający dalsze działanie od odpowiedzi na to pytanie.

Czy  $\text{PTIME}^M = \text{NP} \cup \text{co-NP}$ ? Zakładamy, że  $\text{co-NP} \neq \text{NP} \neq \text{PTIME}$ .

**Zadanie 185.** Instancją problemu NAE-SAT (Not All Equal SAT) jest formuła boolowska w postaci 3CNF. Formuła należy do NAE-SAT jeśli istnieje wartościowanie zmiennych, przy którym każda z klauzul jest spełniona, ale w każdej jest przynajmniej jeden fałszywy literał.

Pokaż, że  $3\text{COL} \leq_P \text{NAE-SAT}$ .

**Zadanie 186.** Jaka jest złożoność problemu istnienia takiego kolorowania wierzchołków danego nieskierowanego grafu  $\mathcal{G}$  dwoma kolorami, przy którym nie powstaje żaden trójkąt o wszystkich trzech wierzchołkach tego samego koloru? Przez trójkąt rozumiemy tu 3-klikę w grafie  $\mathcal{G}$ .

**Zadanie 187.** Czy odpowiedź na pytanie z poprzedniego zadania zmieni się, jeśli ograniczymy się do instancji problemu będącymi grafami 4-kolorowalnymi?

## 16 O teoretycznych kłopotach kryptografii

**Zadanie 188.** (za 2 punkty) Funkcja różnowartościowa  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  i taka, że dla każdego  $n$  zachodzi  $|n| = |f(n)|$  jest *jednostronna* jeśli istnieje wielomianowy algorytm obliczający  $f$ , ale nie ma wielomianowego algorytmu obliczającego  $f^{-1}$ . Pokaż, że jeśli istnieje jakaś funkcja jednostronna to  $\text{NP} \cap \text{co-NP} \neq \text{PTIME}$ .

*Wskazówka:* Rozważ zbiór  $\{\langle x, y \rangle : f^{-1}(x) < y\}$

## 17 Problemy być może nie należące do klasy NP

**Zadanie 189.** Grę *w kompromis* definiujemy, na potrzeby tego zadania, następująco. Planszę do gry stanowi skierowany graf dwudzielny  $\langle V, E \rangle$  (gdzie  $V = L \cup P$  jest podziałem  $V$  wynikającym z dwudzielności grafu; zakładamy ponadto, że minimalny stopień wyjściowy wierzchołka jest  $\geq 2$ ), z wyróżnionym wierzchołkiem  $c_0 \in L$  zwanym początkowym, i ze zbiorem  $W \subseteq L$ , zwanym zbiorem pozycji wygrywających. W kompromis grają dwaj gracze,  $\mathcal{L}$  i  $\mathcal{P}$ , wykonujący ruchy na przemian.

Protokół ruchu gracza  $\mathcal{L}$  jest następujący. Zastaje on planszę z kamieniem umieszczonym w jakimś wierzchołku  $s \in L$ . Następnie wybiera dwa różne wierzchołki  $t_1, t_2 \in P$  takie, że zachodzi  $E(s, t_1)$  i  $E(s, t_2)$  i mówi: *wybierz sobie bracie, gdzie chcesz bym się ruszył*. Jego przeciwnik wybiera jeden spośród wierzchołków  $t_1, t_2$ , a gracz  $\mathcal{L}$  przesuwa tam kamień. Protokół ruchu gracza  $\mathcal{P}$  jest analogiczny, z tym że zamienione są role zbiorów  $P$  i  $L$ .

Na początku gry kamień leży w  $c_0$ , zatem pierwszy ruch wykonuje gracz  $\mathcal{L}$ . Gra kończy się zwycięstwem gracza  $\mathcal{P}$  gdy uda mu się postawić kamień w wierzchołku należącym do  $W$ . Gra kończy się zwycięstwem gracza  $\mathcal{L}$  jeśli gracz  $\mathcal{P}$  nie wygra w ciągu  $2|V|$  ruchów.

Jaka jest złożoność problemu rozstrzygnięcia, dla danej planszy do gry w kompromis, który z graczy ma w niej strategię wygrywającą?

*Wskazówka: The owls are not what they seem.*

**Zadanie 190.** Udowodnij, że problem, czy dane wyrażenie regularne opisuje wszystkie słowa nad danym alfabetem, jest w PSPACE.

**Zadanie 191.** Udowodnij, że problem rozstrzygania prawdziwości formuł o postaci

$$\exists!x_1 \exists!x_2 \dots \exists!x_n \phi$$

jest w PSPACE. Zmienne  $x_1, x_2, \dots, x_n$  przebiegają tu zbiór  $\{0, 1, 2\}$ . Kwantyfikator  $\exists!$  oznacza *istnieje dokładnie jeden*, zaś  $\phi$  jest formułą bez kwantyfikatorów z  $n$  zmiennymi  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , zbudowaną przy pomocy spójników boolowskich i symboli arytmetyki modulo 3, to znaczy symboli dodawania i mnożenia modulo 3, symbolu równości i stałych  $\{0, 1, 2\}$ . Jak zmieniłoby się rozwiązanie gdyby zmienne przebiegały zbiór  $\{0, 1\}$  a arytmetyka była modulo 2?

**Zadanie 192.** Jaka jest złożoność problemu istnienia, dla danej formuły boolowskiej  $\phi$  w postaci 2CNF wartościowania spełniającego  $\phi$  i przyporządkowującego wartość logiczną 1 przynajmniej trzem spośród zmiennych występujących w  $\phi$ ?

**Zadanie 193.** (za 2 punkty) Udowodnij, że są języki rekurencyjne, które nie są w PSPACE.

**Zadanie 194.** Udowodnij, że problem sprawdzenia prawdziwości formuł o postaci

$$Q_1x_1Q_2x_2\dots Q_nx_n \phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

gdzie każdy  $Q_i$  to albo  $\exists!$ , oznaczający *istnieje dokładnie jeden*, albo  $\exists$  (czyli *istnieje*), albo  $\forall$  (czyli *dla każdego*), zaś  $\phi$  jest formułą boolowską, jest PSPACE-zupełny.

Tematem kolejnych czterech pięknych zadań są **Klasy alternujące**.

**Definicja.** Powiemy, że język  $A$  należy do klasy altPTIME jeśli istnieją wielomian  $p$  i język  $B \in PTIME$  takie, że zachodzi równoważność:

$w \in A$  wtedy i tylko wtedy, gdy gracz pierwszy ma strategię wygrywającą w opisanej poniżej grze  $Gra(w, p, B)$

$Gra(w, p, B)$  ma następujące reguły. Zaczyna się od napisania na taśmie słowa  $s_1 = w\#$ . Następnie, w rundzie  $i$ -tej, najpierw gracz pierwszy dopisuje do aktualnie zapisanego słowa  $s_i$  wybrany przez siebie sufix  $w_i\#$  a następnie gracz drugi dopisuje do  $s_iw_i\#$  pewien wybrany przez siebie sufix  $v_i\#$ , tworząc w ten sposób słowo  $s_{i+1}$ . Żąda się przy tym aby długości  $w_i$  i  $v_i$  były obie równe  $p(n)$ , gdzie  $n$  jest długością słowa  $w$ . Gracz pierwszy wygrywa gdy  $s_{p(n)} \in B$ .

**Zadanie 195.** (za 2 punkty) Udowodnij, że altPTIME=PSPACE.



**Definicja.** Powiemy, że język  $A$  należy do klasy  $\text{altPSPACE}$  jeśli istnieją wielomian  $p$  oraz języki  $B, C \in \text{PTIME}$  takie, że zachodzi równoważność:

$w \in A$  w.t.w. gdy gracz pierwszy ma strategię wygrywającą w opisanej poniżej grze  $\text{Gra2}(w, p, B, C)$ .

$\text{Gra2}(w, p, B, C)$  ma następujące reguły. Zaczyna się od napisania na taśmie słowa  $w\#$ . Następnie, w pierwszej rundzie, najpierw gracz pierwszy dopisuje do  $w\#$  wybrany przez siebie sufix  $w_1\#$  tworząc w ten sposób  $t_1 = w\#w_1\#$ , a następnie gracz drugi dopisuje do  $t_1$  pewien wybrany przez siebie sufix  $v_1\#$ , tworząc w ten sposób słowo  $s_1$ . W  $i$ -tej rundzie najpierw gracz pierwszy wymazuje z taśmy słowo  $w_{i-1}$  zastępując je wybranym przez siebie  $w_i$  (powstałe w ten sposób słowo nazywamy  $t_i$ ), a następnie drugi gracz wymazuje z taśmy słowo  $v_{i-1}$  zastępując je przez  $v_i$ . Powstałe słowo (równe  $w\#w_i\#v_i$ ) oznaczamy przez  $s_i$ . Żąda się przy tym aby długości  $w_i$  i  $v_i$  były obie równe  $p(n)$ , gdzie  $n$  jest długością słowa  $w$ . Gra kończy się porażką pierwszego gracza, gdy w którejś rundzie pojawi się słowo  $t_i$  takie, że  $t_i \notin B$ . Gra kończy się porażką drugiego gracza, gdy w którejś rundzie pojawi się słowo  $s_i$  takie że  $s_i \notin C$ .

**Zadanie 196.** Udowodnij, że jeśli któryś z uczestników ma strategię wygrywającą w grze  $\text{Gra2}(w, p, B, C)$ , to może doprowadzić do zwycięstwa nie dalej, niż po wykładniczej względem długości  $w$  liczbie rund.

**Zadanie 197.** (za 2 punkty) Udowodnij, że  $\text{altPSPACE} \subseteq \text{EXPTIME}$

**Zadanie 198.** (za 3 punkty) Udowodnij, że  $\text{EXPTIME} \subseteq \text{altPSPACE}$

**Zadanie 199.** (za 3 punkty) Instancja Gry w Kamienie to: skończony zbiór  $X$  (zwany zbiorem pól), relacja  $R \subseteq X^3$ , zbiór  $Y \subseteq X$  i element  $f \in X$ .

Grę toczą dwaj gracze wykonujący na przemian ruchy. Przed każdym ruchem na niektórych polach ze zbioru  $X$  znajdują się kamienie: przed pierwszym ruchem pierwszego gracza mamy po jednym kamieniu w każdym polu zbioru  $Y$ , który to zbiór wyznacza w ten sposób pozycję początkową w grze. W swoim ruchu każdy z graczy przesuwa jeden kamień zgodnie z regułą, że jeśli zachodzi  $R(x, y, z)$  oraz w  $x$  i  $y$  są kamienie, a w  $z$  nie ma kamienia, to wolno przesunąć kamień z  $x$  do  $z$ . Wygrywa ten, kto pierwszy postawi kamień w  $f$ .

Jaka jest złożoność problemu: dana instancja gry w kamienie, czy gracz pierwszy ma strategię wygrywającą?

**Zadanie 200.** Wyobraźmy sobie prostokątną tabelkę o 17 wierszach i 5 kolumnach, w każde pole której wolno wpisać 0 lub 1. Ponadto wyobraźmy sobie formułę zdaniową KROK, w której występuje 10 zmiennych.

Mówimy, że tabelka jest poprawnie wypełniona jeśli dla każdych kolejnych dwóch wierszy  $a_1a_2a_3a_4a_5$  i  $b_1b_2b_3b_4b_5$  zachodzi:

$$\text{KROK}(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5).$$

Niech  $k_1k_2k_3k_4k_5$  i  $m_1m_2m_3m_4m_5$  będą dwoma ustalonymi ciągami zerojedynekowymi. Napisz QBF mówiącą, że można poprawnie wypełnić naszą tabelkę zerami i jedynkami w taki sposób, że w pierwszym wierszu jest  $k_1k_2k_3k_4k_5$  w ostatnim zaś  $m_1m_2m_3m_4m_5$ . Formuła nie może zawierać więcej niż 45 zmiennych (nie liczymy  $m_1 \dots m_5$  i  $k_1 \dots k_5$  - to nie są zmienne). Oczywiście szukana QBF będzie zawierała pewną liczbę wystąpień podformuły KROK.

Przez QBF rozumiemy tu formułę zdaniową o  $k$  zmiennych, poprzedzoną  $k$  kwantyfikatorami wiążącymi te zmienne. To znaczy  $\forall p \exists q (p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$  jest QBF a  $\forall p [(\exists q (p \vee q)) \wedge (\exists q (\neg p \vee q))]$  nie jest.

**Zadanie 201.** Napisz formułę rachunku predykatów mówiącą, że w danym grafie  $\langle V, R \rangle$  istnieje ścieżka prowadząca z danego wierzchołka  $c$  do danego wierzchołka  $k$  złożona z dokładnie 16 krawędzi. Formuła ta ma mieć przy tym nie więcej niż 10 wystąpień kwantyfikatorów.

Przez formułę rachunku predykatów rozumiemy tu formułę, w której używa się kwantyfikatorów wiążących zmienne przebiegające zbiór  $V$ , symbolu relacji  $R$ , symbolu równości, nawiasów i spójników logicznych.

*Wyjaśnienie: Formuła:  $\exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_{15} R(c, x_1) \wedge R(x_1, x_2) \wedge \dots \wedge R(x_{15}, k)$  spełnia wszelkie wymogi zadania, oprócz tego, że ma 15 kwantyfikatorów.*

**Zadanie 202.** Dla danej formuły  $\phi$  zbudowanej, zgodnie ze zwykłymi regułami, ze zmiennych  $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ , z liczb naturalnych 0, 1 i 2, ze spójników boolowskich oraz z symboli  $=_3, +_3$  i  $\times_3$  (rozumianych jako równość, dodawanie i mnożenie modulo 3), ale bez kwantyfikatorów, rozważmy następującą grę  $G(\phi)$  rozgrywaną między uczestnikami X i Y.

Rozgrywka składa się z  $n$  ruchów, w trakcie których zastępuje się zmienne w formule  $\phi$  stałymi. W ruchu  $i$  najpierw gracz X wybiera  $k \in \{0, 1, 2\}$  i zastępuje wszystkie wystąpienia zmiennej  $x_i$  przez liczbę  $k$ , a następnie gracz Y wybiera  $l \in \{0, 1, 2\}$  i zastępuje wszystkie wystąpienia zmiennej  $y_i$  przez liczbę  $l$ . Gracz X wygrywa, jeśli formuła bez zmiennych w jaką zmieni się  $\phi$  po ostatnim ruchu gracza Y, jest prawdziwa.

Niech 3GRA będzie problemem rozstrzygnięcia, dla danej formuły  $\phi$ , czy gracz X ma strategię wygrywającą w grze  $G(\phi)$ . Udowodnij, że  $\text{QBF} \leq_p \text{3GRA}$ .

**Zadanie 203.** Jaka jest złożoność problemu prawdziwości kwantyfikowanych formuł boolowskich, w których są co najwyżej dwa wystąpienia kwantyfikatora ogólnego?

**Zadanie 204.** Jaka jest złożoność problemu rozstrzygnięcia, dla danych dwóch deterministycznych automatów skończonych  $M_1$  i  $M_2$ , czy język  $L_{M_1} \cap L_{M_2}$  jest niepusty? (wielkością zadania jest tu łączna liczba stanów tych automatów).

**Zadanie 205.** Jaka jest złożoność problemu rozstrzygnięcia, dla danych deterministycznych automatów skończonych  $M_1, M_2, \dots, M_k$  czy język  $L_{M_1} \cap L_{M_2} \cap \dots \cap L_{M_k}$  jest niepusty? (wielkością zadania jest tu łączna liczba stanów tych automatów).

Instancją Gry w Zwiedzanie jest (w kolejnych trzech zadaniach) graf skierowany  $G = (V, E)$ , zbiór  $S \subseteq V$  „naszych pozycji”, zbiór  $T \subseteq V$  „pozycji docelowych” i „wierzchołek początkowy”  $v_0 \in V$ .

Dla danej instancji Gry w Zwiedzanie rozgrywka przebiega następująco. Na początku gry znajdujemy się w punkcie  $v_0$ . W każdym kolejnym ruchu:

- Jeśli aktualnie znajdujemy się w jakimś wierzchołku  $w \in S$  to możemy się przesunąć do wybranego przez nas wierzchołka  $w'$ , takiego że  $E(w, w')$ , ale tylko jeśli nie byliśmy jeszcze w tym  $w'$ ;
- jeśli aktualnie znajdujemy się w jakimś wierzchołku  $w \in V \setminus S$  to Zły Przewodnik może nas przesunąć do wybranego przez siebie wierzchołka  $w'$ , takiego że  $E(w, w')$ , ale tylko jeśli nie byliśmy jeszcze w tym  $w'$ .

Gra kończy się gdy osoba mająca ruch nie może go, zgodnie z powyższą regułą, zrobić. Jeśli wcześniej odwiedziliśmy wszystkie wierzchołki ze zbioru  $T$  to gra kończy się naszym zwycięstwem. W przeciwnym razie kończy się naszą porażką.

Przez GwZ oznaczamy problem rozstrzygnięcia, dla danej instancji Gry w Zwiedzanie, który z graczy ma w tej instancji strategię wygrywającą. Przez  $\text{GwZ}_k$  oznaczamy problem GwZ ograniczony do instancji w których  $|S|, |T| \leq k$ .

**Zadanie 206.** Pokaż, że problem GwZ jest PSPACE zupełny.

**Zadanie 207.** Pokaż, że dla żadnej liczby naturalnej  $k$  (dla ustalenia uwagi możesz myśleć, że  $k=7$ ), problem  $GwZ_k$  nie jest PSPACE-zupełny.

**Uwaga:** Zakładamy, że  $NP \neq PSPACE$ .

**Zadanie 208.** Pokaż, że dla żadnej liczby naturalnej  $k$ , problem  $GwZ_k$  nie jest w PTIME.

**Uwaga:** Zakładamy, że  $NP \neq PTIME$ .

Miasta każdego kraju planety Melmak tworzą, wraz z połączeniami drogowymi, graf nieskierowany. I w każdym z tych krajów panuje następujący obyczaj. Król wyznacza – jeśli to możliwe – każdemu miastu jeden z roboczych dni tygodnia (tzn od poniedziałku do piątku) jako dzień targowy, to znaczy ten, w którym w tym mieście odbywają się targi. Stara się jednak przestrzegać reguły, że *dwa miasta połączone bezpośrednią drogą nie mogą odbywać targów w ten sam dzień, ani nawet w dwa kolejne dni*. Problem rozstrzygnięcia, czy spełnienie powyższego jest możliwe, będziemy nazywać Problemem Króla na Melmak.

**Zadanie 209.** Udowodnij, że Problem Króla na Melmak jest NP-zupełny.

**Zadanie 210.** Niech  $L$  będzie pewną raz na zawsze ustaloną liczbą naturalną.

Kraj nazywamy *nadmorskim* jeśli jego miasta można ustawić w ciąg  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , taki, że dla każdego  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  liczba takich par połączonych bezpośrednią drogą miast  $[a_j, a_k]$ , że  $j \leq i \leq k$ , jest nie większa od  $L$ .

Skorzystaj z faktu, że dla każdego ustalonego DFA  $\mathcal{A}$ , problem czy dla danego słowa  $w$  automat  $\mathcal{A}$  akceptuje słowo  $w$  rozwiązuje się w czasie liniowym, względem długości  $w$ , aby skonstruować algorytm szybko rozwiązujący Problem Króla na Melmak ograniczony do krajów nadmorskich.

**Zadanie 211.** W soboty i w niedziele, które są słusznie wolne od targów, mieszkańcy Melmak zajmują się złożonością obliczeniową.

Nieuchronnie jednak, pewne konwencje notacyjne, które przyjęli, są inne od ziemskich. Tam, gdzie Ziemianie piszą  $\psi^*$  (gdzie  $\psi$  jest wyrażeniem regularnym) na Melmak pisze się  $\psi^{[*...*]}$ , gdzie liczba gwiazdek jest równa  $2^{|\psi|}$ , gdzie  $|\psi|$  jest długością wyrażenia  $\psi$ . Tam zaś, gdzie Ziemianie piszą  $\bar{\psi}$  (gdzie  $\psi$  jest wyrażeniem regularnym) na Melmak pisze się  $\psi^{[dd...d]}$ , gdzie liczba literek  $d$  jest równa  $2^{|\psi|}$ , gdzie  $|\psi|$  jest długością wyrażenia  $\psi$ .

a. Jaka jest na Melmak złożoność problemu totalności wyrażeń regularnych?

b. Jaka jest na Melmak złożoność problemu totalności wyrażeń regularnych z dopełnieniem?