

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ (M)

Lista M6

19 listopada 2015 r.

M6.1. 1 punkt Niech L_n będzie wielomianem interpolującym funkcję $f(x) = \exp x$ w zerach wielomianu Czebyszewa T_{n+1} . Jaka wartość n gwarantuje, że zachodzi nierówność

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |f(x) - L_n(x)| \leq 10^{-5}?$$

M6.2. 2 punkty Wykazać, że wielomian $I_n \in \Pi_n$ interpolujący funkcję f w węzłach

$$t_k \equiv t_{n+1,k} = \cos \frac{2k+1}{2n+2} \pi \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

(zerach wielomianu T_{n+1}) można zapisać w postaci

$$I_n(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i T_i(x),$$

gdzie

$$\alpha_i := \frac{2}{n+1} \sum_{j=0}^n f(t_j) T_i(t_j) \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

M6.3. 1 punkt Określmy wielomian $H_{2n+1} \in \Pi_n$ za pomocą wzoru

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) h_k(x) + \sum_{k=0}^n f'(x_k) \bar{h}_k(x),$$

gdzie węzły x_0, \dots, x_n są parami różne, ponadto

$$\left. \begin{aligned} h_k(x) &:= [1 - 2(x - x_k) \lambda'_k(x_k)] \lambda_k^2(x), \\ \bar{h}_k(x) &:= (x - x_k) \lambda_k^2(x), \\ \lambda_k(x) &:= \frac{p_{n+1}(x)}{(x - x_k) p'_{n+1}(x_k)}, \end{aligned} \right\} \quad (0 \leq k \leq n)$$

oraz $p_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. Wykazać, że H_{2n+1} spełnia warunki

$$(1) \quad H_{2n+1}(x_i) = f(x_i), \quad H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i) \quad (0 \leq i \leq n).$$

M6.4. 1,5 punktu Niech będzie $f \in C^{2n+2}[a, b]$ i niech wielomian $H_{2n+1}(x) \in \Pi_{2n+1}$ spełnia warunki

$$(2) \quad H_{2n+1}(x_i) = f(x_i), \quad H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i) \quad (0 \leq i \leq n).$$

dla parami różnych węzłów $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$. Udowodnić, że dla każdego $x \in [a, b]$ istnieje taki punkt $\xi \in (a, b)$, że

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{1}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi) p_{n+1}^2(x).$$

M6.5. 1 punkt Wyznaczyć wielomian $H_5 \in \Pi_5$, spełniający warunki $H_5(x_i) = y_i$, $H'_5(x_i) = y'_i$ ($i = 0, 1, 2$), gdzie x_i , y_i , y'_i mają następujące wartości:

i	x_i	y_i	y'_i
0	-1	7	-1
1	0	6	0
2	2	22	56

M6.6. [1 punkt, Włącz komputer!] Niech $f(x) = e^{\arctan(x)}$. Rozważyć interpolację w przedziale $[a, b] := [-5, 5]$ w $n + 1$ węzłach równoodległych, gdzie $n = 10$. Znaleźć postać potęgową wielomianu interpolacyjnego $L_n(x)$ oraz naturalną funkcję sklejaną trzeciego stopnia $s(x)$. Podać wartości całek

$$\int_a^b [f''(x)]^2 dx, \quad \int_a^b [L_n''(x)]^2 dx, \quad \int_a^b [s''(x)]^2 dx.$$

Wyniki należy przedstawić z dokładnością do 8 cyfr dziesiętnych.

M6.7. [1 punkt] Wykazać, że jeśli s jest naturalną funkcją sklejaną trzeciego stopnia, interpolującą funkcję f w węzłach x_0, x_1, \dots, x_n ($a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$), to

$$\int_a^b [s''(x)]^2 dx = \sum_{k=1}^{n-1} (f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k]) M_k,$$

gdzie $M_k := s''(x_k)$ ($k = 0, 1, \dots, n$).

M6.8. [1 punkt] Wielomiany Bernsteina n -tego stopnia definiujemy następująco

$$B_i^{(n)}(t) := \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad n \geq 0.$$

Udowodnić następujące własności:

a) $\sum_{i=0}^n B_i^{(n)}(t) \equiv 1$.

b) $B_i^{(n)}(t) \geq 0$ dla $t \in [0, 1]$.

c) $B_i^{(n)}(t) = (1-t)B_i^{(n-1)}(t) + tB_{i-1}^{(n-1)}(t)$.

d) $[B_i^{(n)}(t)]' = n(B_{i-1}^{(n-1)}(t) - B_i^{(n-1)}(t))$.

e) $B_i^{(n)}(t) = \frac{n+1-i}{n+1}B_i^{(n+1)}(t) + \frac{i+1}{n+1}B_{i+1}^{(n+1)}(t)$.

M6.9. [1,5 punktu] Niech $B_i^{(n)}(t)$ oznaczają wielomiany Bernsteina n -tego stopnia. Wyprowadzić wzory na współczynniki $a_k^{(n,i)}$, $b_k^{(n,i)}$, dla których

$$B_i^{(n)}(t) = \sum_{k=0}^n a_k^{(n,i)} t^k, \quad t^i = \sum_{k=0}^n b_k^{(n,i)} B_k^{(n)}(t).$$