

9. Zadania do wykładu
analiza 2B

1. Wskazać punkty osobliwe i zbadać zbieżność całek niewłaściwych.

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{x^2 \ln x}, \quad \int_{-\infty}^1 \frac{dx}{x^2 + 4x + 10}, \\ & \int_{-1}^\infty \frac{x dx}{2x^3 + x^2 + 1}, \quad \int_0^\infty \frac{dx}{2x^3 + x^2 + \sqrt[3]{x}}, \quad \int_0^\infty \frac{dx}{x^4 + x^3 + \sqrt{x}}, \\ & \int_{-\infty}^\infty \frac{(x^4 + 1) dx}{x^6 + 3x^2 + 2}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{e^x - e^{-x}}, \quad \int_0^1 \frac{x^{3/2} dx}{e^{x^2} - e^{-x^2}}, \\ & \int_0^\pi \frac{dx}{\sin x}, \quad \int_0^\pi \frac{\sqrt{x(\pi-x)}}{\operatorname{tg} x} dx, \quad \int_{-1}^1 \frac{(x^2 - 1) dx}{\sqrt{2 + x + 2x^2 - x^3}}, \\ & \int_0^1 \frac{x dx}{x - \sin x}, \quad \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \ln(x^2) dx, \quad \int_0^\infty \frac{\ln x dx}{x^{3/2} + x + 1}. \end{aligned}$$

2. Zbadać zbieżność całek niewłaściwych.

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty x^\alpha e^{-x^2} dx, \quad \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx, \quad \int_0^1 (1 - x^a)^{-b} dx \quad (a, b > 0), \\ & \int_0^\infty \frac{\cos x}{1 + x^2} dx, \quad \int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{x\sqrt{x}} dx, \quad \int_1^\infty \frac{x}{x^2 + k^2} \sin ax dx \quad (k > 0), \\ & \int_2^\infty \frac{dx}{x^k \ln x}, \quad \int_2^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^k}, \quad \int_0^2 \frac{dx}{\ln x}, \\ & \int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x} dx, \quad \int_0^\infty \frac{dx}{x^p + x^q}, \quad \int_0^\infty \frac{\cos ax dx}{1 + x^n}, \\ & \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^a} dx, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx, \quad \int_0^\infty \frac{x dx}{1 + x^2 \cos^2 x}. \end{aligned}$$

3. Funkcja $\varphi(x)$ jest ciągła na przedziale $[a, b]$ i różniczkowalna w sposób ciągły na $(a, b]$, przy czym $\varphi'(x)$ jest nieograniczona w pobliżu punktu a . Funkcja $f(u)$ jest ciągła na przedziale zawierającym wszystkie wartości funkcji $\varphi(x)$. Pokazać, że całka $\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx$ jest zbieżna do $\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du$.

4. Pokazać, że

$$\int_0^1 \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx.$$

5. Sformułować i udowodnić twierdzenie podobne do tego z zadania 3 tak, aby w tezie otrzymać wzór

$$\int_a^{+\infty} f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^L f(u) du,$$

gdzie $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x)$.

6. Pokazać, że

$$\int_0^\infty \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx.$$

7. Obliczyć całki niewłaściwe:

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^3},$$
$$\int_0^\infty \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx, \quad \int_0^\infty e^{-x} \cos bx dx,$$
$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}, \quad (*) \quad \int_1^\infty \frac{1}{x(x+1)\dots(x+n)} dx.$$

8. Zbadać zbieżność zwykłą i bezwzględną całek

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx, \quad \int_0^\infty \frac{\cos x dx}{\sqrt{x}(1+x)}, \quad \int_\pi^\infty \frac{\cos x dx}{x + \sin 2x}.$$

9. Funkcja $F(x)$ jest ciągła na przedziale $[a, b]$ i różniczkowalna w sposób ciągły na przedziale $(a, b]$. Załóżmy, że $F' = f$ jest funkcją rosnącą (lub malejącą) nieograniczoną w pobliżu punktu a . Pokazać, że przy oznaczeniu $x_i = a + i(b-a)/n$ zachodzi wzór

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx.$$

Obliczyć granicę ciągu $\sqrt[n]{n!}/n$, stosując wzór do funkcji $f(x) = \ln x$ na przedziale $(0, 1]$.

10. Funkcja $f(x)$ jest malejąca dla $x \geq 0$ i całka $\int_0^\infty f(x) dx$ jest zbieżna. Udowodnić, że

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^\infty f(nh) = \int_0^\infty f(x) dx.$$

11. Obliczyć granice

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^\infty \frac{k}{n^2 + k^2}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^\infty \frac{n^2}{k^3} e^{-n/k}.$$

*12. Pokazać, że wartość całki $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$ nie zależy od parametru α .