

**Zadanie 15**

Pokaż, że

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Dla jakich  $n$  mamy

$$F_n = \left\lfloor \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\rfloor + \frac{1}{2}?$$

**Twierdzenie 1.**

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

*Dowód.* Wiemy z algebry (albo dowodzimy indukcyjnie), że zachodzi równość :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}$$

Diagonalizujemy macierz  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Po długich i żmudnych rachunkach dostaniemy :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) & \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{5}} & \frac{5+\sqrt{5}}{10} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{5-\sqrt{5}}{10} \end{pmatrix}$$

Jak to zrobić?

- Obliczamy wielomian charakterystyczny macierzy. Wychodzi on  $x^2 - x - 1$  i ma pierwiastki odpowiednio  $x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  i  $x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ .
- Dla każdej wartości własnej szukamy wektora własnego (bierzemy np. te które napisałem w macierzy).
- Otrzymaną macierz odwracamy i zapisujemy całość w postaci  $ABA^{-1}$ , gdzie macierz  $A$  to macierz której kolumnami są wektory własne, a macierz  $B$  to macierz diagonalna z odpowiadającymi wartościami własnymi na przekątnej.

Teraz wystarczy tylko brutalnie obliczyć wynik.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) & \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1-\sqrt{5})^n & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(1+\sqrt{5})^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{5}} & \frac{5+\sqrt{5}}{10} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{5-\sqrt{5}}{10} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \dots = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right) \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Stąd już wniosek o tym, że  $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$ .

□

**Twierdzenie 2.** Dla dowolnego  $n \in \mathbb{N}$  zachodzi równość

$$F_n = \left\lfloor \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\rfloor + \frac{1}{2}$$

*Dowód.* Weźmy dowolne  $n \in \mathbb{N}$ . Pokażmy, że zachodzi nierówność

$$F_n \leq \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \frac{1}{2} < 1 + F_n$$

Następnie z definicji podłogi dostaniemy tezę.

$$\begin{aligned} 1 + F_n &= 1 + \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) > \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n \\ 1 &> \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \\ \sqrt{5} \cdot 2^n &> (1-\sqrt{5})^n \end{aligned}$$

Ostatnia linijka jest prawdą, ponieważ  $1 - \sqrt{5} \approx -1.24$ . Została nam do pokazania tylko druga nierówność.

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \leq \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \frac{1}{2}$$

Przekształcając powyższą nierówność do postaci  $-(1-\sqrt{5})^n \leq 2^{n-1} \cdot \sqrt{5}$ , bo  $-(1-\sqrt{5})^n \leq 2^n \leq 2^{n-1} \cdot \sqrt{5}$ , co wiemy z poprzednich szacowań.  $\square$