

Overblik Afsnit 8.4.4: **Beregne** P-værdier for μ

Vi starter med **tosidede test**.

Tosidede test: $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

Overblik Afsnit 8.4.4: **Beregne** P-værdier for μ

Vi starter med **tosidede test**.

Tosidede test: $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) **kendt σ^2** : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

Overblik Afsnit 8.4.4: **Beregne P-værdier** for μ

Vi starter med **tosidede test**.

Tosidede test: $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) **kendt σ^2** : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

$$\text{P-værdi} = 2(1 - \Phi(|w|)).$$

Overblik Afsnit 8.4.4: **Beregne P-værdier** for μ

Vi starter med **tosidede test**.

Tosidede test: $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) **kendt σ^2** : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

$$\text{P-værdi} = 2(1 - \Phi(|w|)).$$

(b) **ukendt σ^2** : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$

Overblik Afsnit 8.4.4: **Beregne P-værdier** for μ

Vi starter med **tosidede test**.

Tosidede test: $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) **kendt σ^2** : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

$$\text{P-værdi} = 2(1 - \Phi(|w|)).$$

(b) **ukendt σ^2** : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$

$$\text{P-værdi} = 2(1 - F_{T(n-1)}(|w|)).$$

Overblik Afsnit 8.4.4: **Beregne P-værdier** for μ

Ensidede test: $H_0 : \mu \leq \mu_0$ (eller $H_0 : \mu = \mu_0$) $H_1 : \mu > \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

Overblik Afsnit 8.4.4: Beregne P-værdier for μ

Ensidede test: $H_0 : \mu \leq \mu_0$ (eller $H_0 : \mu = \mu_0$) $H_1 : \mu > \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) kendt σ^2 : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

Overblik Afsnit 8.4.4: Beregne P-værdier for μ

Ensidede test: $H_0 : \mu \leq \mu_0$ (eller $H_0 : \mu = \mu_0$) $H_1 : \mu > \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) kendt σ^2 : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

$$P\text{-værdi} = 1 - \Phi(w).$$

Overblik Afsnit 8.4.4: **Beregne P-værdier** for μ

Ensidede test: $H_0 : \mu \leq \mu_0$ (eller $H_0 : \mu = \mu_0$) $H_1 : \mu > \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) kendt σ^2 : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

$$\text{P-værdi} = 1 - \Phi(w).$$

(b) ukendt σ^2 : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$

$$\text{P-værdi} = 1 - F_{T(n-1)}(w).$$

Overblik Afsnit 8.4.4: **Beregne P-værdier** for μ

Ensidede test: $H_0 : \mu \leq \mu_0$ (eller $H_0 : \mu = \mu_0$) $H_1 : \mu > \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) kendt σ^2 : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

$$\text{P-værdi} = 1 - \Phi(w).$$

(b) ukendt σ^2 : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$

$$\text{P-værdi} = 1 - F_{T(n-1)}(w).$$

Ensidede test: $H_0 : \mu \geq \mu_0$ (eller $H_0 : \mu = \mu_0$) $H_1 : \mu < \mu_0$

Lad w være den observerede værdi af statistik W .

(a) kendt σ^2 : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$

$$\text{P-værdi} = \Phi(w).$$

(b) ukendt σ^2 : $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$

$$\text{P-værdi} = F_{T(n-1)}(w).$$