

# ALGEBRA I PRO INFORMATIKY

## OBSAH

1. Předmět(y) zkoumání	1
2. Základy elementární teorie čísel	4
3. Asociativní binární operace	7
4. Podgrupy	9
5. Izomorfismy a faktorové grupy	13
6. Cyklické grupy	16
7. Kryptografické aplikace: protokol RSA a diskretní logaritmus	18
8. Univerzální pohled: pojem algebry	20
9. Izomorfismy algeber	23
10. Okruhy a ideály	26
11. Konstrukce těles	30
12. Svazy	33
13. Booleovy algebry	36

## 1. PŘEDMĚT(Y) ZKOUMÁNÍ

Pod názvem algebra se dlouho dobu rozuměla nauka o řešení rovnic, což dosvědčuje i etymologie tohoto slova; termínem al-džabr označuje Muhammad Ibn Músá al-Chórézmí (kolem 780 – kolem 850) ve svém *Algebraickém traktátu* přičtení výrazu k obou stranám rovnice. Ač je al-Chórézmí často nazýván Otcem algebry a stal se neplánovaným autorem pojmenování celé matematické disciplíny (a také pojmu algoritmus skrze přízvisko al-Chorézmí, které označuje jeho rodiště Chorézm, dnešní uzbeckou Chívu), algebraické úvahy a postupy jsou mnohem staršího data. Zmiňme alespoň teorii čísel, pěstovanou už v antickém starověku, například Eukleidův algoritmus je stále velmi užitečný poznatek, jehož algebraická povaha je mimo vši pochybnost.

V současném pojetí algebry už netvoří otázka řešení polynomiálních rovnic, jak bychom měli předmět starověké, středověké a raně novověké algebry upřesnit, centrální roli. Přesto lze mnoho algebraických problémů rovnicovým jazykem vyjádřit a například otázka obtížnosti nalezení řešení kvadratických či kubických rovnic je zajímavá nejen pro současnou algebru, nýbrž i pro kryptologii. V algebře se podobně jako v celé matice zásadně změnil jazyk. Symbolický zápis umožňuje přesnější a jasnější formulace starých otázek a přirozeně nabízí otázky nové. Obdobně se zásadně změnila míra abstrakce algebraických úvah. Zatímco v *klasické algebře* se matematici zabývaly vždy zcela konkrétní algebraickou strukturou, jakou představují přirozená čísla se sčítáním a násobením, celá či racionální čísla se sčítáním, násobením, odčítáním, popřípadě dělením nebo reálná či komplexní čísla v kontextu otázek vyjádřených obvyklými operacemi, v takzvané *moderní algebře*

už v centru pozornosti stojí obecný, obvykle axiomaticky popsáný algebraický objekt. My se budeme pochopitelně věnovat základním konceptům moderní algebry s přihlédnutím k historickým souvislostem a postoji studenta informatiky, pro nějž je realitou jen velmi omezený sortiment konkrétních algebraických struktur, což je postoj přirozeně blízký klasické algebře.

Velmi zhruba vyjádřeno se tedy moderní algebra věnuje zkoumání množin opatřených jistým systémem operací. Předmětem zájmu jsou ovšem nejen strukturní vlastnosti takové množiny popsané podmínkami, které pomocí operací umíme vyjádřit, nýbrž i vlastnostmi „vyšších řádů“, například vlastnosti systémů různých množin s podobnými systémy operací či tříd takových množin. Tento text si přitom klade za cíl seznámit studenty informatiky s nejzákladnějšími pojmy, koncepty a v neposlední řadě i konkrétními objekty, které jsou předmětem zkoumání současné algebry. Výběr a uspořádání teorie, kterou zde prezentujeme, je zvolen s ohledem na tři základní hlediska. Jak už bylo zmíněno, především se snažíme navázat na koncepty a způsoby uvažování, které jsou pro studenta informatiky přirozené, dále se v rámci velmi omezeného prostoru pokoušíme demonstrovat několik elementárních algebraických výsledků, které jsou užitečné v informatických aplikacích a konečně za nepominutelný považujeme přístup, který můžeme nepřiliš přesně označit jako kontextuální, a jímž miníme seznámení studenta s terminologickými a historickými kontexty současné algebry.

Dříve než se začneme systematicky zabývat abstraktními úvahami o algebraických objektech, uvedeme několik motivačních příkladů, které by nám pomohly usnadnit porozumění důvodům (ať už praktickým tak historickým), proč právě tu či onu vlastnost sledujeme. Tvzení této a následující kapitoly budou bez důkazu využívat základních poznatků teorie čísel, především jednoznačnost (až na pořadí) ireducibilního rozkladu a Euklidova algoritmu na nalezení největšího společného dělitele.

Nejprve se domluvíme, že *binární operací* na neprázdné množině  $A$  budeme rozumět libovolné zobrazení  $A^2 = A \times A \rightarrow A$  (obvykle ji budeme zapisovat centrálně), *unární operace* na  $A$  bude jakékoli zobrazení  $A \rightarrow A$  a *nulární operace* bude zobrazení kartézské mocniny  $A^0$ , která sestává právě z jediné prázdné posloupnosti, do množiny  $A$ , můžeme ji proto chápat jako vybrání prvku z množiny  $A$ , právě toho, na nějž se zobrazí jednoprvková množina  $A^0$  (obvykle se nulární operace s tímto vyznačeným prvkem ztotožňuje).

Můžeme si poněkud předčasně dovolit i zcela obecnou definici operace:

**Definice.** Pro každé celé  $n \geq 0$  nazveme  *$n$ -ární operací na množině  $A$*  každé zobrazení  $A^n \rightarrow A$  (číslo  $n$  budeme nazývat *aritou* nebo *četností* operace).

**Příklad 1.1.** Uvažujme množinu celých čísel  $\mathbb{Z}$  a na ní obvyklé operace sčítání  $+$  a násobení  $\cdot$ . Pro libovolné přirozené číslo  $n$  položme  $n\mathbb{Z} = \{n \cdot z \mid z \in \mathbb{Z}\}$ . Nyní si můžeme všimnout, že je množina  $n\mathbb{Z}$  „uzavřená“ na obě uvažované operace, tj. pro každou dvojici  $a, b \in n\mathbb{Z}$  platí, že  $a + b, a \cdot b \in n\mathbb{Z}$ , tedy operace  $+$  a  $\cdot$  můžeme uvažovat také omezeně na množině  $n\mathbb{Z}$ . Ačkoli pro žádné  $n > 1$  množiny  $n\mathbb{Z}$  a  $\mathbb{Z}$  nesplývají, nelze pomocí vlastností operace  $+$  obě množiny odlišit (tj. mají stejné „algebraické“ vlastnosti vzhledem ke sčítání), což ozřejmíme, zavedeme-li zobrazení  $f_n : \mathbb{Z} \rightarrow n\mathbb{Z}$  předpisem  $f_n(k) = kn$ . Zjevně se jedná o bijekci, která navíc splňuje podmínku  $f_n(a + b) = f_n(a) + f_n(b)$ .

Poznamenejme, že taková vlastnost zobrazení není nijak samozřejmá, například vzhledem k operaci násobení  $f_n$  obdobnou podmínku nesplňuje. Uvážíme-li navíc

podmínku „existuje prvek  $e$  tak, že pro všechny prvky  $a$  platí  $a \cdot e = a$ “, pak je tato podmínka na množině  $\mathbb{Z}$  splněna pro  $e = 1$ , zatímco na množině  $n\mathbb{Z}$  zjevně neplatí.

**Příklad 1.2.** V souladu se značením zavedeným na kurzu lineární algebry položíme  $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$  pro nějaké celé číslo  $n > 1$ . Zavedme na  $\mathbb{Z}_n$  operace  $+$  a  $\cdot$  předpisem  $a + b = (a + b) \bmod n$  a  $a \cdot b = (a \cdot b) \bmod n$ , kde  $\bmod n$  znamená zbytek po celočíselném dělení hodnotou  $n$  a v závorce uvažujeme vždy obvyklé sčítání a násobení celých čísel. Konečně definujme zobrazení  $F_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$  předpisem  $F_n(k) = (k) \bmod n$ . Všimněme si, že tentokrát zobrazení  $F$  sice není bijekce, ale obě operace sčítání a násobení „převádí“ na nově zavedené  $+$  a  $\cdot$ , tedy  $F_n(a+b) = F_n(a) + F_n(b)$  i  $F_n(a \cdot b) = F_n(a) \cdot F_n(b)$ .

**Definice.** Máme-li binární operaci  $*$  na množině  $A$ , nějakou podmnožinu  $U$  množiny  $A$  a binární operaci  $\circ$  na množině  $B$ . Řekneme, že  $U$  je *uzavřená* na operaci  $*$ , jestliže pro všechna  $x, y \in U$  platí, že  $x * y \in U$ , a zobrazení  $f : A \rightarrow B$  nazveme *slučitelné* s operacemi  $*$  a  $\circ$  je-li pro všechna  $x, y \in A$  splněna rovnost  $f(x * y) = f(x) \circ f(y)$ .

Všimněme si, že zobrazení  $f_n$  z 1.1 je slučitelné s operacemi  $+$  a není slučitelné s operacemi  $\cdot$ , zatímco zobrazení  $F_n$  z 1.2 je slučitelné s oběma páry operací  $+$  i  $\cdot$ . Navíc množina  $n\mathbb{Z}$  je uzavřená na operace  $+$  i  $\cdot$ . Uvedené pojmy jsou základním stavebním kamenem lineární algebry:

**Příklad 1.3.** Podprostor vektorového prostoru je zjevně podmnožinou uzavřenou na (vektorové) sčítání a lineární zobrazení jsou se sčítáním slučitelná. Navíc uvažujeme-li násobení skalárem pro každý skalár  $a$  jako unární operaci, pak je podprostor uzavřený na všechny takto definované unární operace.

Připomeňme, že *relací na množině  $A$*  rozumíme libovolnou podmnožinu  $A \times A$ . Nechť  $\rho$  je relace na  $A$ , označme:

- $\rho^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in \rho\}$  (opačná relace),
- $\rho^+ = \{(a, b) \mid \exists a = a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n = b \in A; (a_i, a_{i+1}) \in \rho\}$  (tranzitivní obal),
- $id = \{(a, a) \mid a \in A\}$  (identita).

Řekneme, že relace  $\rho$  je

- *symetrická*, jestliže  $\rho^{-1} \subseteq \rho$ ,
- *reflexivní*, v případě, že  $id \subseteq \rho$  a
- *tranzitivní*, pokud  $\rho^+ \subseteq \rho$ .

*Ekvivalencí* budeme nazývat každou symetrickou, reflexivní a tranzitivní relaci.

**Příklad 1.4.** Pro libovolné množiny  $A$  a  $B$  a zobrazení  $f : A \rightarrow B$  množin tvoří ekvivalenci relace

- (1)  $id = \{(a, a) \mid a \in A\}$ ,
- (2)  $A \times A$ ,
- (3)  $\ker f = \{(x, y) \in A \times A \mid f(x) = f(y)\}$  (tzv. jádro zobrazení  $f$ ).

Je-li  $\rho$  ekvivalence na množině  $A$ , připomeňme, že *faktorem množiny* (často se také mluví o *kvocientu*)  $A$  podle ekvivalence  $\rho$  jako množinu  $A/\rho = \{[a]_\rho \mid a \in A\}$ , kde  $[a]_\rho = \{b \in A \mid (a, b) \in \rho\}$  jsou rozkladové třídy (kosety), tedy  $A/\rho$  tvoří rozklad množiny  $A$ .

Naopak máme-li  $\{B_i \mid i \in I\}$  rozklad množiny  $A$ , pak relace  $\rho$  určená podmínkou:  $(a, b) \in \rho \Leftrightarrow \exists i \in I : a, b \in B_i$  je ekvivalencí a  $A/\rho = \{B_i \mid i \in I\}$ .

## 2. ZÁKLADY ELEMENTÁRNÍ TEORIE ČÍSEL

Nyní připomeňme několik nejzákladnějších poznatků z teorie čísel, které nám poslouží nejen jako motivace zkoumání obecných algebraických vlastností (slučitelnost ekvivalence s operací), nýbrž i jako užitečný nástroj, jenž využijeme v následujících kapitolách (Eukleidův algoritmus, Čínská věta o zbytcích a Eulerova funkce).

Jsou-li  $a, b$  dvě celá čísla, budeme fakt, že číslo  $a$  dělí  $b$ , značit  $a/b$  a symbolem  $\text{GCD}(a, b)$  budeme rozumět *největší společný dělitel* čísel  $a$  a  $b$ , tedy nezáporné číslo  $d$ , které je společným dělitelem čísel  $a$  a  $b$  a které je děleno všemi společnými děliteli čísel  $a$  a  $b$ . Konečně přirozené číslo  $p$  nazveme prvočíslem, jestliže pro každá celá  $a, b$  platí implikace  $p = a \cdot b \Rightarrow a = \pm 1$  nebo  $b = \pm 1$ .

Připomeňme nejprve rozšířený Eukleidův algoritmus hledání největšího společného dělitele čísel  $a$  a  $a$ :

VSTUP:  $a, b \in \mathbb{N}, a \geq b$

VÝSTUP:  $\text{GCD}(a, b), x, y \in \mathbb{Z}$ , pro které  $\text{GCD}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$

0.  $i := 1, (a_0, a_1) := (a, b); (x_0, x_1) := (1, 0); (y_0, y_1) := (0, 1);$

1. **while**( $a_i > 0$ ) **do**  
 $\{a_{i+1} := (a_{i-1}) \bmod a_i; q_i := (a_{i-1}) \div a_i; \% \text{tj. } a_{i-1} = q_i a_i + a_{i+1}$   
 $x_{i+1} := x_{i-1} - x_i \cdot q_i; y_{i+1} := y_{i-1} - y_i \cdot q_i; i := i + 1; \}$

2. **return**  $a_{i-1}, x_{i-1}, y_{i-1}$ .

**Poznámka 2.1.** Eukleidův algoritmus je korektní, tj. najde největší společný dělitel čísel  $a$  a  $b$  a platí, že  $\text{GCD}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$ .

*Důkaz.* Využijeme značení algoritmu a položíme  $n := i - 1$ , tj.  $a_n > 0$  a  $a_{n+1} = 0$ .

Protože  $a_n/a_{n-1}$ , vidíme, že  $a_n = \text{GCD}(a_{n-1}, a_n)$ .

Nyní indukci dokážeme rovnost  $\text{GCD}(a_i, a_{i+1}) = \text{GCD}(a_{i-1}, a_i)$ , za předpokladu, že jeden z největších společných dělitelů existuje. K tomu nám stačí dokázat, že množina všech dělitelů dvojice  $a_i, a_{i+1}$  je stejná jako množina všech dělitelů dvojice  $a_{i-1}, a_i$ , což snadno nahlédneme díky vztahu hodnot  $a_{i-1}, a_i$  a  $a_{i+1}$ :

$$c/a_{i-1}, a_i \Rightarrow c/a_{i+1} = a_{i-1} - q_i \cdot a_i$$

a podobně

$$d/a_i, a_{i+1} \Rightarrow d/a_{i-1} = a_i + q_i \cdot a_{i+1}.$$

Začneme-li vztahem  $a_n = \text{GCD}(a_{n-1}, a_n)$ , postupně dostaneme posloupnost rovností.

$$a_n = \text{GCD}(a_n, a_{n-1}) = \text{GCD}(a_{n-1}, a_{n-2}) = \dots = \text{GCD}(a_0, a_1).$$

Na závěr ověříme platnost tvrzení  $a_i = x_i \cdot a_0 + y_i \cdot a_1$  indukci podle  $i$ . Zřejmě tvrzení platí pro  $i = 0$  a  $i = 1$ .

Předpokládejme, že tvrzení platí pro  $i$  a  $i - 1$ , tedy  $a_i = x_i \cdot a_0 + y_i \cdot a_1$  a  $a_{i-1} = x_{i-1} \cdot a_0 + y_{i-1} \cdot a_1$ , a dokážeme ho pro  $i + 1$ . Dosadíme za  $a_i$  a  $a_{i-1}$  do vztahu

$$\begin{aligned} a_{i+1} &= a_{i-1} - a_i \cdot q_i = (x_{i-1} \cdot a_0 + y_{i-1} \cdot a_1) - (x_i \cdot a_0 + y_i \cdot a_1) \cdot q_i = \\ &= (x_{i-1} - x_i \cdot q_i) \cdot a_0 + (y_{i-1} - y_i \cdot q_i) \cdot a_1 = x_{i+1} \cdot a_0 + y_{i+1} \cdot a_1, \end{aligned}$$

čímž jsme dokončili důkaz.  $\square$

Poznamenejme, že čísla  $x$  a  $y$  se obvykle nazývají Bezoutovy koeficienty.

Nyní už je snadné dokázat jednoznačnost prvočíselného rozkladu.

**Věta 2.2** (Základní věta aritmetiky). *Každé přirozené číslo větší než jedna lze až na pořadí jednoznačně rozložit na součin prvočísel.*

*Důkaz.* Nejprve si uvědomíme, že lze každé přirozené číslo  $n > 1$  napsat jako součin prvočísel, což můžeme snadno dokázat indukcí podle  $n$ . Číslo 2 je zřejmě prvočíslo. Pokud  $n$  není prvočíslo, existují taková přirozená čísla  $k, l < n$ , že  $n = k \cdot l$ . Obě jsou samozřejmě větší než jedna a podle indukčního předpokladu máme prvočíselný rozklad čísel  $k = p_1 \cdot \dots \cdot p_r$  a  $l = q_1 \cdot \dots \cdot q_s$ . Tedy číslo  $n$  je součinem prvočísel  $p_1 \cdot \dots \cdot p_r \cdot q_1 \cdot \dots \cdot q_s$ .

Nyní dokážeme technické

**Lemma.** Nechť  $p$  je prvočíslo a  $a, b, a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{N}$ . Pak platí

- (1)  $p/a \cdot b \Rightarrow p/a$  nebo  $p/b$ ,
- (2)  $p/a_1 a_2 \dots a_k \Rightarrow \exists i$ , že  $p/a_i$ .

(1) Protože  $\text{GCD}(p, a) = 1$  ( $p$  má pouze dělitele 1 a  $p$ ), existují podle 2.1 taková celá  $x$  a  $y$ , že  $1 = a \cdot x + p \cdot y$ , tudíž  $b = abx + pby$ . Protože  $p$  dělí  $abx$  i  $pby$ , platí, že  $p/b$ .

(2) Indukční rozšíření (1).

Zbývá ověřit jednoznačnost indukci podle  $n$ .

Je-li  $n$  prvočíslo (speciálně  $n = 2$ ), je prvočíselný rozklad zřejmě určen jednoznačně. Platí-li tvrzení pro všechna  $k < n$  a  $n = p_1 \cdot \dots \cdot p_r = q_1 \cdot \dots \cdot q_s$  jsou dva prvočíselné rozklady, potom podle tvrzení Lemmatu existuje takové  $j$ , že  $p_1/q_j$ . Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že  $j = 1$ . Protože  $p_1$  i  $q_1$  jsou prvočísla, máme  $p_1 = q_1$ . Nyní stačí použít indukční předpoklad pro  $p_2 \cdot \dots \cdot p_r = q_2 \cdot \dots \cdot q_s < n$ .  $\square$

Připomeňme užitečný příklad číselně teoretické ekvivalence.

**Příklad 2.3.** Vezmeme přirozené číslo  $n \geq 2$  a označme  $\equiv \pmod{n}$  relaci na množině celých čísel  $\mathbb{Z}$  danou předpisem:  $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n/(a-b)$ . Není těžké si uvědomit, že se jedná o ekvivalenci (obvykle se jí říká kongruence na  $\mathbb{Z}$ ). Navíc si můžeme všimnout jejího těsného vztahu k zobrazení  $F_n$  z 1.2, neboť platí, že  $a \equiv b \pmod{n}$ , právě když  $F_n(a) = F_n(b)$ , tedy kongruence  $\equiv \pmod{n}$  je rovná právě ekvivalenci  $\ker F_n$ .

Dříve než začneme používat termín kongruence v mnohem obecnější situaci, připomeňme si několik jednoduchých vlastností, které kongruence na celých číslech má:

**Poznámka 2.4.** Pro každé  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  a  $k, n \in \mathbb{N}$ , kde  $n > 1$ , platí:

- (1) jestliže  $a \equiv b \pmod{n}$  a  $c \equiv d \pmod{n}$ , pak  $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ ,  
 $a - c \equiv b - d \pmod{n}$ ,  $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$  a  $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ ,
- (2) jestliže  $c \neq 0$ , pak  $a \equiv b \pmod{n}$ , právě když  $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{cn}$ ,
- (3) jestliže  $\text{GCD}(c, n) = 1$ , pak  $a \equiv b \pmod{n}$ , právě když  $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$ .

*Důkaz.* (1) Předpokládáme-li, že  $n/(a-b), (c-d)$ , pak

$$n/(a-b) + (c-d) = (a+c) - (b+d),$$

$$n/(a-b) - (c-d) = (a-c) - (b-d),$$

$$n/(a-b) \cdot c + b \cdot (c-d) = (a \cdot c) - (b \cdot d)$$

a poslední kongruenci dostaneme indukčním použitím předchozí pro  $a = c$  a  $b = d$ .

(2)  $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n/(a-b) \Leftrightarrow nc/(ac-bc) \Leftrightarrow ac \equiv bc \pmod{cn}$ .

(3) Přímá implikace plyne okamžitě z (1), protože  $c \equiv c \pmod{n}$ . Jakmile  $n/ac-bc = (a-b)c$  a  $a$  a  $n$  jsou nesoudělná čísla, pak nutně  $n/(a-b)$ .  $\square$

**Definice.** Uvažujme na množině  $A$  binární operaci  $*$  a ekvivalenci  $\sim$ . Řekneme, že  $\sim$  je *slučitelná s operací*  $*$ , jestliže pro všechny takové prvky  $a_1, a_2, b_1, b_2 \in A$ , pro něž  $a_1 \sim b_1$  a  $a_2 \sim b_2$  platí, že  $(a_1 * a_2) \sim (b_1 * b_2)$ .

V Poznámce 2.4 jsme tedy zjistili, že je kongruence  $\equiv \pmod{n}$  slučitelná s přirozenými operacemi  $+$ ,  $-$  a  $\cdot$  na celých číslech.

**Příklad 2.5.** Mějme kladná celá čísla  $n_1, \dots, n_k$  a položme  $n = n_1 \cdots n_k$ . Zavedme nyní na kartézském součinu  $\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}_{n_i}$  po složkách operace  $+$ ,  $-$  a  $\cdot$ :

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) + (b_1, b_2, \dots, b_k) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_k + b_k),$$

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) - (b_1, b_2, \dots, b_k) = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_k - b_k),$$

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) \cdot (b_1, b_2, \dots, b_k) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, \dots, a_k \cdot b_k),$$

kde odčítání ve složkách definujeme rovněž modulo  $n_i$ . Definujme dále zobrazení

$$G : \mathbb{Z} \rightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}_{n_i} \text{ předpisem } G(a) = ((a) \bmod n_1, \dots, (a) \bmod n_k)$$

a stejným předpisem zavedeme i zobrazení  $H : \mathbb{Z}_n \rightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}_{n_i}$ . Obě zobrazení jsou opět slučitelná s operacemi  $+$ , operacemi  $-$  i operacemi  $\cdot$ .

V následující poznámce budeme uvažovat operace na kartézských součinech zavedené v Příkladu 2.5.

**Poznámka 2.6** (Čínská věta o zbytcích). *Nechť  $n_1, n_2, \dots, n_k$  jsou kladná celá čísla a  $n = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$ . Potom je zobrazení  $H$  z 2.5 slučitelné s operací  $+$  a s operací  $\cdot$ . Navíc  $H$  je bijekce, právě když jsou čísla  $n_1, n_2, \dots, n_k$  po dvou nesoudělná.*

*Důkaz.* Nejprve dokážeme zpětnou implikaci. V Příkladu 2.5 jsme si uvědomili, že je  $f$  zobrazení slučitelné s oběma operacemi. Zbývá nahlédnout, že jde o bijekci. Protože jsou  $\mathbb{Z}_n$  a  $\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}_{n_i}$  stejně velké konečné množiny, stačí ověřit, že je  $f$  prosté. Nechť pro  $a \leq b \in \mathbb{Z}_n$  platí, že  $H(a) = H(b)$ . Potom  $H(b-a) = 0$ , tedy  $n_i/b-a$  pro všechna  $i = 1, \dots, k$ . Protože jsou  $n_i$  po dvou nesoudělná dostáváme z Věty 2.2  $n/b-a$ . Protože ovšem  $0 \leq b-a \leq n-1$ , máme  $b=a$ .

Přímou implikaci dokážeme nepřímou. Nechť existují indexy  $i \neq j$ , pro něž  $c = \text{GCD}(n_i, n_j) > 1$ . Potom  $\frac{n}{c} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$  a pro všechna  $r = 1, \dots, k$  platí, že  $n_r/\frac{n}{c}$ . To znamená, že  $H(0) = (0, \dots, 0) = H(\frac{n}{c})$ , tedy  $H$  není prosté.  $\square$

Čínská věta o zbytcích nám umožňuje „algebraicky“ přesně reprezentovat větší množinu  $\mathbb{Z}_n$  pomocí počítání v menších množinách  $\mathbb{Z}_{n_i}$ , což je postup, který při potřebě exaktního počítání s velkými čísly lze použít.

Nechť  $a_0 \geq a_1$  jsou dvě přirozená čísla.

**Definice.** *Eulerovou funkcí* nazveme zobrazení  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  dané předpisem

$$\varphi(n) = |\{k \in \mathbb{Z}_n \mid \text{GCD}(k, n) = 1\}|.$$

**Věta 2.7.** *Bud'  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  prvočísla a  $r_1, r_2, \dots, r_k$  kladná celá čísla. Potom  $\varphi(\prod_{i=1}^k p_i^{r_i}) = \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{r_i}) = \prod_{i=1}^k (p_i - 1)p_i^{r_i-1}$ .*

*Důkaz.* Nejprve si uvědomíme pro libovolné prvočíslo  $p$  a kladné celé číslo  $r$ , že  $\varphi(p^r) = (p-1) \cdot p^{r-1}$ :

Číslo menší než  $p^r$  je soudělné s  $p^r$  právě tehdy, když je násobkem čísla  $p$ . Kladných násobků čísla  $p$  menších než  $p^r$  je zřejmě právě  $p^{r-1}$ . To znamená, že naopak kladných čísel nesoudělných s  $p^r$  máme  $\varphi(p^r) = p^r - p^{r-1} = (p-1)p^{r-1}$ .

Dále položíme  $n_i = p_i^{r_i}$  a  $n = \prod_{i=1}^k n_i$  a uvažujme zobrazení  $H: \mathbb{Z}_n \rightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}_{n_i}$  z Poznámky 2.6. Protože jsou  $n_1, \dots, n_k$  nesoudělná čísla, je  $H$  podle 2.6 bijekce. Abychom ověřili rovnost  $\varphi(\prod_{i=1}^k p_i^{r_i}) = \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{r_i})$ , ověříme více, ukážeme, že zobrazení  $H$  indukce bijekci mezi množinami

$$\{a \in \mathbb{Z}_n \mid \text{GCD}(a, n) = 1\} \rightarrow \{(a_1, \dots, a_k) \in \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}_{n_i} \mid \text{GCD}(a_i, n_i) = 1 \forall i\}.$$

Označíme-li pro libovolné  $a \in \mathbb{Z}_n$  položme  $(a_1, \dots, a_k) := H(a)$ , potřebujeme tudíž nahlédnout, že  $\text{GCD}(a, n) = 1$  právě tehdy, když  $\text{GCD}(a_i, n_i) = 1$  pro všechna  $i = 1, \dots, k$ , protože

$$\prod_{i=1}^k \varphi(n_i) = \left| \prod_{i=1}^k \{a \in \mathbb{Z}_{n_i} \setminus \{0\} \mid \text{GCD}(a_i, n_i) = 1\} \right|.$$

Dokazujeme dvě implikace.

Jestliže  $\text{GCD}(a, n) \neq 1$ , existuje index  $i$ , pro něj prvočíslo  $p_i$  dělí  $a$ , a díky jednoznačnosti prvočíselného rozkladu, tudíž buď  $a_i = 0$  nebo  $p_i$  dělí  $a_i$ , proto  $\text{GCD}(a_i, n_i) \neq 1$ .

Naopak, jestliže  $\text{GCD}(a_i, n_i) \neq 1$ , pak existuje dělitel  $c > 1$  čísel  $a_i$  i  $n_i$ , proto  $c$  dělí i  $a = a_i + xn_i$  i  $n = n_1 \dots n_i \dots n_k$ .

Konečně rovnost  $\prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{r_i}) = \prod_{i=1}^k (p_i - 1)p_i^{r_i-1}$  plyne okamžitě z úvahy na začátku důkazu.  $\square$

### 3. ASOCIATIVNÍ BINÁRNÍ OPERACE

Zkusíme se nyní oprostit od konkrétní algebraické struktury a uvažíme sice obecnou ale velmi jednoduchou situaci množiny opatřené asociativní binární operací. Hlavním výsledkem této kapitoly bude kromě příkladů řady struktur, které takovou podmínku splňují, především pozorování (Důsledek 3.7), že množina s asociativní operací je jistým způsobem velmi blízko mnohem silnějšímu pojmu grupa, který zde jako jeden ze základních pojmů moderní algebry zavedeme.

Připomeňme, že binární operace  $*$  na  $A$  je *asociativní* (resp. *komutativní*), platí-li pro všechna  $x, y, z \in A$  rovnost  $x * (y * z) = (x * y) * z$  (resp.  $x * y = y * x$ ).

**Definice.** Uvažujme binární operaci  $*$  na množině  $A$ . *Neutrálním prvkem* operace  $*$  rozumíme takový prvek  $e \in A$ , že  $g * e = e * g = g$  pro všechna  $g \in A$ .

**Poznámka 3.1.** Každá binární operace má nejvýše jeden neutrální prvek.

*Důkaz.* Jsou-li  $e, f$  dva neutrální prvky, pak  $e = e * f = f$ .  $\square$

Následující příklad ukazuje, že se v definici neutrálního prvku nemůžeme omezit jen na jednu ze dvou rovností:

**Příklad 3.2.** Je-li  $X$  aspoň dvouprvková množina a definujeme-li na  $X$  binární operaci  $*$  předpisem  $x * y = x$ , je operace  $*$  asociativní, ale  $X$  neobsahuje žádný neutrální prvek. Přitom dokonce každý prvek  $X$  splňuje první z rovností, kterou je neutrální prvek definován.

**Definice.** Necht'  $\cdot$  je binární operace na množině  $S$  a  $1$  je její neutrální prvek. Řekneme, že prvek  $s \in S$  je *invertibilní*, existuje-li takový prvek  $s^{-1} \in S$ , že  $s^{-1} \cdot s = s \cdot s^{-1} = 1$ . Prvek  $s^{-1}$  nazveme *inverzním prvkem* k prvku  $s$ .

**Příklad 3.3.** Uvažujme  $T(\mathbb{N})$  množinu všech zobrazení přirozených čísel do sebe s operací skládání  $\circ$  a necht'  $\alpha(k) = 2k$  a  $\beta(k) = \lfloor \frac{k}{2} \rfloor$ . Pak identické zobrazení  $Id$  je neutrální vzhledem k  $\circ$ , a platí, že  $\beta\alpha = Id$  a  $\alpha\beta \neq Id$ . Prvky  $\alpha$  a  $\beta$  tedy splňují právě jednu z definitorických rovností invertibilního prvku, ovšem invertibilní nejsou.

Množině  $G$  s binární operací  $\cdot$  budeme říkat *grupoid* (a budeme psát  $G(\cdot)$ ). O grupoidu  $G(\cdot)$  řekneme, že je:

- *pologrupa*, je-li operace  $\cdot$  asociativní,
- *monoid*, je-li operace  $\cdot$  asociativní a v  $G$  leží její neutrální prvek,
- *grupa*, je-li  $G(\cdot)$  monoid, jehož každý prvek je invertibilní,
- *komutativní grupa* (nebo *abelovská grupa*), je-li  $G(\cdot)$  grupa a  $\cdot$  je komutativní.

V Příkladech 1.1 a 2.3 jsme připomněli asociativní a komutativní operace  $+$  a  $\cdot$  na množině celých čísel (a v Příkladech 1.2 a 2.5 jsme si uvědomili, že asociativitu i komutativitu splňují jimi indukované operace na množinách  $\mathbb{Z}_n$ ). Jistě zde není třeba opakovat, jak vypadají odpovídající neutrální a invertibilní prvky. Uveďme ještě několik dobře známých, ač méně elementárních příkladů asociativních binárních operací.

**Příklad 3.4.** Necht'  $n > 1$  je přirozené číslo a  $X$  neprázdná množina.

(1) Necht'  $M(X)$  je množina všech slov, tj. všech konečných posloupností písmen z množiny  $X$ . Zaved'me na této množině binární operaci skládání  $\cdot$ :  $x_1 \dots x_n \cdot y_1 \dots y_m = x_1 \dots x_n y_1 \dots y_m$  a dále označme  $\epsilon$  prázdné slovo. Snadno nahlédneme, že je operace  $\cdot$  asociativní (je-li  $X$  aspoň dvouprvková množina, pak operace není komutativní) a platí, že  $\epsilon \cdot s = s \cdot \epsilon = s$  pro každé  $s \in M(X)$ , tedy  $M(X)(\cdot)$  je tzv. *slovní monoid*.

(2) Označme  $T(X)$  množinu všech zobrazení množiny  $X$  do sebe. Potom  $T(X)(\circ)$  tvoří (s operací skládání  $\circ$ ) (tzv. *transformační*) monoid.

(3) Čtvercové matice  $M_n(T)$  nad tělesem  $T$  stupně  $n$  spolu s násobením tvoří monoid  $M_n(T)(\cdot)$  (neutrálním prvkem je zde jednotková matice).

(4)  $\mathbb{Z}_n(\cdot)$  je konečný komutativní monoid, který není grupou, protože prvek  $0$  není invertibilní.

Nestanovíme-li jinak, bude v následujícím  $1$  označovat neutrální prvek operace  $\cdot$  (a  $0$  pro operaci  $+$ ) a  $s^{-1}$  bude inverzní prvek k  $s$  vzhledem k operaci  $\cdot$  (a  $-s$  bude inverz vzhledem k operaci  $+$ ).

**Poznámka 3.5.** Bud'  $S(\cdot)$  monoid a  $a, b, c \in S$ . Platí-li, že  $a \cdot b = c \cdot a = 1$ , potom  $b = c$  je jednoznačně určený inverzní prvek k prvku  $a$ .

*Důkaz.* S využitím asociativity spočítejme:

$$c = c \cdot 1 = c \cdot (a \cdot b) = (c \cdot a) \cdot b = 1 \cdot b = b,$$



odkud vidíme nejen rovnost  $b = c$ , ale i jednoznačnost, neboť dva prvky inverzní k  $a$  splňují podmínku předpokladu.  $\square$

**Poznámka 3.6.** Je-li  $S(\cdot)$  monoid a  $s, t \in S$  jeho invertibilní prvky, pak  $s \cdot t$  a  $s^{-1}$  jsou také invertibilní. Navíc  $(s \cdot t)^{-1} = t^{-1} \cdot s^{-1}$  a  $(s^{-1})^{-1} = s$ .

*Důkaz.* Protože  $s \cdot s^{-1} = s^{-1} \cdot s = 1$ , je zřejmě  $s^{-1}$  invertibilní a díky 3.5 máme  $(s^{-1})^{-1} = s$ . Nyní stačí dokázat, že je prvek  $t^{-1} \cdot s^{-1}$  inverzní k  $s \cdot t$ :

$$(s \cdot t) \cdot (t^{-1} \cdot s^{-1}) = s \cdot (t \cdot t^{-1}) \cdot s^{-1} = s \cdot 1 \cdot s^{-1} = s \cdot s^{-1} = 1$$

a symetricky

$$(t^{-1} \cdot s^{-1}) \cdot (s \cdot t) = t^{-1} \cdot (s^{-1} \cdot s) \cdot t = t^{-1} \cdot 1 \cdot t = t^{-1} \cdot t = 1.$$

$\square$

Množinu všech invertibilních prvků monoidu  $S(\cdot)$  budeme značit  $S^*$ . Všimněme si, že jsme v předchozí úvaze dokázali, že množina  $S^*$  je uzavřená na operaci  $\cdot$ , uvědomíme-li si navíc, že  $1 \in S^*$ , protože  $1 \cdot 1 = 1$ , dostáváme díky předchozí poznámce následující pozorování:

**Důsledek 3.7.** Necht'  $S(\cdot)$  je monoid. Označíme-li  $\cdot_{S^*}$  restrikci  $\cdot|_{S^* \times S^*}$  operace  $\cdot$  na množinu  $S^* \times S^*$ , pak  $S^*(\cdot_{S^*})$  je grupa.

**Příklad 3.8.** Necht'  $n > 1$  je přirozené číslo a  $X$  neprázdná množina.

- (1) Grupa invertibilních prvků  $M(X)(\cdot)$  obsahuje pouze neutrální prvek  $\epsilon$ .
- (2) Grupu invertibilních prvků transformačního monoidu  $T(X)(\circ)$  tvoří právě všechny bijekce  $S(X)$  na množině  $X$  (mluvíme o *symetrické grupě* nebo grupě permutací).
- (3) Grupu invertibilních prvků monoidu čtvercových matic  $M_n(T)(\cdot)$  stupně  $n$  tvoří právě všechny regulární matice stupně  $n$  (značíme je  $GL_n(T)$ ).
- (4) Ukážeme, že  $\mathbb{Z}_n^*(\cdot) = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \text{GCD}(a, n) = 1\}$ . Jestliže  $a \in \mathbb{Z}_n^*$ , existují  $x \in \mathbb{Z}_n$  a  $y \in \mathbb{Z}$ , pro něž  $ax + by = 1$ . Je-li  $s$  společný dělitel čísel  $a$ ,  $n$ , pak  $s/(ax + ny) = 1$ , proto  $\text{GCD}(a, n) = 1$ . Necht' naopak  $\text{GCD}(a, n) = 1$ , potom díky Euklidovu algoritmu existují  $x \in \mathbb{Z}_n$  a  $y \in \mathbb{Z}$ , pro které  $ax + ny = 1$ , proto  $a^{-1} = x \bmod n$ , tudíž  $a \in \mathbb{Z}_n^*$ . Jednoduchým důsledkem tohoto pozorování je fakt, že  $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$ .

#### 4. PODGRUPY

Nyní si pozorně prohlédneme ekvivalence na obecných grupách, které zcela přímočaře zobecňují kongruence na celých číslech. Jako důsledek souboru elementárních technických pozorování těchto ekvivalencí dostaneme dvě velmi důležitá tvrzení o struktuře grup: Lagrangeovu větu, která svazuje dělitelností velikost grupy a její podgrupy, a větu charakterizující všechny ekvivalence slučitelné s grupovou operací pomocí pojmu normální podgrupa.

**Definice.** Podgrupou grupy  $G(\cdot)$  budeme rozumět každou podmnožinu  $H$  množiny  $G$ , která je uzavřená na  $\cdot$ , obsahuje prvek  $1$  a pro jejíž každý prvek  $h \in H$  platí, že  $h^{-1} \in H$ . Normální podgrupa je podgrupa  $H$  grupy  $G$  splňující navíc podmínku  $g \cdot h \cdot g^{-1} \in H$  pro každé  $g \in G$  a  $h \in H$ .

Protože podle 3.6 pro každý prvek  $g$  grupy  $G(\cdot)$  platí, že  $(g^{-1})^{-1} = g$ , mohli jsme normální podgrupu  $H$  také ekvivalentně definovat také symetrickou podmínkou  $g^{-1} \cdot h \cdot g \in H$  pro každé  $g \in G$  a  $h \in H$ .

**Poznámka 4.1.** *Nechť  $G(\cdot)$  je grupa,  $H$  a  $H_i$ ,  $i \in I$  její podgrupy.*

- (1)  $H(\cdot)$  tvoří s operací omezenou na množinu  $H$  opět grupu,
- (2)  $\bigcap_{i \in I} H_i$  je podgrupa grupy  $G(\cdot)$ ,
- (3) jsou-li všechny podgrupy  $H_i$  normální, pak je i podgrupa  $\bigcap_{i \in I} H_i$  normální,
- (4) je-li  $G(\cdot)$  komutativní grupa, pak je podgrupa  $H$  vždy normální.

**Důkaz.** (1) Plyne okamžitě z definice podgrupy a vlastností operace  $\cdot$  na  $G$  (srovnej s 3.6).

(2)  $1 \in H_i$  pro všechna  $i \in I$  podle, tedy  $1 \in \bigcap_{i \in I} H_i$ . Zvolme libovolně  $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$ . Potom  $a \cdot b \in H_i$  pro každé  $i \in I$  díky uzavřenosti  $H_i$  na operaci  $\cdot$ , tedy  $a \cdot b \in \bigcap_{i \in I} H_i$ . Podobně podle definice  $a^{-1} \in H_i$  pro každé  $i \in I$ , proto  $a^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$ .

(3) Zvolme  $h \in \bigcap_{i \in I} H_i$  a  $g \in G$ . Pak  $g \cdot h \cdot g^{-1} \in H_i$  pro všechna  $i \in I$ , a tudíž  $g \cdot h \cdot g^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$ .

(4) Díky komutativitě binární operace platí pro každé  $g \in G$  a  $h \in H$ , že  $g \cdot h \cdot g^{-1} = g \cdot g^{-1} \cdot h = h \in H$ .  $\square$

**Příklad 4.2.** (1) Všimněme si, že v každé grupě  $G(\cdot)$  tvoří množiny  $\{1\}$  a  $G$  (tzv. *triviální*) příklady normálních podgrup.

(2) Uvažujme grupu permutací na množině  $\{1, \dots, n\}$ , obvykle se značí  $S_n(\circ)$  (viz také 3.8(2)). Snadno nahlédneme, že množina všech sudých permutací  $A_n$  je normální podgrupou  $S_n(\circ)$ . Navíc lze (elementárními prostředky) dokázat, že grupa  $S_n(\circ)$  neobsahuje pro  $n \neq 4$  jiné normální podgrupy než  $\{\text{Id}\}$ ,  $S_n$  a  $A_n$  (v případě  $S_4$  se vyskytuje ještě jedna tzv. Kleinova normální podgrupa  $K = \{\text{Id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ ). Uveďme alespoň příklad zjevné podgrupy  $T = \{\text{Id}, (12)\}$  grupy  $S_3$ , která není normální, protože například  $(13) \circ (12) \circ (13)^{-1} = (23) \notin T$ .

(3) Protože  $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$ , snadno spočítáme, že množiny  $S = \{\mathbf{A} \in GL_n(T) \mid \det(\mathbf{A}) = 1\}$  a  $P = \{\mathbf{A} \in GL_n(T) \mid \det(\mathbf{A}) = \pm 1\}$  jsou normální podgrupy grupy  $GL_n(T)(\cdot)$ .

(4) Uvažujme-li komutativní grupu celých čísel  $\mathbb{Z}(+)$  (s neutrálním prvkem 0 a inverzními prvky značenými standardně symbolem  $-$ ), potom množiny tvaru  $n\mathbb{Z} = \{n \cdot z \mid z \in \mathbb{Z}\}$  jsou pro každé nezáporné celé  $n$  podgrupou grupy  $\mathbb{Z}(+)$  (viz 1.1). Naopak, uvažujme libovolnou nenulovou podgrupu  $P$  grupy  $\mathbb{Z}(+)$ . Protože  $P$  obsahuje nějaký nenulový prvek a s každým  $a \in P$  je i  $-a \in P$ , leží v  $P$  jistě nějaký kladný prvek a my můžeme zvolit nejmenší kladné číslo obsažené v  $P$ , označme ho  $n$ . Ukažme, že nutně  $P = n\mathbb{Z}$ . Indukcí díky uzavřenosti  $P$  na sčítání nahlédneme, že  $2n = n + n \in P$ ,  $3n \in P$ ,  $\dots$ ,  $kn \in P$ ,  $\dots$ , pro každé přirozené  $k$ . Protože  $-n \in P$ , dostaneme stejným argumentem, že  $n\mathbb{Z} \subseteq P$ . Nyní zvolme libovolně  $a \in P$ . Potom vydělíme se zbytkem číslo  $a$  číslem  $n$ , t.j. najdeme celé  $q$  a nezáporné celé  $z < n$ , pro která  $a = qn + z$ . Z uzavřenosti  $P$  na  $+$  použité pro prvky  $a, -qn \in P$  plyne, že  $z = a + (-qn) \in P$ , a z minimality volby  $n$  dostáváme, že  $z = 0$ , tedy  $n\mathbb{Z} = P$ .

Nechť  $H$  a  $K$  jsou dvě podmnožiny grupy  $G(\cdot)$  a  $g \in G$ . Označme množiny  $H \cdot K = \{h \cdot k \mid h \in H, k \in K\}$ ,  $gH = \{g \cdot h\}$  a  $Hg = H \cdot \{g\}$ . V případě grup s operací  $\cdot$  budeme často psát  $hk$  místo  $h \cdot k$  a  $HK$  místo  $H \cdot K$ .

**Příklad 4.3.** (1) Mějme dvě normální podgrupy  $H$  a  $K$  grupy  $G(\cdot)$ . Pak pro každé  $h_0 \in H$  a  $k \in K$  existuje  $h_1 \in H$ , pro které  $k \cdot h_0 \cdot k^{-1} = h_1$ , tedy  $k \cdot h_0 = h_1 \cdot k$  a  $KH \subseteq HK$ . Symetrický argument dokazuje i obrácenou inkluzi, proto  $KH = HK$ . Nyní snadno nahlédneme, že je součin  $HK$  rovněž podgrupou  $G(\cdot)$ : zřejmě  $1 = 1 \cdot 1 \in HK$  a zvolíme-li  $h_0, h_1 \in H$  a  $k_0, k_1 \in K$ , potom  $(h_0 \cdot k_0)^{-1} = k_0^{-1} \cdot h_0^{-1} \in KH = HK$  a dále existuje takové  $h_2 \in H$ , že  $k_0 \cdot h_1 = h_2 \cdot k_0$ , proto  $h_0 \cdot k_0 \cdot h_1 \cdot k_1 = h_0 \cdot h_2 \cdot k_0 \cdot k_1 \in HK$ . Konečně vezmeme-li libovolné prvky  $g \in G$ ,  $h \in H$  a  $k \in K$ , pak platí  $g \cdot h \cdot k \cdot g^{-1} = (g \cdot h \cdot g^{-1}) \cdot (g \cdot k \cdot g^{-1}) \in HK$  díky předpokládané normalitě obou podgrup. Vidíme, že „součin“ normálních podgrup (například tedy součin libovolných podgrup komutativní grupy) dává opět normální podgrupu. Poznamenejme, že součin podgrup, které normální nejsou, vůbec nemusí být podgrupou (stačí uvážit například podgrupy  $H = \{Id, (12)\}$  a  $K = \{Id, (13)\}$  grupy  $S_3$ ).

(2) Uvažujeme-li komutativní grupu  $A(+)$  a  $H, K$  její podgrupy, pak  $H + K = \{h + k \mid h \in H, k \in K\}$  je podle předchozího pozorování opět podgrupa. Speciálně, vezmeme-li grupu celých čísel  $\mathbb{Z}(+)$ , pak  $30\mathbb{Z} + 54\mathbb{Z} = \{30x + 54y \mid x, y \in \mathbb{Z}\} = \text{GCD}(30, 54)\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$ . Všimněme si také, že  $30\mathbb{Z} \cap 54\mathbb{Z} = \{z \in \mathbb{Z} \mid 30/z, 54/z\} = \text{lcm}(30, 54)\mathbb{Z} = 270\mathbb{Z}$ .

**Definice.** Je-li  $G(\cdot)$  grupa  $H \subseteq G$ , definujeme na  $G$  relace  $\text{rmod } H$  a  $\text{lmod } H$ :

$$(a, b) \in \text{rmod } H \Leftrightarrow a \cdot b^{-1} \in H$$

$$(a, b) \in \text{lmod } H \Leftrightarrow a^{-1} \cdot b \in H$$

**Poznámka 4.4.** Nechť  $G(\cdot)$  je grupa a  $H$  její podgrupa. Potom platí:

- (1)  $\text{rmod } H$  i  $\text{lmod } H$  jsou ekvivalence na  $G$ ,
- (2)  $(a, b) \in \text{rmod } H \Leftrightarrow (a^{-1}, b^{-1}) \in \text{lmod } H$  pro každé  $a, b \in G$ ,
- (3)  $|G/\text{rmod } H| = |G/\text{lmod } H|$ ,
- (4)  $\text{rmod } H = \text{lmod } H$ , právě když je  $H$  normální podgrupa  $G(\cdot)$ ,
- (5)  $[a]_{\text{rmod } H} = Ha$  a  $[a]_{\text{lmod } H} = aH$  pro každé  $a \in G$ ,
- (6)  $|[a]_{\text{rmod } H}| = |[a]_{\text{lmod } H}| = |H|$  pro každé  $a \in G$ .

**Důkaz.** (1) Tvzení dokážeme jen o  $\text{rmod } H$ , pro  $\text{lmod } H$  bude důkaz symetrický. Podgrupa  $H$  obsahuje neutrální prvek 1, proto pro každé  $a \in G$  máme  $a \cdot a^{-1} = 1 \in H$ , tedy  $(a, a) \in \text{rmod } H$ . Předpokládáme-li, že  $(a, b) \in \text{rmod } H$ , pak  $a \cdot b^{-1} \in H$ , proto i  $b \cdot a^{-1} = (a \cdot b^{-1})^{-1} \in H$  (podle 3.5 a 3.6), tudíž  $(b, a) \in \text{rmod } H$ . Nyní předpokládejme, že  $(a, b), (b, c) \in \text{rmod } H$ , což podle definice naší relace znamená, že  $a \cdot b^{-1}, b \cdot c^{-1} \in H$ . Z uzavřenosti  $H$  na binární operaci plyne, že  $(a \cdot b^{-1}) \cdot (b \cdot c^{-1}) \in H$ , tedy  $a \cdot c^{-1} = a \cdot b^{-1} \cdot b \cdot c^{-1} \in H$  a  $(a, c) \in \text{rmod } H$ . Tím jsme ověřili, že je relace  $\text{rmod } H$  reflexivní, symetrická a tranzitivní.

(2) Díky 3.6 máme rovnost  $a \cdot b^{-1} = (a^{-1})^{-1} \cdot b^{-1}$ , proto  $a \cdot b^{-1} \in H \Leftrightarrow (a^{-1})^{-1} \cdot b^{-1} \in H$ , čímž jsme dokončili důkaz.

(3) Podle (2) je zobrazení  $[a]_{\text{rmod } H} \rightarrow [a^{-1}]_{\text{lmod } H}$  korektně definovanou bijekcí, tedy faktorové množiny  $G/\text{rmod } H$  a  $G/\text{lmod } H$  mají stejné prvky.

(4) Předpokládejme, že  $\text{rmod } H = \text{lmod } H$  a zvolme  $h \in H$  a  $g \in G$ . Potom  $(g \cdot h)^{-1} \cdot g = h^{-1} \cdot g^{-1} \cdot g = h^{-1} \in H$ , tedy  $(g \cdot h, g) \in \text{lmod } H = \text{rmod } H$ . Z definice  $\text{rmod } H$  dostaneme  $g \cdot h \cdot g^{-1} \in H$ .

Nyní předpokládejme, že je  $H$  normální podgrupa grupy  $G(\cdot)$ . Zvolíme-li  $(a, b) \in \text{rmod } H$ , víme, že  $a \cdot b^{-1} \in H$ . Podle definice normální podgrupy  $b^{-1} \cdot a = b^{-1} \cdot$

$a \cdot b^{-1} \cdot (b^{-1})^{-1} \in H$ , tedy  $(b, a) \in \text{lmod } H$  a díky (1)  $(a, b) \in \text{lmod } H$ , čímž jsme ověřili, že  $\text{rmod } H \subseteq \text{lmod } H$ . Symetrický argument dokazuje obrácenou implikaci.

(5) Opět se budeme věnovat jen ekvivalenci  $\text{rmod } H$ . Použijeme definici rozkladové třídy:

$$\begin{aligned} [a]_{\text{rmod } H} &= \{b \in G \mid (a, b) \in \text{rmod } H\} = \{b \in G \mid \exists h \in H : a \cdot b^{-1} = h\} = \\ &= \{b \in G \mid \exists h \in H : b = h^{-1} \cdot a\} = \{b \in G \mid \exists h' \in H : b = h' \cdot a\} = Ha. \end{aligned}$$

(6) Definujme zobrazení  $b : H \rightarrow Ha$  (resp.  $H \rightarrow aH$ ) předpisem  $b(h) = h \cdot a$  (resp.  $b(h) = a \cdot h$ ). Zřejmě jde o zobrazení na  $Ha$  (resp. na  $aH$ ) a předpokládejme, že  $b(h_0) = b(h_1)$ , tedy  $h_0 \cdot a = h_1 \cdot a$ . Tuto rovnost zprava (resp. zleva) přenásobíme hodnotou  $a^{-1}$ , abychom dostali  $h_0 = h_0 \cdot a \cdot a^{-1} = h_1 \cdot a \cdot a^{-1} = h_1$ . Tedy  $b$  je bijekce a všechny množiny  $H, aH, Ha$  mají stejný počet prvků. Nyní zbývá použít (5).  $\square$

**Definice.** Bud'  $H$  podgrupa grupy  $G(\cdot)$ . Potom číslu  $[G : H] = |G/\text{rmod } H|$  ( $= |G/\text{lmod } H|$  podle 4.4) budeme říkat **index podgrupy  $H$  v grupě  $G$**  a velikosti  $|G|$  množiny  $G$  budeme říkat **řád grupy  $G$** .

**Věta 4.5** (Lagrange). *Je-li  $H$  podgrupa grupy  $G(\cdot)$ , pak  $|G| = [G : H] \cdot |H|$ .*

*Důkaz.* Podle 4.4(1) je  $\text{rmod } H$  ekvivalence, proto  $G = \dot{\bigcup}_{A \in G/\text{rmod } H} A$ , kde sjednocujeme disjunktní množiny. Využijeme-li dále poznatek 4.4(6), který říká, že všechny ekvivalenční třídy mají počet prvků stejný jako množina  $H$ , pak dostáváme

$$|G| = \left| \dot{\bigcup}_{A \in G/\text{rmod } H} A \right| = \sum_{A \in G/\text{rmod } H} |A| = \sum_{A \in G/\text{rmod } H} |H| = [G : H] \cdot |H|.$$

$\square$

**Důsledek 4.6.** *Je-li  $G(\cdot)$  konečná grupa, potom řád každé její podgrupy dělí řád grupy  $G$ .*

**Příklad 4.7.** Z předchozího důsledku okamžitě plynou následující pozorování:

- (1) Grupa prvočíselného řádu obsahuje jen triviální podgrupy, tedy  $G$  a  $\{1\}$ .
- (2) Protože  $|S_{10}| = 10!$  a 11 nedělí  $10!$ , permutační grupa řádu  $S_{10}(o)$  neobsahuje žádnou podgrupu řádu 11.
- (3) Jsou-li  $H$  a  $K$  dvě konečné podgrupy nějaké grupy  $G(\cdot)$  a platí-li, že jsou řády  $H$  a  $K$  nesoudělné, pak  $H \cap K = \{1\}$ .

**Věta 4.8.** *Nechť  $G(\cdot)$  je grupa a  $\rho$  relace na  $G$ . Pak  $\rho$  je ekvivalence slučitelná s operací  $\cdot$  právě tehdy, když  $H = [1]_\rho$  je normální podgrupa  $G(\cdot)$  a  $\rho = \text{rmod } H$  ( $= \text{lmod } H$ ).*

*Důkaz.* ( $\Rightarrow$ ) Nejprve předpokládejme, že je  $\rho$  ekvivalence slučitelná s operací  $\cdot$ . Protože je  $\rho$  reflexivní relace, leží 1 v třídě  $[1]_\rho$ . Zvolme  $a, b \in [1]_\rho$  a  $g \in G$ . Vidíme, že  $(1, a), (1, b) \in \rho$ , navíc, z reflexivity  $\rho$  plyne, že  $(a^{-1}, a^{-1}), (g^{-1}, g^{-1}), (g, g) \in \rho$ . Nyní využijeme slučitelnosti  $\rho$  s  $\cdot$ , abychom dostali, že  $(1 \cdot 1, a \cdot b) \in \rho$ , dále že  $(1 \cdot a^{-1}, a \cdot a^{-1}) \in \rho$  a  $(g \cdot 1 \cdot g^{-1}, g \cdot a \cdot g^{-1}) \in \rho$ . Využijeme-li vlastností neutrálního prvku a symetrie  $\rho$ , vidíme, že  $(1, a \cdot b), (1, a^{-1}), (1, g \cdot a \cdot g^{-1}) \in \rho$ , tedy  $a \cdot b, a^{-1}, g \cdot a \cdot g^{-1} \in [1]_\rho$ , čímž máme ověřeno, že je  $[1]_\rho$  normální podgrupa  $G(\cdot)$ . Připomeňme, že podle 4.4(4)  $\text{rmod } [1]_\rho = \text{lmod } [1]_\rho$ .

Nyní bychom měli dokázat, že  $(a, b) \in \rho$ , právě když  $(a, b) \in \text{lmod } [1]_\rho$ . Jestliže nejprve  $(a, b) \in \rho$ , potom  $(1, a^{-1} \cdot b) = (a^{-1} \cdot a, a^{-1} \cdot b) \in \rho$ , protože je  $\rho$  ekvivalence

slučitelná s  $\cdot$ , tedy  $(a, b) \in \text{lmod } [1]_\rho$ . Naopak, zvolíme-li  $(a, b) \in \text{lmod } [1]_\rho$ , pak  $(a, b) = (a \cdot 1, a \cdot a^{-1} \cdot b) \in \rho$ .

( $\Leftarrow$ ) Předpokládejme, že je  $H$  normální podgrupa  $G(\cdot)$  a definujme relaci  $\rho$  jako  $\text{rmod } H$  (tj.  $(a, b) \in \rho \Leftrightarrow a \cdot b^{-1} \in H$ ). Podle 4.4(1) je  $\rho$  ekvivalence a přímým výpočtem zjistíme, že  $[1]_\rho = H$ . Zvolme nyní  $(a_0, b_0), (a_1, b_1) \in \rho$ , tj.  $a_0 \cdot b_0^{-1}$  i  $a_1 \cdot b_1^{-1}$  jsou prvky  $H$ . Nyní použijeme normalitu  $H$ , abychom dostali, že  $b_0^{-1} \cdot a_0 = b_0^{-1} \cdot (a_0 \cdot b_0^{-1}) \cdot b_0 \in H$ . Uzavřenost  $H$  na  $\cdot$  zaručuje, že  $b_0^{-1} \cdot a_0 \cdot a_1 \cdot b_1^{-1} \in H$  a dalším využitím normality získáme  $a_0 \cdot a_1 \cdot (b_0 \cdot b_1)^{-1} = b_0 \cdot (b_0^{-1} \cdot a_0 \cdot a_1 \cdot b_1^{-1}) \cdot b_0^{-1} \in H$ , tedy  $(a_0 \cdot a_1, b_0 \cdot b_1) \in \rho$ , čímž jsme ověřili slučitelnost  $\rho$  s operací  $\cdot$ .  $\square$

Všimněme si, že kongruence  $\equiv (\text{mod } n)$  na množině  $\mathbb{Z}(+)$  popsaná v Příkladu 2.3 je právě ekvivalencí  $\text{rmod } n\mathbb{Z} = \text{lmod } n\mathbb{Z}$ .

Vezmeme-li si například pro grupu  $H = \{\text{id}, (12)\}$  grupy permutací  $S_3(\circ)$ , která podle 4.2(2) není normální, ekvivalence  $\text{rmod } H$  podle předchozí věty není slučitelná s operací  $\circ$  a podle 4.4(4) platí  $\text{rmod } H \neq \text{lmod } H$ .

## 5. IZOMORFISMY A FAKTOROVÉ GRUPY

V této kapitole se seznámíme s homomorfismy, tedy se zobrazeními grup, které budou s to přenášet některé jejich vlastnosti. Mimořádné místo mezi homomorfismy zaujímají bijektivní homomorfismy, jimž budeme říkat izomorfismy. Nahlédneme, že na faktorizaci nosné množiny grupy, která umožňuje opětovné zavedení odpovídající grupové struktury, lze přirozeně nahlížet prostřednictvím homomorfismů. Hlavním výsledkem kapitoly budou dvě věty o izomorfismu, které nabízejí technicky velmi příjemné uchopení faktorizace.

**Definice.** Zobrazení  $f : G \rightarrow H$  grup  $G(\cdot)$  a  $H(\cdot)$  slučitelné s jejich binárními operacemi se nazývá (grupový) **homomorfismus**. Bijektivní homomorfismus budeme nazývat **izomorfismus**. Podmnožině  $\text{Ker } f = \{g \in G \mid f(g) = 1\}$  i relaci  $\text{ker } f = \{(g_1, g_2) \in G \times G \mid f(g_1) = f(g_2)\}$  budeme říkat **jádro homomorfismu**.

Jestliže mezi dvěma grupami  $G_1$  a  $G_2$  existuje izomorfismus, říkáme, že  $G_1$  a  $G_2$  jsou **izomorfní** a píšeme  $G_1 \cong G_2$ .

**Poznámka 5.1.** Nechť  $G_1(\cdot)$ ,  $G_2(\cdot)$  a  $G_3(\cdot)$  jsou grupy a  $f : G_1 \rightarrow G_2$  a  $g : G_2 \rightarrow G_3$  jsou homomorfismy.

- (1)  $f(1) = 1$  a  $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$  pro každé  $a \in G$
- (2)  $gf$  je homomorfismus,
- (3) je-li  $f$  bijekce, pak  $f^{-1}$  je izomorfismus,
- (4) obraz  $g(H)$  je podgrupa  $G_3(\cdot)$  a úplný vzor  $f^{-1}(H)$  je podgrupa  $G_1(\cdot)$  pro každou podgrupu  $H$  grupy  $G_2(\cdot)$ ,
- (5)  $\text{Ker } f$  je normální podgrupa  $G_1(\cdot)$  a  $\text{ker } f = \text{rmod Ker } f = \text{lmod Ker } f$  je ekvivalence slučitelná s operací  $\cdot$  na  $G_1$ ,
- (6)  $f$  je prostý homomorfismus, právě když  $\text{Ker } f = \{1\}$  a to nastává, právě když  $\text{ker } f = \text{id}$ .

**Důkaz.** (1) Protože  $f(1) = f(1 \cdot 1) = f(1) \cdot f(1)$ , stačí rovnost  $f(1) = f(1) \cdot f(1)$  přenásobit prvkem  $f(1)^{-1}$ , abychom dostali  $1 = f(1) \cdot f(1)^{-1} = f(1) \cdot f(1) \cdot f(1)^{-1} = f(1)$ . Dále  $1 = f(1) = f(a^{-1} \cdot a) = f(a^{-1}) \cdot f(a)$  a podobně  $1 = f(a) \cdot f(a^{-1})$ , proto  $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$ .

(2) Je-li  $a, b \in G_1$ , pak  $gf(a \cdot b) = g(f(a) \cdot f(b)) = g(f(a)) \cdot g(f(b))$ .

(3) Stačí ověřit, že  $f^{-1}$  je homomorfismus. Zvolíme-li  $c, d \in G_2$ , potom  $f(f^{-1}(c) \cdot f^{-1}(d)) = c \cdot d$ , proto  $f^{-1}(c) \cdot f^{-1}(d) = f^{-1}(c \cdot d)$ .

(4) Nejprve ukážeme, že je  $g(H)$  podgrupa  $G_3(\cdot)$ . Podle 5.1(1) je  $1 = g(1) \in g(H)$ . Vezmeme  $u, v \in g(H)$ , tj. existují  $c, d \in H$ , pro která  $g(c) = u$  a  $g(d) = v$ . Protože  $c \cdot d, c^{-1} \in H$ , dostáváme přímo z definice, že  $u \cdot v = g(c) \cdot g(d) = g(c \cdot d) \in g(H)$ , a  $u^{-1} = g(c)^{-1} = g(c^{-1}) \in g(H)$  podle 5.1(1).

Poznamenejme, že  $1 \in f^{-1}(H)$  a zvolme  $a, b \in f^{-1}(H)$ , tj.  $f(a), f(b) \in H$ . Potom opět  $f(a) \cdot f(b) = f(a \cdot b) \in H$ , a  $f(a^{-1}) = f(a)^{-1} \in H$ , tedy  $a \cdot b, a^{-1} \in f^{-1}(H)$ , proto je  $f^{-1}(H)$  podgrupa.

(5) Protože  $\{1\}$  je podgrupa  $G_2(\cdot)$  a  $\text{Ker } f = f^{-1}(\{1\})$ , je  $\text{Ker } f$  podgrupa podle (3). Vezmeme-li libovolné  $g \in G_1$  a  $h \in \text{Ker } f$ , potom

$$f(g \cdot h \cdot g^{-1}) = f(g) \cdot f(h) \cdot f(g^{-1}) = f(g) \cdot 1 \cdot f(g)^{-1} = 1,$$

tedy  $g \cdot h \cdot g^{-1} \in \text{Ker } f$ . Zbývá si uvědomit, že  $f(a) = f(b) \Leftrightarrow f(a) \cdot f(b)^{-1} = 1 \Leftrightarrow f(a \cdot b^{-1}) = 1 \Leftrightarrow a \cdot b^{-1} \in \text{Ker } f$ . Konečně  $\ker f = \text{rmod Ker } f = \text{lmod Ker } f$  je ekvivalence podle 4.8.

(6) Je-li  $f$  prosté, pak existuje jediný vzor jednotky, tedy  $\text{Ker } f = \{1\}$  a jestliže  $\ker f = \text{id}$ , pak je zřejmě  $f$  prosté. Konečně, jestliže  $\text{Ker } f = \{1\}$ , potom  $\ker f = \text{rmod Ker } f = \text{rmod } \{1\} = \text{id}$  podle (4).  $\square$

**Příklad 5.2.** (1) Jsou-li  $U$  a  $V$  dva vektorové prostory nad týmž tělesem a  $f : U \rightarrow V$  je lineární zobrazení, pak je  $f$  homomorfismus grup  $U(+)$  a  $V(+)$ , kde je  $+$  sčítáním vektorů.

(2) V rámci kurzu lineární algebry bylo dokázáno, že znaménko součinu permutací je rovno součinu jejich znamének, tedy, že  $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{1, -1\}$  je homomorfismus grup permutací na  $n$  prvcích a grupy  $\{1, -1\}(\cdot)$ . Snadno nahlédneme,  $\text{Ker } \text{sgn} = A_n$ , což je podle 5.1 normální podgrupa grupy  $S_n$ .

(3) Rovněž v lineární algebře se dokazuje, že determinant  $\det$  je homomorfismus z grupy regulárních matice  $n \times n$  nad tělesem  $T$  do multiplikativní grupy tělesa  $T \setminus \{0\}(\cdot)$  je homomorfismus a tedy  $\text{Ker } \det$  je díky 5.1 normální podgrupa matice s determinantem 1.

Je-li  $G$  množina a  $\rho$  ekvivalence na  $G$ , pak *přirozenou projekci* na faktorovou množinu  $G/\rho$  rozumíme zobrazení  $\pi_\rho : G \rightarrow G/\rho$  dané podmínkou  $\pi_\rho(g) = [g]_\rho$ , kde  $g \in G$ . Všimněme si, že  $\ker \pi_\rho = \rho$ .

**Věta 5.3.** *Nechť  $G(\cdot)$  je grupa a  $\rho$  ekvivalence na  $G$  slučitelná s  $\cdot$ . Na faktorové množině  $G/\rho$  definujeme operaci  $\odot$  předpisem  $[a]_\rho \odot [b]_\rho = [a \cdot b]_\rho$ . Tato definice je korektní,  $G/\rho(\odot)$  je opět grupa a přirozená projekce  $\pi_\rho$  je homomorfismus.*

*Důkaz.* Abychom ověřili korektnost definice, musíme ukázat, že definice nezávisí na volbě zástupce ekvivalenčních tříd. Mějme tedy  $[a]_\rho = [c]_\rho$  a  $[b]_\rho = [d]_\rho$ , tj.  $(a, c), (b, d) \in \rho$ . Potom díky **slučitelnosti  $\rho$**  s operací máme  $(a \cdot b, c \cdot d) \in \rho$ , proto  $[a \cdot b]_\rho = [c \cdot d]_\rho$ .

Vezmeme-li  $[a]_\rho, [b]_\rho, [c]_\rho \in \rho$ , pak přímo z definice vidíme, že

$$[a]_\rho \odot ([b]_\rho \odot [c]_\rho) = [a \cdot (b \cdot c)]_\rho = [(a \cdot b) \cdot c]_\rho = ([a]_\rho \odot [b]_\rho) \odot [c]_\rho,$$

tedy operace  $\odot$  je asociativní. To, že je neutrálním prvkem právě  $[1]_\rho$  a inverzním prvkem k prvku  $[a]_\rho$  právě prvek  $[a^{-1}]_\rho$ , dostaneme přímým výpočtem. Konečně  $\pi_\rho(a \cdot b) = [a \cdot b]_\rho = [a]_\rho \odot [b]_\rho = \pi_\rho(a) \odot \pi_\rho(b)$  z definice.  $\square$

Grupy zavedenou na faktorové množině budeme nazývat faktorovou grupou. Věta 4.8, která říká, že každé ekvivalenci  $\rho$  slučitelné s binární operací na grupě jednoznačně odpovídá normální podgrupa  $H = [1]_\rho$ , nám umožňuje faktorovou množinu zapisovat ve tvaru  $G/H$ , tedy  $G/H := G/\text{rmod } H$ .

Navíc je běžné, že se operace na faktorové grupě označuje stejně jako operace na původní grupě. Obvyklý zápis faktorové grupy  $G/\rho(\odot)$  bude tedy  $G/H(\cdot)$ , kde  $H = [1]_\rho$  a  $[a]_\rho \cdot [b]_\rho = [a \cdot b]_\rho$ . Podobně budeme přirozenou projekci  $G$  na  $G/H$  označovat symbolem  $\pi_H$  a místo  $[a]_\rho$  budeme psát  $[a]_H = aH = Ha$  (poslední rovnosti platí podle 4.4(4) a (5)).

**Příklad 5.4.** Uvážíme-li na grupě  $\mathbf{Z}(+)$  ekvivalenci  $\equiv (\text{mod } n)$  zavedenou v Příkladu 2.3, jedná se o ekvivalenci slučitelnou s operací  $+$  a  $[0]_{\equiv (\text{mod } n)} = n\mathbf{Z}$ , tedy  $\equiv (\text{mod } n) = \text{rmod } n\mathbf{Z}$  a na faktorové množině  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} = \mathbf{Z}/(\equiv (\text{mod } n))$  máme dobře zavedenou strukturu grupy  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}(+)$  předpisem  $[a]_{\equiv (\text{mod } n)} + [b]_{\equiv (\text{mod } n)} = [a + b]_{\equiv (\text{mod } n)}$ .

**Věta 5.5.** Nechť  $f : G_1 \rightarrow G_2$  je homomorfismus grup  $G_1(\cdot)$  a  $G_2(\cdot)$ .

(1) (Věta o homomorfismu) Je-li  $H$  normální podgrupa  $G_1(\cdot)$ , pak existuje homomorfismus  $g : G_1/H \rightarrow G_2$  splňující podmínku  $g\pi_H = f$  právě tehdy, když  $H \subseteq \text{Ker } f$  (tj.  $\text{rmod } H \subseteq \text{rmod } \text{Ker } f$ ). Navíc, jestliže  $g$  existuje, je  $g$  izomorfismus, právě když  $f$  je na a  $\text{Ker } f = H$ .

(2) (1. věta o izomorfismu)  $f(G_1)$  je podgrupa  $G_2$  (tedy opět grupa) a  $G_1/\text{Ker } f(\cdot)$  je izomorfní  $f(G_1)(\cdot)$ .

*Důkaz.* (1) Nejprve předpokládejme, že existuje homomorfismus  $g : G_1/H \rightarrow G_2$  splňující  $g\pi_H = f$ , tedy  $g([a]_H) = f(a)$ . Zvolme  $a \in H$ . Pak  $[a]_H = H = [1]_H$  je neutrální prvek grupy  $G_1/H(\cdot)$ , a proto  $f(a) = g([a]_H) = 1$  podle 5.1(1). Tedy  $a \in \text{Ker } f$ , čímž jsme ověřili, že  $H \subseteq \text{Ker } f$ .

Naopak, nechť  $H \subseteq \text{Ker } f$ . Musíme ověřit, že jediná možná definice  $g$  daná předpisem  $g([a]_H) = f(a)$  je korektní. Vezměme proto  $[a]_H = [b]_H$ . Potom  $a \cdot b^{-1} \in H \subseteq \text{Ker } f$ , tedy  $1 = f(a \cdot b^{-1}) = f(a) \cdot f(b)^{-1}$  podle 5.1(1), a proto  $f(a) = f(b)$ . Konečně

$$g([a]_H \cdot [b]_H) = g([a \cdot b]_H) = f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) = g([a]_H) \cdot g([b]_H),$$

tedy  $g$  je homomorfismus.

Zbývá ověřit závěrečnou ekvivalenci. Předně si uvědomme, že  $g(G_1/H) = f(G_1)$ , tedy  $g$  je na, právě když je  $f$  na. Nechť je  $g$  navíc prosté a zvolme  $a \in \text{Ker } f$ . Pak  $g([a]_H) = f(a) = 1$ . Protože  $g([1]_H) = g(H) = 1$ , plyne z prostoty  $g$ , že  $[a]_H = H$ , tedy  $a \in H$ . Ověřili jsme, že  $\text{Ker } f \subseteq H$ , a protože už víme, že  $H \subseteq \text{Ker } f$ , máme rovnost  $H = \text{Ker } f$ . Konečně předpokládejme, že  $g([a]_H) = g([b]_H)$ . Potom  $f(a) = f(b)$  a  $a \cdot b^{-1} \in \text{Ker } f = H$ . Tudíž  $(a, b) \in \text{rmod } H$  a  $[a]_H = [b]_H$ , čímž jsme ověřili, že je  $g$  prosté.

(2) Z 5.1(5) dostáváme, že  $f(G_1)$  je podgrupa  $G_2$ . Omezíme-li obor hodnot zobrazení  $f$ , můžeme ho chápat jako homomorfismus  $f : G_1 \rightarrow f(G_1)$ . Nyní aplikujeme (1) pro  $H = \text{Ker } f$  a dostaneme přímo požadovaný izomorfismus  $g : G_1/\text{Ker } f \rightarrow f(G_1)$ .  $\square$

**Věta 5.6** (2. věta o izomorfismu). Nechť  $G(\cdot)$  je grupa a  $H, K$  její normální podgrupy. Jestliže  $H \subseteq K$ , pak  $K/H$  je normální podgrupa grupy  $G/H(\cdot)$  a faktorová grupa  $G/K(\cdot)$  je izomorfní grupě  $(G/H)/(K/H)(\cdot)$ .

*Důkaz.* Nejprve použijeme 5.5(1) pro homomorfismy  $\pi_K : G \rightarrow G/K$  (jako  $f$  z 5.5(1)) a  $\pi_H : G \rightarrow G/H$  (jako  $\pi_H$  z 5.5(1)). Protože podle předpokladu  $H \subseteq K = \text{Ker}\pi_K$ , dává nám 5.5(1) homomorfismus  $g : G/H \rightarrow G/K$  splňující vztah  $g([a]_H) = [a]_K$ . Všimněme si, že je  $g$  zjevně na. Nyní přímočaře spočítáme  $\text{Ker}g = \{[a]_H \in G/H \mid g([a]_H) = [a]_K = [1]_K\} = K/H$ . Poznamenejme, že je  $\text{Ker}g = K/H$  normální podgrupa  $G/H(\cdot)$  podle 5.1(5). Nyní pro homomorfismus  $g$  využijeme 5.5(2), abychom dostali  $G/K = g(G/H) \cong (G/H)/\text{Ker}g = (G/H)/(K/H)$ .  $\square$

Máme-li tedy homomorfismus  $F_n : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}_n$  grupy  $\mathbf{Z}(+)$  do grupy  $\mathbf{Z}_n(+)$  s počítáním modulo  $n$  daný předpisem  $F_n(k) = (k) \bmod n$ , potom 5.5(2) zajišťuje izomorfismus  $\mathbf{Z}/\text{Ker } F_n(+) \cong \mathbf{Z}_n(+)$ . Navíc je zjevně  $(a, b) \in \text{ker } F_n$ , právě když  $n \mid (a - b)$ , a  $\text{Ker } F_n = n\mathbf{Z}$ .

## 6. CYKICKÉ GRUPY

V následující kapitole omezíme záběr našeho zkoumání na grupy, které jsou určeny jediným prvkem a obvykle nazývají *cyklické*. Nejen, že záhy nahlédneme, že jsou nutně komutativní, ale ukážeme, že jich je málo a že je všechny už známe, konkrétně, že jsou izomorfní některé z grup  $\mathbf{Z}(+)$  a  $\mathbf{Z}_n(+)$  pro  $n \in \mathbb{N}$ . S využitím dělitelnosti se proto ukáže, že víme dost o jejich struktuře.

Nejprve ovšem připomeňme, že podle 4.1(2) je průnik libovolného systému podgrup zase podgrupou. Uvážíme-li grupu  $G(\cdot)$  a podmnožinu  $X \subseteq G$ , pak průnik všech podgrup  $G(\cdot)$  obsahujících  $X$  je rovněž podgrupou obsahující  $X$ , označme ho  $\langle X \rangle$ , zjevně se jedná o nejmenší takovou podgrupu vzhledem k inkluzi. Speciálně budeme psát  $\langle g \rangle$  místo  $\langle \{g\} \rangle$ , je-li  $g \in G$ .

**Definice.** Buď  $G(\cdot)$  grupa a  $X \subseteq G$ . Podgrupu  $\langle X \rangle$  nazveme podgrupu  $G(\cdot)$  *generovanou* množinou  $X$ . Řekneme, že  $G(\cdot)$  je *cyklická grupa*, existuje-li takový prvek  $g \in G$ , že  $\langle g \rangle = G$ .

**Příklad 6.1.** (1)  $\mathbf{Z}(+)$  je cyklická grupa, kde  $\mathbf{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$ .

(2)  $\mathbf{Z}_n(+)$  je pro každé přirozené  $n$  cyklická grupa s operacemi definovanými modulo  $n$ , kde  $\mathbf{Z}_n = \langle a \rangle$ , právě když  $\text{GCD}(a, n) = 1$ .

Nechť  $G(\cdot)$  je grupa a  $a \in G$ . Definujme indukci:

$$\begin{aligned} a^0 &= 1, \\ a^n &= a^{n-1} \cdot a \text{ pro každé } n > 0, \\ a^n &= (a^{-1})^{-n} \text{ pro každé } n < 0. \end{aligned}$$

**Poznámka 6.2.** Nechť  $G(\cdot)$  je grupa a  $a \in G$ . Zobrazení  $\phi : \mathbf{Z} \rightarrow G$  dané předpisem  $\phi(n) = a^n$  je homomorfismus grupy  $\mathbf{Z}(+)$  do grupy  $G(\cdot)$  a  $\phi(\mathbf{Z}) = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbf{Z}\}$ .

*Důkaz.* Potřebujeme pro každou dvojici  $m, n \in \mathbf{Z}$  ověřit, že  $\phi(n + m) = a^{n+m} = a^n \cdot a^m = \phi(n) \cdot \phi(m)$ . Přitom  $a^{n+m} = a^n \cdot a^m$  zjevně platí pro obě nezáporná a obě záporná  $m, n$ . Je-li  $n$  záporné a  $m+n$  nezáporné, pak  $a^n \cdot a^m = (a^{-1})^{-n} \cdot a^m = a^{n+m}$ . Podobně pro  $n$  záporné,  $m$  kladné a  $m+n$  záporné máme  $a^n \cdot a^m = (a^{-1})^{-n} \cdot a^m = (a^{-1})^{-n-m} = a^{n+m}$ .

Závěrem poznamenejme, že  $\phi(\mathbf{Z})$  je právě tvaru  $\phi(\mathbf{Z}) = \{a^n \mid n \in \mathbf{Z}\}$ , a proto se jedná o nejmenší podgrupu  $G(\cdot)$  obsahující  $a$ .  $\square$



**Důsledek 6.3.** *Nechť  $G(\cdot)$  je grupa a  $a \in G$ . Potom pro každé  $n, m \in \mathbb{Z}$  platí, že  $a^{-n} = (a^n)^{-1}$  a  $(a^n)^m = a^{nm}$ .*

**Věta 6.4.** *Bud'  $G(\cdot)$  cyklická grupa.*

- (1) *Je-li  $G$  nekonečná, pak  $G(\cdot) \cong \mathbb{Z}(+)$ .*
- (2) *Je-li  $n = |G|$  konečné, pak  $G(\cdot) \cong \mathbb{Z}_n(+)$ .*

*Důkaz.* Vezměme nějaký generátor  $g$  cyklické grupy  $G(\cdot)$ , tedy  $\langle g \rangle = G$  a definujme zobrazení  $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow G$  dané předpisem  $\phi(n) = g^n$ . Podle 6.2 jde o homomorfismus a  $\phi(\mathbb{Z}) = \langle g \rangle = G$ , tedy  $\phi$  je zobrazení na. Nyní podle 5.5(2) je  $\mathbb{Z}/\text{Ker}\phi(+) \cong G(\cdot)$ . Zbývá si rozmyslet, jak vypadá  $\mathbb{Z}/\text{Ker}\phi$ . Z 4.2(4) víme, že  $\text{Ker}\phi = n\mathbb{Z}$  pro vhodné nezáporné celé  $n$ . V případě, že  $n = 0$ , pak  $\mathbb{Z}/\text{Ker}\phi = \mathbb{Z}/\{0\} \cong \mathbb{Z}$ , a v případě kladného  $n$  je  $\mathbb{Z}/\text{Ker}\phi = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$  podle 5.5(2).  $\square$

**Poznámka 6.5.** *Každá faktorová grupa i podgrupa cyklické grupy je opět cyklická.*

*Důkaz.* Snadno nahlédneme, že je-li  $g$  generátor cyklické grupy  $G(\cdot)$ , pak  $[g]_H$  je generátor její faktorové grupy  $G/H(\cdot)$ .

Díky 6.4 stačí tvrzení o podgrupách dokázat pro grupy  $\mathbb{Z}(+)$  a  $\mathbb{Z}_n(+)$ . Nejprve ho dokažme pro grupu  $\mathbb{Z}(+)$ . V 4.2(4) jsme ověřili, že  $\mathbb{Z}(+)$  jiné podgrupy než podgrupy tvaru  $n\mathbb{Z}$  neobsahuje. Přitom  $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$  je cyklická grupa, čímž je tvrzení ověřeno.

Nyní využijeme homomorfismu  $F_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$  z 1.1. Zvolíme-li podgrupu  $H$  grupy  $\mathbb{Z}_n(+)$ , pak  $F_n^{-1}(H)$  je podle předchozí úvahy a 5.1(5) cyklická podgrupa  $\mathbb{Z}$ , tedy  $H = F_n(F_n^{-1}(H))$  je cyklická podgrupa  $\mathbb{Z}_n(+)$ .  $\square$

Připomeňme, že pro každé přirozené  $k$  značíme  $k\mathbb{Z} = \langle k \rangle = \{kz \mid z \in \mathbb{Z}\}$ . Podobně budeme pro každé  $k \in \mathbb{Z}_n$  označovat  $k\mathbb{Z}_n = \langle k \rangle = \{k \cdot z \mid z \in \mathbb{Z}_n\}$ .

**Poznámka 6.6.** *Nechť  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$  a  $k/n$ . Pak  $a\mathbb{Z}_n = k\mathbb{Z}_n$ , právě když  $\text{GCD}(a, n) = k$ .*

*Důkaz.* Nejprve předpokládejme, že  $a\mathbb{Z}_n = k\mathbb{Z}_n$ . Potom  $k \in a\mathbb{Z}_n$ , tedy existuje celé  $x$ , pro které  $(a \cdot x) \bmod n = k$ . Proto také existuje takové celé  $y$ , že  $a \cdot x + n \cdot y = k$ . Odtud plyne, že  $\text{GCD}(a, n) \mid k$ . Podobně, protože  $a \in k\mathbb{Z}_n$  existují celá  $u$  a  $v$ , pro něž  $k \cdot u + n \cdot v = a$ , a protože  $k/n$ , nutně musí  $k/a$ . Vidíme, že  $k/\text{GCD}(a, n)$ , tudíž  $\text{GCD}(a, n) = k$ .

Nyní předpokládejme, že  $\text{GCD}(a, n) = k$ . Potom díky Euklidovu algoritmu existují  $x \in \mathbb{Z}_n$  a celé  $y$ , pro něž  $a \cdot x + n \cdot y = k$ . Proto  $(a \cdot x) \bmod n = k$ , tudíž  $k \in a\mathbb{Z}_n$  a  $k\mathbb{Z}_n \subseteq a\mathbb{Z}_n$ . Konečně, protože  $k/a$ , vidíme, že  $a \in k\mathbb{Z}_n$ , a proto  $a\mathbb{Z}_n \subseteq k\mathbb{Z}_n$ , což znamená, že  $k\mathbb{Z}_n = a\mathbb{Z}_n$ .  $\square$

Uvědomíme-li si, že speciálním případem předchozí poznámky pro  $k = 1$  je tvrzení, že  $a\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}_n$  (tj.  $a$  generuje grupu  $\mathbb{Z}_n(+)$ ), právě když  $\text{GCD}(a, n) = 1$ , okamžitě dostáváme:

**Důsledek 6.7.** *Je-li  $n \in \mathbb{N}$ , pak číslo  $\varphi(n)$  udává počet prvků, které generují grupu  $\mathbb{Z}_n(+)$  a počet invertibilních prvků monoidu  $\mathbb{Z}_n(\cdot)$ .*

## 7. KRYPTOGRAFICKÉ APLIKACE: PROTOKOL RSA A DISKRÉTNÍ LOGARITMUS

Teorie prezentovaná v předchozích třech kapitolách má několik elegantních kryptografických aplikací založených na jednoduchém pozorování, že je obvykle mnohem snazší v grupě mocnit, než ze známé mocniny určovat její základ či exponent. Dříve než se k popisu protokolu založeného na obtížnosti odmocňování (RSA v Příkladu 7.6) a protokolů, které se opírají o obtížnost diskrétního logaritmu (Příkladu 7.8) dostaneme, učiníme pozorování o řádu prvků, které je známo pod názvem Eulerova věta (Věta 7.2) a o struktuře uspořádané množiny podgrup konečné cyklické grupy (Věta 7.3).

**Poznámka 7.1.** Bud'  $G(\cdot)$  konečná grupa. Potom  $g^{|G|} = 1$  pro každý prvek  $g \in G$ .

*Důkaz.*  $\langle g \rangle$  je cyklická grupa řádu  $n$ , tedy je podle 6.4 izomorfní  $\mathbb{Z}_n(+)$ , proto  $g^n = 1$ . Podle 4.5  $n/|G|$ , tedy  $g^{|G|} = (g^n)^{\frac{|G|}{n}} = 1^{\frac{|G|}{n}} = 1$ , kde 1. rovnost plyne z 6.3.  $\square$

Poznamenejme, že řádem prvku  $g$  grupy  $G(\cdot)$  rozumíme právě řád cyklické podgrupy  $\langle g \rangle$  a exponentem prvku  $g$  rozumíme každé přirozené číslo  $n$ , pro které platí  $g^n = 1$ . Předchozí poznámka tedy říká, že řád konečné grupy je exponentem každého jejího prvku. Toto pozorování využije následující důsledek, který je pro prvočíselné  $n$  znám také jako Malá Fermatova věta:

**Věta 7.2** (Eulerova věta). Pro nesoudělná kladná celá čísla  $a, n > 1$  je

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

*Důkaz.* Díky Poznámce 2.4 tvrzení stačí dokázat pro kladné  $a < n$ . Použijeme k tomu Poznámku 7.1, kde jako grupu  $G$  vezmeme grupu invertibilních prvků  $\mathbb{Z}_n^*(\cdot)$  monoidu  $\mathbb{Z}_n(\cdot)$  tj. prvků nesoudělných s  $n$  podle 6.7. Protože  $a \in \mathbb{Z}_n^*$ , je  $(a^{\varphi(n)}) \bmod n = (a^{|\mathbb{Z}_n^*|}) \bmod n = 1$  díky 7.1 a 6.7.  $\square$

**Věta 7.3.** Nechť  $G(\cdot)$  je konečná cyklická grupa. Pak pro každé přirozené  $k$ , které dělí řád grupy  $G$ , existuje právě jedna podgrupa grupy  $G$  řádu  $k$ .

*Důkaz.* K důkazu využijeme charakterizace cyklických grup 6.4, díky němuž stačí tvrzení dokázat pro (izomorfní) grupu  $\mathbb{Z}_n(+)$ . Jestliže  $k = 1$ , je tvrzení triviální, předpokládejme tedy, že  $k > 1$ . Potom snadno nahlédneme, že množina  $\langle \frac{n}{k} \rangle = \{0, \frac{n}{k}, 2\frac{n}{k}, \dots, (k-1)\frac{n}{k}\}$  je podgrupa a  $|\langle \frac{n}{k} \rangle| = k$ .

Mějme nyní nějakou podgrupu  $H$  grupy  $\mathbb{Z}_n(+)$  řádu  $k$ . Pak je  $H$  podle 6.5 cyklická, a tedy existuje  $h \in H$ , pro  $H = \langle h \rangle$ . Z 7.1 plyne, že  $(k \cdot h) \bmod n = 0$ , a proto  $k \cdot h = c \cdot n$  pro vhodné celé číslo  $c$ . Tedy  $h = c \cdot \frac{n}{k}$ . Tím jsme ověřili, že  $H$  je částí podgrupy  $\langle \frac{n}{k} \rangle$ . Protože se jedná o dvě konečné stejně velké množiny, dostáváme, že  $H = \langle \frac{n}{k} \rangle$ , čímž jsme ověřili jednoznačnost volby.  $\square$

**Příklad 7.4.** (1) Uvažujme konečnou cyklickou grupu  $G(\cdot)$ . Potom nám 6.7 říká, že  $G(\cdot)$  obsahuje právě  $\varphi(|G|)$  generátorů. Protože díky Lagrangeově větě řád podgrupy vždy dělí řád grupy, podle 7.3  $G(\cdot)$  pro každý dělitel řádu cyklické grupy existuje právě jedna podgrupa daného řádu, obsahuje  $G(\cdot)$  právě tolik podgrup, kolik existuje dělitelů jejího řádu. Máme-li  $n = \prod_{i=1}^k p_i^{r_i}$ , kde  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  jsou prvočísla a  $r_i \in \mathbb{N}$ , pak děliteli  $n$  jsou právě čísla  $\prod_{i=1}^k p_i^{s_i}$ , kde  $0 \leq s_i \leq r_i$ , tedy  $G(\cdot)$  obsahuje právě  $\prod_{i=1}^k (r_i + 1)$  podgrup a podle 2.7 právě  $\prod_{i=1}^k (p_i - 1)p_i^{r_i-1}$  generátorů.

(2) Konkrétně, vezmeme-li cyklickou grupu  $\mathbb{Z}_{50}(+)$ . Protože  $50 = 2 \cdot 5^2$ , dostáváme z bodu (1), že  $\mathbb{Z}_{50}(+)$  obsahuje  $\varphi(50) = 20$  generátorů a právě  $6 = 2 \cdot 3$  podgrup. Vezmeme-li například podgrupu  $\langle 42 \rangle$  grupy  $\mathbb{Z}_{50}(+)$  (a jiné než cyklické podgroupy tato grupa podle 6.5 neobsahuje), pak díky 6.6 víme, že  $\langle 42 \rangle = \langle \text{GCD}(42, 50) \rangle = \langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}_{50}$ , a jedná se tedy o podgrupu řádu  $25 = \frac{50}{2}$ .

Nyní obrátíme pozornost k aplikacím předchozích pozorování. Následující pozorování slouží jako technický nástroj níže popsaného protokolu RSA.

**Poznámka 7.5.** Bud'  $p$  a  $q$  dvě různá lichá prvočísla a  $m = \text{lcm}(p-1, q-1)$ . Potom pro každé  $a \in \mathbb{Z}_{pq}$  a  $u \in \mathbb{N}$  platí, že  $(a^{m+1}) \bmod pq = a$ .

*Důkaz.* Nejprve ukážeme, že  $(a^{m+1}) \bmod pq = a$ .

Podle Věty 7.2  $(x^m) \bmod p = 1$  a  $(y^m) \bmod q = 1$  pro ta  $x$ , která nejsou násobkem  $p$  a ta  $y$ , která nejsou násobkem  $q$ . Dále zřejmě platí  $((up)^{m+1}) \bmod p = 0$ , a proto i  $(x^{m+1}) \bmod p = (x) \bmod p$  a  $(y^{m+1}) \bmod q = (y) \bmod q$  pro každé nezáporné celé  $x$  a  $y$ . Vezměme nyní  $a \in \mathbb{Z}_{pq}$ . Z předchozího pozorování plyne, že

$$((a) \bmod p, (a) \bmod q) = ((a^{m+1}) \bmod p, (a^{m+1}) \bmod q),$$

a díky Věte 2.6 použité pro bijekci  $\mathbb{Z}_{pq} \rightarrow \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$  dostáváme, že shodné jsou i vzory prvků  $((a) \bmod p, (a) \bmod q)$  a  $((a^{m+1}) \bmod p, (a^{m+1}) \bmod q)$ , proto  $(a^{m+1}) \bmod pq = a$ .

Nyní indukcí díky 6.3 dostáváme, že  $a^{um+1} = a^{(u-1)m} \cdot a^{m+1} = a^{(u-1)m+1} = a$  pro každé  $u \in \mathbb{N}$  a  $a \in \mathbb{Z}_{pq}$ .  $\square$

**Příklad 7.6** (Rivest, Shamir, Adleman). Nejprve zvolíme  $p$  a  $q$  dvě různá lichá prvočísla a položíme  $m = \text{lcm}(p-1, q-1)$ .

Vezměme  $e < m$  nesoudělné s  $m$  a pak (například pomocí Euklidova algoritmu) najdeme takové  $d < m$ , že  $(ed) \bmod m = 1$ . Nyní podle 7.5 pro každé  $a \in \mathbb{Z}_{pq}$  platí, že  $(a^e)^d = a^{ed} = a^{um+1} = a$  (počítáno v  $\mathbb{Z}_{pq}$ , tedy modulo  $pq$ ).

Pomocí vlastností čísel  $p, q, m, d, e$  můžeme nyní popsat protokol asymetrického šifrování známý pod zkratkou RSA. Položíme-li  $n = p \cdot q$ , je veřejným klíčem dvojice čísel  $(n, e)$  a soukromý klíč tvoří *tajný exponent*  $d$ . Chceme-li zprávu  $a \in \mathbb{Z}_n$  adresovat majiteli soukromého klíče, stačí ji zašifrovat pomocí mocnění veřejné známou hodnotou  $e$  v monoidu  $\mathbb{Z}_n(\cdot)$  a odeslat hodnotu  $x = (a^e) \bmod pq$ . K jejímu rozluštění stačí umocnit v  $\mathbb{Z}_n(\cdot)$  pomocí tajného exponentu, protože  $x^d = (a_i^e)^d = a_i^{ed} = a_i$ .

Naopak, zveřejnění-li majitel soukromého klíče zašifrovanou zprávu  $(a_1^d) \bmod n, \dots, (a_k^d) \bmod n$ , mohou si příjemci zprávy stejným způsobem (tj. umocněním na veřejně známý exponent  $e$ :  $((a_1^d)^e) \bmod n, \dots, ((a_k^d)^e) \bmod n = a_1, \dots, a_k$ ) ověřit, že odesílatel zprávy opravdu zná tajný exponent (vlastnictví soukromého klíče tedy garantuje pravost elektronického podpisu).

Poznamenejme, že je ze znalosti  $n = pq$  a  $e$  obtížné najít  $d$  (odpovídá to nalezení prvočíselného rozkladu čísla  $n$ , což je úloha, pro níž není znám algoritmus polynomiální časové složitosti), zatímco mocnění čísel v  $\mathbb{Z}_{pq}$  je (i pro velké exponenty a velké  $pq$ ) velmi snadné a rychlé.

Důkaz následujícího tvrzení o cyklických grupách je elegantnější, využijeme-li jistých znalostí z teorie polynomů nad obecným tělesem, proto ho provedeme později:

**Věta 7.7.** Nechť  $T$  je komutativní těleso s operacemi  $+$  a  $\cdot$  a nechť  $G$  je konečná podgrupa multiplikativní grupy  $T \setminus \{0\}(\cdot)$ . Potom  $G$  je cyklická grupa.

Zatímco je protokol RSA založen na diskretním odmocňování, následující dvě aplikace využívají tak zvaný problém **diskretního logaritmu**, tedy obtížnost **nalezení přírozeného  $n$**  pro známé prvky  $g, h$  vhodné grupy pro něž  $h = g^n$ .

**Příklad 7.8.** (1) (Diffieho–Hellmanův protokol výměny klíčů) Otázku domluvy tajného klíče veřejným kanálem lze s použitím cyklické grupy, například multiplikativní grupy  $\mathbb{Z}_p^*(\cdot)$  pro  $p$  (dostatečně velké) prvočíslo následovně: **Veřejným klíčem bude kromě prvočísla  $p$  ještě generátor  $g$  grupy  $\mathbb{Z}_p^*(\cdot)$** , tedy prvek splňující podmínku  $\langle g \rangle = \mathbb{Z}_p^*$ , který existuje díky Větě 7.7. Obě strany komunikace zvolí tajnou hodnotu číslo  $m$  a  $n$  ze  $\mathbb{Z}_p^*$  a **vzájemně si pošlou hodnotu  $x = g^m$  a  $y = g^n$** . Poté co obě strany umocní přijatou hodnotu na svůj tajný exponent, získají obě společný tajný klíč

$$s = x^n = g^{mn} = y^m.$$

Bez rychlého výpočtu diskretního logaritmu (který v grupě  $\mathbb{Z}_p^*(\cdot)$  není k dispozici) nelze ze znalosti hodnot  **$x$  a  $y$  zjistit hodnotu  $s$** .

(2) (ElGamal) Tentokrát využijeme problém diskretního logaritmu pro stejnou úlohu, kterou řeší 7.6. Opět zvolíme **cyklickou grupu  $G = G(\cdot)$ , její generátor  $g$  a náhodné číslo  $k \in \mathbb{Z}_{|G|}$**  a spočítáme  **$b = a^k$**  (bohužel nemůžeme už vzít například grupu  $\mathbb{Z}_p^*(\cdot)$  pro  $p$  prvočíslo, protože je pro ni je znám útok, který popisovaný protokol prolomí, místo toho se obvykle volí grupa definovaná pomocí eliptických křivek). Veřejný klíč je potom trojice  **$G, a, b$  a tajným klíčem hodnota  $k$** . Chceme-li **zašifrovat zprávu  $x \in G$** , náhodně zvolíme  **$r \in \mathbb{Z}_{|G|}$**  a spočítáme  **$c_1 = a^r$  a  $c_2 = x \cdot b^r$** . Posílanou zprávou je dvojice  $(c_1, c_2)$ , kterou příjemce znalý tajného klíče snadno rozšifruje výpočtem

$$c_2 \cdot c_1^{-k} = x \cdot b^r \cdot (a^r)^{-k} = x \cdot a^{kr} \cdot a^{-kr} = x.$$

I tentokrát bez schopnosti rychlého výpočtu diskretního logaritmu nelze ze znalosti veřejného klíče a hodnot dvojice  $(c_1, c_2)$  zprávu  $x$  rozšifrovat.

## 8. UNIVERZÁLNÍ POHLED: POJEM ALGEBRY

Smyslem této kapitoly je nahlédnout, že některé výsledky, které jsme formulovali pro grupy platí v téměř nezměněné podobě i v mnohem obecnějším kontextu a lze jich tak využít i pro algebraické objekty, které s grupami mají strukturně jen málo společného. Hlavním konceptem, kterého si všimneme, budou **homomorfismy a izomorfismy** (Poznámka 8.5) a **myšlenka faktorizace** (Věta 8.7).

Připomeňme, že každé zobrazení  $A^n \rightarrow A$  pro celé  $n \geq 0$  se nazývá  **$n$ -ární operací na množině  $A$** , kde  $n$  budeme nazývat **arita** neboli **četnost** operace. Zavedme nyní pojem obecné algebry:

**Definice.** Je-li  **$I$  množina**, budeme říkat zobrazení  $\Omega : I \rightarrow \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$  *typ*. Řekneme, že  $A(\alpha_i | i \in I)$  je **algebra typu  $\Omega$** , je-li  $A$  neprázdná a pro každé  $i \in I$  je  $\alpha_i$  právě  $\Omega(i)$ -ární operací na  $A$ .

**Příklad 8.1.** (1) Uvážíme grupu  $G(\cdot)$  s unární operací inverzního prvku  $^{-1}$  a nulární operací 1. **Pak  $G(\cdot), G(\cdot, ^{-1}), G(\cdot, ^{-1}, 1)$  tvoří (nejen formálně) různé algebry.**

(2) Je-li  $\mathbf{T}$  těleso, pak je algebrou  $\mathbf{T}(+, \cdot)$  či  $\mathbf{T}(+, -, \cdot, 0, 1)$ , pro vektorový prostor  $V$  nad  $\mathbf{T}$ , je algebrou  **$V(+, \cdot | t \in \mathbf{T})$  nebo  $V(+, 0, \cdot | t \in \mathbf{T})$** . Všimněme si, že pro nekonečné těleso potřebujeme uvažovat **nekonečně mnoho unárních operací**.

**Definice.** Buď  $\alpha$   $n$ -ární operace na  $A$ . Řekneme, že podmnožina  $B \subseteq A$  je *uzavřená na operaci  $\alpha$* , jestliže  $\alpha(a_1, \dots, a_n) \in B$  pro všechna  $a_1, \dots, a_n \in B$ . Řekneme, že  $B \subseteq A$  je *podalgebra* algebry  $A(\alpha_i | i \in I)$ , je-li  $B$  uzavřená na všechny operace  $\alpha_i$ ,  $i \in I$ .

**Příklad 8.2.** Nahlédneme, jak v jednotlivých případech algeber z Příkladu 8.1 vypadají podalgebry.

(1) Pro grupu  $G(\cdot)$  máme:

- (a) Podalgebry  $G(\cdot, ^{-1}, 1)$  jsou právě podmnožiny  $G$  uzavřené na 1 (tj. obsahující prvek 1), na inverzy a součiny, což jsou podle definice právě podgrupy grupy  $G(\cdot)$ .
- (b) Je-li  $H$  neprázdna podalgebra  $G(\cdot, ^{-1})$ , pak existuje  $h \in H$ , a proto  $1 = h \cdot h^{-1} \in H$ . Tedy neprázdne podalgebry  $G(\cdot, ^{-1})$  jsou právě podgrupy  $G(\cdot)$ , navíc prázdná množina je v souladu s definicí také podalgebra.
- (c) Podalgeber algebry  $G(\cdot)$  je obecně mnohem víc než podgrup grupy  $G(\cdot)$ . Například pro každé  $g \in G$  a  $n \in \mathbb{N}$  tvoří množina  $\{g^k | k \geq n\}$  podalgebru  $G(\cdot)$ . V případě  $G(\cdot) = \mathbb{Z}(+)$  to znamená, že množiny  $\{ak | k \geq n\}$  jsou podalgebry, speciálně množina všech přirozených čísel, která  $\mathbb{Z}(+)$  určitě není.

(2) Podalgebrou algebry  $V(+, 0, \cdot | t \in \mathbf{T})$  jsou právě podprostory tohoto vektorového prostoru a podalgebry algebry  $V(+, \cdot | t \in \mathbf{T})$  jsou právě podprostory a prázdná množina.

Označíme-li  $\beta_i = \alpha_i|_{B^n}$  omezení  $n$ -ární operace  $\alpha_i$  na  $B^n$ , potom pro podalgebru  $B$  leží všechny hodnoty zobrazení  $\beta_i$  opět v  $B$ . Zobrazení  $\beta_i$  tedy můžeme chápat jako operace na množině  $B$  a tak dostáváme strukturu algebry  $B(\beta_i | i \in I)$  na každé podalgebře  $B$ .

**Definice.** Necht' symbol  $\alpha$  označuje  $n$ -ární operaci na množině  $A$  i  $B$ . Řekneme, že zobrazení  $f : A \rightarrow B$  je *slučitelné s operací  $\alpha$* , jestliže  $f(\alpha(a_1, \dots, a_n)) = \alpha(f(a_1), \dots, f(a_n))$ . Zobrazení  $f : A \rightarrow B$  mezi dvěma algebrami  $A(\alpha_i | i \in I)$  a  $B(\alpha_i | i \in I)$  stejného typu  $\Omega$  budeme říkat *homomorfismus*, je-li slučitelné se všemi operacemi  $\alpha_i$ ,  $i \in I$ . Bijektivní homomorfismus budeme nazývat *izomorfismus*. Jestliže mezi dvěma algebrami  $A(\alpha_i | i \in I)$  a  $B(\alpha_i | i \in I)$  existuje izomorfismus, říkáme, že  $A$  a  $B$  jsou *izomorfní* a píšeme  $A(\alpha_i | i \in I) \cong B(\alpha_i | i \in I)$  nebo zjednodušeně  $A \cong B$ .

**Příklad 8.3.** (1) Buď  $G_i(\cdot)$  pro  $i = 1, 2$  grupy s unární operací inverzního prvku  $^{-1}$  a nulární operací 1. pak každý homomorfismus grup  $G_1(\cdot)$  a  $G_2(\cdot)$  je podle 5.1(1) homomorfismem algeber  $G_1(\cdot)$  a  $G_2(\cdot)$ ,  $G_1(\cdot, ^{-1})$  a  $G_2(\cdot, ^{-1})$  i  $G_1(\cdot, ^{-1}, 1)$  a  $G_2(\cdot, ^{-1}, 1)$ .

(2) Necht'  $U$  a  $V$  jsou dva vektorové prostory nad tělesem  $T$ . Potom každé lineární zobrazení (homomorfismus) vektorových prostorů je homomorfismem algeber  $U(+, \cdot | t \in T)$  a  $V(+, \cdot | t \in T)$ .

**Definice.** Necht'  $\rho$  je ekvivalence a  $\alpha$  je  $n$ -ární operace na množině  $A$ . Řekneme, že  $\rho$  je *slučitelná s  $\alpha$* , jestliže pro každý systém prvků  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in A$ , pro které  $(a_i, b_i) \in \rho$ ,  $i = 1, \dots, n$ , platí, že  $(\alpha(a_1, \dots, a_n), \alpha(b_1, \dots, b_n)) \in \rho$ . Je-li  $A(\alpha_i | i \in I)$  algebra a  $\rho$  ekvivalence na množině  $A$ , pak  $\rho$  nazveme *kongruencí*, je-li  $\rho$  slučitelná se všemi operacemi  $\alpha_i$ ,  $i \in I$ .

**Příklad 8.4.** (1)  $\text{id}$  a  $A \times A$  jsou kongruence na libovolné algebře  $A$ .

(2) Každá ekvivalence je slučitelná s libovolnou nulární operací.

(3) Ekvivalence slučitelná s operací  $\cdot$  na grupě  $G(\cdot)$  je kongruencí algeber  $G(\cdot)$ ,  $G(\cdot, {}^{-1})$  a  $G(\cdot, {}^{-1}, 1)$ .

Připomeňme, že je-li  $f : A \rightarrow B$  zobrazení, rozumíme jeho jádrem  $\ker f$  relaci danou předpisem:  $(a, b) \in \ker f \Leftrightarrow f(a) = f(b)$ . Nyní jsme připraveni vyslovit obdobu Poznámky 5.1 pro obecné algebry:

**Poznámka 8.5.** Necht'  $A_1(\alpha_i \mid i \in I)$ ,  $A_2(\alpha_i \mid i \in I)$  a  $A_3(\alpha_i \mid i \in I)$  jsou algebry stejného typu,  $f : A_1 \rightarrow A_2$  a  $g : A_2 \rightarrow A_3$  jsou homomorfismy a  $B$  je podalgebra algebry  $A_2(\cdot)$ .

- (1)  $gf$  je také homomorfismus,
- (2) je-li  $f$  bijekce, pak  $f^{-1}$  je izomorfismus,
- (3) obraz  $g(B)$  je podalgebra algebry  $A_3(\alpha_i \mid i \in I)$  a úplný vzor  $f^{-1}(B)$  je podalgebra algebry  $A_1(\alpha_i \mid i \in I)$ ,
- (4)  $\ker f$  je kongruence na algebře  $A_1(\alpha_i \mid i \in I)$ .

*Důkaz.* Důkaz je snadným zobecněním důkazu příslušných bodů 5.1.

(1) Je-li  $\alpha_i$   $n$ -ární operace na  $A_1$ ,  $A_2$  a  $A_3$  a vezmeme-li  $a_1, \dots, a_n \in A_1$ , pak  $gf(\alpha_i(a_1, \dots, a_n)) = g(\alpha_i(f(a_1), \dots, f(a_n))) = \alpha_i(gf(a_1), \dots, gf(a_n))$ .

(2) Stačí opět ověřit, že  $f^{-1}$  je homomorfismus. Zvolíme-li libovolné  $n$ -ární operaci  $\alpha_i$  a prvky  $a_1, \dots, a_n \in A_2$ , potom  $f(\alpha_i(f^{-1}(a_1), \dots, f^{-1}(a_n))) = \alpha_i(a_1, \dots, a_n)$ , proto  $\alpha_i(f^{-1}(a_1), \dots, f^{-1}(a_n)) = f^{-1}(\alpha_i(a_1, \dots, a_n))$ .

(3) Necht' je opět  $\alpha_i$  libovolná  $n$ -ární operace na  $A_2$  i  $A_3$ . Vezmeme nejprve  $c_1, \dots, c_n \in g(B)$ , tj. existují  $b_1, \dots, b_n \in B$ , pro která  $g(b_j) = c_j$ ,  $j = 1, \dots, n$ . Protože  $\alpha_i(b_1, \dots, b_n) \in B$ , dostáváme bezprostředně z definice, že  $\alpha_i(c_1, \dots, c_n) = \alpha_i(g(b_1), \dots, g(b_n)) = g(\alpha_i(b_1, \dots, b_n)) \in g(B)$ .

Nyní zvolme  $a_1, \dots, a_n \in f^{-1}(B)$ , tj.  $f(a_j) \in B$ . Potom  $f(\alpha_i(a_1, \dots, a_n)) = \alpha_i(f(a_1), \dots, f(a_n)) \in B$ .

(4) Vezmeme  $n$ -ární operaci  $\alpha_i$  na  $A_1$  a  $A_2$  a prvky  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in A_1$ , o nichž víme, že  $(a_j, b_j) \in \ker f$ , tedy  $f(a_j) = f(b_j)$ , pro každé  $j = 1 \dots n$ . Potom z definice homomorfismu dostaneme rovnost

$$f(\alpha_i(a_1, \dots, a_n)) = \alpha_i(f(a_1), \dots, f(a_n)) = \alpha_i(f(b_1), \dots, f(b_n)) = f(\alpha_i(b_1, \dots, b_n)),$$

čímž jsme ověřili, že  $(\alpha_i(a_1, \dots, a_n), \alpha_i(b_1, \dots, b_n)) \in \ker f$ . Že se jedná o ekvivalenci je snadné cvičení.  $\square$

**Poznámka 8.6.** Necht'  $A(\alpha_i \mid i \in I)$  je algebra a  $A_j$  jsou podalgebry  $A$  a  $\rho_j$  kongruence na  $A$  pro každé  $j \in J$ .

- (1)  $\bigcap_{j \in J} A_j$  je podalgebra  $A$ ,
- (2)  $\bigcap_{j \in J} \rho_j$  je kongruence na  $A$ .

*Důkaz.* (1) Obdoba Poznámky 4.1(2). Necht'  $\alpha_i$  je libovolná  $n$ -ární operace na  $A$  a  $a_1, \dots, a_n \in \bigcap_{j \in J} A_j$ . Protože  $\bigcap_{j \in J} A_j \subseteq A_k$  pro každé  $k \in J$  a  $A_k$  je podalgebra  $A(\alpha_i \mid i \in I)$  máme  $\alpha_i(a_1, \dots, a_n) \in A_k$ , tedy  $\alpha_i(a_1, \dots, a_n) \in \bigcap_{j \in J} A_j$ .

(2) Fakt, že je průnik ekvivalencí je ekvivalence je snadné cvičení.

Mějme  $\alpha_i$  nějakou  $n$ -ární operaci na  $A$  a vezmeme prvky  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in A$ , pro něž platí, že  $(a_k, b_k) \in \bigcap_{j \in J} \rho_j$  ( $\subseteq \rho_j$  pro všechna  $j \in J$ ). Potom pro všechna  $j \in J$  máme  $(\alpha_i(a_1, \dots, a_n), \alpha_i(b_1, \dots, b_n)) \in \rho_j$ , tedy  $(\alpha_i(a_1, \dots, a_n), \alpha_i(b_1, \dots, b_n)) \in \bigcap_{j \in J} \rho_j$ .  $\square$

V případě, že nemůžeme dojít k omylu nebo jednotlivé operace na algebře nepotřebujeme explicitně uvažovat, budeme v následujícím označovat algebru jen její nosnou množinou.

**Definice.** Nechť  $\rho$  je ekvivalence a  $\alpha$  je  $n$ -ární operace na množině  $A$ . Je-li  $\rho$  slučitelná s  $\alpha$ , definujeme operaci  $\alpha$  na faktoru  $A/\rho$  předpisem  $\alpha([a_1]_\rho, \dots, [a_n]_\rho) = [\alpha(a_1, \dots, a_n)]_\rho$ . Je-li  $\rho$  kongruence na algebře  $A$ , pak tímto způsobem definujeme na  $A/\rho$  strukturu algebry stejného typu.

Následující tvrzení je obecnou variantou grupové Věty 5.3.

**Věta 8.7.** Je-li  $\rho$  kongruence na algebře  $A$ , pak je definice algebry  $A/\rho$  korektní, jde o algebru stejného typu jako  $A$  a přirozená projekce  $\pi_\rho : A \rightarrow A/\rho$  je homomorfismus.

*Důkaz.* Vezmeme libovolnou  $n$ -ární operaci  $\alpha$  algebry  $A$  a nechť  $[a_j]_\rho = [b_j]_\rho$ , kde  $j = 1, \dots, n$ . Potom  $(a_j, b_j) \in \rho$ , kde  $j = 1, \dots, n$ , proto  $[\alpha(a_1, \dots, a_n)]_\rho = [\alpha(b_1, \dots, b_n)]_\rho$ , tedy definice operací na  $A/\rho$  je korektní. Zbytek tvrzení je přímý důsledek definice.  $\square$

**Definice.** Nechť  $\rho \subseteq \sigma$  jsou dvě ekvivalence na  $A$ . Definujeme relaci  $\sigma/\rho$  na  $A/\rho$  následovně:  $([a]_\rho, [b]_\rho) \in \sigma/\rho \Leftrightarrow (a, b) \in \sigma$ .

**Poznámka 8.8.** Bud'  $\rho$  kongruence na algebře  $A$ .

(1) Je-li  $\sigma$  kongruence na  $A$  obsahující  $\rho$ , je  $\sigma/\rho$  dobře definovaná kongruence na algebře  $A/\rho$ .

(2) Je-li  $\eta$  kongruence na algebře  $A/\rho$ , potom existuje právě jedna kongruence  $\sigma$  na algebře  $A$  obsahující  $\rho$ , pro níž  $\eta = \sigma/\rho$ .

*Důkaz.* (1) Stačí ověřit, že je  $\sigma/\rho$  dobře definovaná, zbytek je okamžitým důsledkem definice  $\sigma/\rho$  a operace na faktorové algebře  $A/\rho$ . Mějme  $[a_1]_\rho = [a_2]_\rho$ ,  $[b_1]_\rho = [b_2]_\rho$ . Potom  $(a_1, a_2), (b_1, b_2) \in \rho \subseteq \sigma$ , tedy díky tranzitivitě a symetrii  $\sigma$  platí, že  $(a_1, b_1) \in \sigma \Leftrightarrow (a_2, b_2) \in \sigma$ .

(2) Jediný možný způsob, jak definovat  $\sigma$  nám dává předpis  $(a, b) \in \sigma \Leftrightarrow ([a]_\rho, [b]_\rho) \in \eta$ . Nyní stačí přímočaře nahlédnout, že jsme takto zavedli kongruenci na  $A$ .  $\square$

## 9. IZOMORFISMY ALGEBER

Navážeme na předchozí kapitolu a vyslovíme obecnou verzi Věty o homomorfismu a Vět o izomorfismu a pozorněji než v grupovém případě prozkoumáme otázku, proč dvě izomorfní algebry chápeme jako stejné.

**Věta 9.1.** Nechť  $f : A \rightarrow B$  je homomorfismus dvou algeber stejného typu.

(1) (Věta o homomorfismu) Je-li  $\rho$  kongruence na algebře  $A$ , pak existuje homomorfismus  $g : A/\rho \rightarrow B$  splňující podmínku  $g\pi_\rho = f$  právě tehdy, když  $\rho \subseteq \ker f$ . Navíc, pokud  $g$  existuje, je  $g$  izomorfismus, právě když  $f$  je na a  $\ker f = \rho$ .

(2) (1. věta o izomorfismu)  $f(A)$  je podalgebra  $B$  (tedy algebra stejného typu) a  $A/\ker f$  je izomorfní  $f(A)$ .

*Důkaz.* Tvrzení dokážeme stejně jako Větu o homomorfismu a 1. věta o izomorfismu pro grupy (5.5).

(1) Nejprve předpokládejme, že existuje homomorfismus  $g : A/\rho \rightarrow B$  splňující podmínku  $g\pi_\rho = f$ , tedy  $g([a]_\rho) = f(a)$  a vezměme  $(a_1, a_2) \in \rho$ . Pak  $[a_1]_\rho = [a_2]_\rho$ , a proto  $f(a_1) = g([a_1]_\rho) = g([a_2]_\rho) = f(a_2)$ . Tedy  $(a_1, a_2) \in \ker f$ .

Je-li naopak  $\rho \subseteq \ker f$ , ověřujeme, že definice  $g$  daná předpisem  $g([a]_\rho) = f(a)$  je korektní. Vezmeme-li  $[a_1]_\rho = [a_2]_\rho \subseteq \ker f$ , pak  $g([a_1]_\rho) = f(a_1) = f(a_2) = g([a_2]_\rho)$ . Že je  $g$  homomorfismus je zjevné z jeho definice.

Konečně dokažme závěrečnou ekvivalenci. Protože  $g(G_1/\rho) = f(G_1)$ , vidíme, že  $g$  je na, právě když je  $f$  na. Je-li  $g$  navíc prosté a zvolíme-li  $(a_1, a_2) \in \ker f$ , pak  $g([a_1]_\rho) = f(a_1) = f(a_2) = g([a_2]_\rho)$ , a proto  $(a_1, a_2) \in \rho$ . Ověřili jsme, že  $\ker f \subseteq \rho$ , a protože už víme, že  $\rho \subseteq \ker f$ , máme rovnost  $\rho = \ker f$ . Konečně předpokládejme, že  $g([a_1]_\rho) = g([a_2]_\rho)$ . Potom  $f(a_1) = f(a_2)$ , a proto  $(a_1, a_2) \in \rho$  a  $[a_1]_\rho = [a_2]_\rho$ , čímž jsme ověřili, že je  $g$  prosté.

(2) Rozmyslíme si, že podle 8.5(3) je  $f(A)$  je podalgebra  $B$  a poté stejně jako v důkazu 5.5(2) použijeme Větu o homomorfismu (1) na  $\rho = \ker f$ .  $\square$

**Věta 9.2** (2. věta o izomorfismu). *Nechť  $\rho \subseteq \sigma$  jsou dvě kongruence na algebře  $A$ . Pak algebra  $A/\sigma$  je izomorfní algebře  $(A/\rho)/(\sigma/\rho)$ .*

*Důkaz.* I tentokrát postupujeme stejně jako v důkazu Věty o izomorfismu pro grupy 5.6: nejprve použijeme 9.1(1) pro homomorfismy  $\pi_\sigma : A \rightarrow A/\sigma$  a  $\pi_\rho : A \rightarrow A/\rho$ , která nám dává homomorfismus  $g : A/\rho \rightarrow A/\sigma$  splňující vztah  $g([a]_\rho) = [a]_\sigma$ . Zbývá spočítat  $\ker g = \sigma/\rho$  a použít 9.1(2).  $\square$

Nyní zobecníme definici ze začátku 6.kapitoly.

**Definice.** Bud'  $A$  algebra a  $X \subseteq A$ . Potom podalgebru  $\langle X \rangle$  algebry  $A$ , kterou dostaneme jako průnik všech podalgeber  $A$  obsahujících množinu  $X$  nazveme **podalgebrou generovanou  $X$**  (nebo budeme říkat, že  $X$  *generuje* podalgebru  $\langle X \rangle$ ).

**Příklad 9.3.** (1) Uvažujme algebru  $\mathbf{Z}(+)$ . Pak sice  $\langle \{1\} \rangle = \mathbf{N}$ , ale nejmenší podalgebra  $\mathbf{Z}(+)$  obsahující množinu  $\{-1, 1\}$  je už rovna celému  $\mathbf{Z}$  tj.  $\langle \{-1, 1\} \rangle = \mathbf{Z}$ .

(2) Uvažujme-li nyní algebru  $\mathbf{Z}(+, -)$ , pak  $\langle 1 \rangle = \mathbf{Z}$ .

Zobecníme princip dobře známý z lineární algebry, který říká, že je homomorfismus určen hodnotami na množině generátorů:

**Poznámka 9.4.** *Bud'  $f, g : A \rightarrow B$  dva homomorfismy algeber stejného typu a nechť  $X \subseteq A$  generuje algebru  $A$ . Jestliže  $f(x) = g(x)$  pro všechna  $x \in X$ , potom  $f = g$ .*

*Důkaz.* Nejprve ukážeme, že je množina  $C = \{a \in A \mid f(a) = g(a)\}$  podalgebrou algebry  $A$ . Vezměme  $n$ -ární operaci  $\alpha$  algebry  $A$  a nechť  $a_1, \dots, a_n \in C$ . Pak  $f(\alpha(a_1, \dots, a_n)) = \alpha(f(a_1), \dots, f(a_n)) = \alpha(g(a_1), \dots, g(a_n)) = g(\alpha(a_1, \dots, a_n))$ , proto  $\alpha(a_1, \dots, a_n) \in C$ . Všimneme-li si, že  $X \subseteq C$ , dostaneme  $A = \langle X \rangle \subseteq C$ , čímž jsme dokončili důkaz.  $\square$

**Příklad 9.5.** (1) Uvažujme grupu celých čísel  $\mathbf{Z}(+)$  a  $G(+)$  nějaký grupoid, tedy algebru s jednou binární operací  $+$ . Nechť  $f, g : \mathbf{Z} \rightarrow G$  je homomorfismus. Uvědomme si, že nejmenší podalgebra  $\mathbf{Z}(+)$  obsahující množinu  $\{-1, 1\}$  je už rovna celému



$\mathbf{Z}$  tj.  $\langle\{-1, 1\}\rangle = \mathbf{Z}$ . Podle předchozí poznámky jsou tedy  $f$  a  $g$  shodné, jestliže  $f(1) = g(1)$  a  $f(-1) = g(-1)$ .

(2) Uvažujme-li nyní dva homomorfismy  $f, g : \mathbf{Z} \rightarrow G$  na algebře celých čísel  $\mathbf{Z}(+, -)$  a obecné algebře  $G(+, -)$  s jednou binární operací  $+$  a jednou unární operací  $-$ . Necht'  $f, g : \mathbf{Z} \rightarrow G$  je homomorfismus. Potom  $\langle 1 \rangle = \mathbf{Z}$ , a podle 9.4 jsou  $f$  a  $g$  shodné, jestliže  $f(1) = g(1)$ .

Velmi důležitým a užitečným faktem obecné algebry, který jsme už bez velkých komentářů několikrát použili, je pozorování, že dvě izomorfní algebry jsou z hlediska algebry nerozlišitelné, mají všechny vlastnosti stejné a platí o nich tudíž stejná tvrzení. Důvod platnosti takového pozorování je v podstatě velmi elementární: u vlastností izomorfních algeber nezáleží na tom jak konkrétně vypadají jejich prvky (a „překlad“ zajišťuje bijekce určená izomorfismem), podstatné je, že operace jsou na odpovídajících prvcích stejné, což právě zajišťuje slučitelnost operace s izomorfismem. Samotná přesná formalizace uvedené myšlenky vyžaduje pečlivou práci s formální logikou a my ji zde pouze pro informaci alespoň naznačíme.

Připomeňme, že term je jakákoli proměnná a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy a  $\alpha$  funkční symboly (operace) četnosti  $n$ , pak i  $\alpha(t_1, \dots, t_n)$  je term, dále je-li  $P$  predikát četnosti  $n$  a  $t_1, \dots, t_n$  jsou termy, pak je výraz  $P(t_1, \dots, t_n)$  atomickou formulí a a jsou-li  $\varphi$  a  $\psi$  dvě formule, pak výrazy  $(\varphi \rightarrow \psi)$ ,  $(\varphi \wedge \psi)$ ,  $(\varphi \vee \psi)$ ,  $\neg\varphi$ ,  $\forall\varphi$  a  $\exists\varphi$  jsou rovněž formule. Jazykem predikátové logiky (prvního řádu) potom rozumíme všechny formule, které vyniknou z daného systémem funkčních a predikátových symbolů.

Dále připomeňme, že formule  $\varphi$  platí ve struktuře  $\mathbf{A}$  (tedy například v algebře s daným systémem operací, které se v jazyce algeber daného typu objeví jako funkční symboly), právě když je  $\varphi$  splněna každým ohodnocením proměnných nosné množiny  $A$  struktury  $\mathbf{A}$ . Uzavřenou formulí rozumíme formuli, která neobsahuje žádnou volnou proměnnou. V našich úvahách se pro jednoduchost omezíme na jazyk s jediným predikátovým symbolem  $=$  a proměnnými jako prvky algebry.

**Poznámka 9.6.** Necht'  $A(\alpha_i \mid i \in I)$  a  $B(\alpha_i \mid i \in I)$  jsou dvě izomorfní algebry (stejněho typu). Potom uzavřená formule  $\varphi$  jazyka algeber platí v algebře  $A(\alpha_i \mid i \in I)$ , právě když platí v algebře  $B(\alpha_i \mid i \in I)$ .

*Důkaz.* Necht'  $f : A \rightarrow B$  je nějaký izomorfismus algeber  $\mathbf{A} = A(\alpha_i \mid i \in I)$  a  $\mathbf{B} = B(\alpha_i \mid i \in I)$ ,  $\varphi$  formule. Vezmeme-li nějaké ohodnocení  $e$  formule  $\varphi$  v  $A$ , označíme  $fe$ , které hodnotě  $e(x)$  nějaké proměnné v  $A$  přiřadí hodnotu  $fe(x)$  téže proměnné v  $B$ . Je-li  $E$  množina všech ohodnocení formule  $\varphi$  v  $A$ , vidíme, že množina  $\{fe \mid e \in E\}$  tvoří právě množinu všech ohodnocení formule  $\varphi$  v  $B$ , neboť  $f$  je bijekce. Dále snadno nahlédneme, že a pro každou uzavřenou formuli  $\varphi$  platí, že buď  $\mathbf{A} \models \varphi$  nebo  $\mathbf{A} \models \neg\varphi$ , a protože  $f$  je izomorfismus algeber  $\mathbf{A}$  a  $\mathbf{B}$ , stačí indukci podle počtu kroků, jimiž je  $\varphi$  odvozena z atomických formulí a jimiž jsou v nich vytvořeny zúčastněné termy, dokázat  $\mathbf{A} \models \varphi$  implikuje  $\mathbf{B} \models \varphi$ .

Nejprve uvážíme jedinou atomickou formuli  $t = s$ , kde  $t = t(x_1, \dots, x_n)$  a  $s = s(x_1, \dots, x_n)$  jsou termy v proměnných  $x_1, \dots, x_n$ . Mějme realizaci nějaké funkčního symbolu na obou algebrách, tedy právě  $n$ -ární operaci  $\alpha_i$  pro nějaké  $i \in I$  a předpokládáme například, že  $t = \alpha_i(t_1, \dots, t_n)$ , kde  $t_1, \dots, t_n$  jsou termy a necht'  $e$  je nějaké ohodnocení formule  $t = s$ . Protože  $e(\alpha_i(t_1, \dots, t_n)) = \alpha_i(e(t_1), \dots, e(t_n))$  a z indukčního předpokladu užitého pro termy  $t_1, \dots, t_n$  víme, že  $f(e(t_i)) = fe(t_i)$

(t.j. obraz izomorfismem  $f$  termu  $t_i$  ohodnoceného v algebře  $A$  pomocí  $e$  je týž jako ohodnocení termu  $t_i$  ohodnocený v algebře  $B$  ohodnocením  $fe$ ). Protože je  $f$  homomorfismus, vidíme, že

$$\begin{aligned} f(e(\alpha_i(t_1, \dots, t_n))) &= f(\alpha_i(e(t_1), \dots, e(t_n))) = \\ &= \alpha_i(fe(t_1), \dots, fe(t_n)) = fe(\alpha_i(t_1, \dots, t_n)). \end{aligned}$$

Tím jsme ověřili, že platnost  $e(t) = e(s)$  implikuje platnost  $fe(t) = fe(s)$ .

Zbytek důkazu už je jen přímočaré indukční ověření platnosti formule na  $\mathbf{B}$  vzniklé použitím pravidel  $(\varphi \rightarrow \psi)$ ,  $(\varphi \wedge \psi)$ ,  $(\varphi \vee \psi)$ ,  $\neg\varphi$ ,  $(\forall x)\varphi$  a  $(\exists x)\varphi$  z kratších formulí  $\varphi$  a  $\psi$  za předpokladu, že daná dlouhá formule platí na  $\mathbf{A}$ .  $\square$

Závěrem poznamenejme, že ve skutečnosti na izomorfních algebrách ekvivalence platí i pro výroky vyřčené v mnohem bohatším jazyce (například tvrzení, které se vyslovuje o struktuře podalgeber nějaké algebry).

## 10. OKRUHY A IDEÁLY

Nyní obrátíme svou pozornost k další důležité třídě algebraických objektů, jimiž jsou okruhy. Protože je naším hlavním cílem konstrukce a algoritmické uchopení (především konečných) těles, zaměříme se především na obecnou konstrukci polynomů.

**Definice.** *Okruhem* budeme nazývat každou takovou algebru  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$ , že  $R(+)$  je komutativní grupa s neutrálním prvkem  $0$  a operací opačného prvku  $-$ ,  $R(\cdot)$  je monoid s neutrálním prvkem  $1$  a pro každé  $a, b, c \in R$  platí, že  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$  a  $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ . Okruh se nazývá *komutativní*, je-li operace  $\cdot$  komutativní.

Prvek okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  se nazývá *invertibilní*, jedná-li se o *invertibilní prvek monoidu  $R(\cdot)$*  a o (komutativní) okruhu řekneme, že je (komutativní) *těleso*, jsou-li *všechny prvky množiny  $R \setminus \{0\}$  invertibilní* a  $0 \neq 1$ .

**Příklad 10.1.** (1) Je-li  $T$  těleso ve smyslu definice z lineární algebry, pak je algebra  $T(+, \cdot, -, 0, 1)$  komutativním tělesem.

(2) Je-li  $T$  těleso a  $M_n(T)$  značí množinu všech čtvercových matic nad  $T$  stupně  $n$ , pak  $M_n(T)(+, \cdot, -, \mathbf{0}_n, \mathbf{I}_n)$  je okruh.

(3)  $\mathbb{Z}(+, \cdot, -, 0, 1)$  a  $\mathbb{Z}_n(+, \cdot, -, 0, 1)$  pro každé přirozené  $n > 1$  jsou komutativní okruhy.

**Poznámka 10.2.** *Nechť  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  je okruh. Pak pro každé  $a, b \in R$  platí:*

- (1)  $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$ ,
- (2)  $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ ,  $(-1) \cdot a = a \cdot (-1) = -a$ ,
- (3)  $1$  je různé od  $0$ , právě když  $|R| > 1$  (tj.  $R$  je netriviální okruh).

*Důkaz.* U bodů (1) a (2) dokážeme jen jednu rovnost, důkaz druhé je symetrický.

(1) Využijeme-li definitorickou vlastnost prvku  $0$  a distributivitu, dostaneme  $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$ . Přičteme-li k levé a pravé straně rovnosti  $a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$  prvek  $-(0 \cdot a)$ , vidíme, že  $a \cdot 0 = 0$ .

(2) Opět díky distributivitě máme  $(-a) \cdot b + a \cdot b = (-a + a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$ , kde poslední rovnost plyne z (1).

Poslední rovnost dostáváme přímo z (2) pro  $b = 1$ .

(3) Prímá implikace je triviální, předpokládejme tedy, že  $1 = 0$  a vezměme libovolné  $a \in R$ . Potom  $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$  podle definice a (1).  $\square$

**Definice.** Necht  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  je okruh. Řekneme, že množina  $I \subseteq R$  je *pravý* (resp. *levý*) *ideál* okruhu  $R$ , jestliže je  $I$  podgrupa grupy  $R(+)$  a pro každé  $i \in I$  a  $r \in R$  platí, že  $i \cdot r \in I$  (resp.  $r \cdot i \in I$ ). Množinu  $I$  nazveme *ideálem*, je-li pravým a zároveň levým ideálem. *Homomorfismus* (*izomorfismus*) okruhů bude homomorfismus (izomorfismus) příslušných algeber.

**Příklad 10.3.** (1)  $\{0\}$  a  $R$  jsou (tzv. *triviálními*) ideály každého okruhu  $R$ .

(2) Podle 6.5 jsou ideály okruhu celých čísel  $\mathbb{Z}(+, \cdot, -, 0, 1)$  právě tvaru  $k\mathbb{Z}$  a ideály okruhu  $\mathbb{Z}_n(+, \cdot, -, 0, 1)$  tvaru  $k\mathbb{Z}_n$ , kde  $k < n$  je 0 nebo dělitel čísla  $n$ .

(3) Množiny  $aR = \{a \cdot r \mid r \in R\}$  (resp.  $Ra = \{r \cdot a \mid r \in R\}$ ) jsou (tzv. *hlavní*) *pravé* (resp. *levé*) ideály okruhu  $R$  pro každé  $a \in R$ . Ověříme to například pro  $aR$ . Je-li  $ar, as \in aR$ , pak díky distributivitě  $ar + as = a(r + s) \in aR$  a  $-ar = a(-r) \in aR$  podle 10.2(2). Dále  $0 = a0 \in aR$  díky 10.2(1) a  $(ar)x = a(rx) \in aR$  díky asociativitě pro libovolné  $x \in R$ . (4) V libovolném komutativním okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  pro prvky  $a, b$  definujeme  $a|b$ ,  $a$  dělí  $b$ , standardně vztahem  $(\exists c \in R) ac = b$ . Z definice hlavního ideálu ihned plyne, že  $a|b \Leftrightarrow bR \subseteq aR$ .

**Definice.** O (levém, pravém) ideálu  $I$  okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  řekneme, že je *vlastní*, jestliže  $I \neq \{0\}$  a  $I \neq R$ , že je *maximální*, jestliže  $I \neq R$  a *neexistuje žádný* (levý, pravý) ideál  $J$  splňující  $I \subset J \subset R$  a  $I \neq J \neq R$ .

**Poznámka 10.4.** Je-li  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  okruh a  $I$  jeho pravý nebo levý ideál, pak  $I = R$ , právě když  $1 \in I$ .

*Důkaz.* Přímá implikace je triviální. Jestliže  $1 \in I$  a  $r \in R$ , potom  $r = 1 \cdot r = (r \cdot 1) \in I$ , je-li  $I$  pravý (levý) ideál.  $\square$

**Věta 10.5.** V netriviálním okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  je ekvivalentní:

- (1)  $R$  je těleso,
- (2)  $R$  neobsahuje žádné vlastní pravé ideály,
- (3)  $R$  neobsahuje žádné vlastní levé ideály.

*Důkaz.* Stačí dokázat ekvivalenci (1) a (2).

Předpokládejme, že je  $R$  těleso a mějme nějaký nenulový pravý ideál  $I$ . Pak existuje  $0 \neq i \in I$  a k němu inverzní prvek  $i^{-1} \in R$ , tedy  $1 = i \cdot i^{-1} \in I$  a proto  $I = R$  podle 10.4.

Předpokládejme, že  $R$  neobsahuje žádné vlastní pravé ideály a vezmeme libovolné nenulový prvek  $a \in R$ . Potom  $0 \neq a = a \cdot 1 \in aR$ , tedy podle předpokladu  $aR = R$ . Proto existuje  $b \in R$ , pro nějž  $a \cdot b = 1$ . Poznamenejme, že díky 10.2(1) a (4) opět  $b \neq 0$ , a tudíž můžeme stejným argumentem najít  $c \in R$ , pro které  $b \cdot c = 1$ . Nyní  $a = c$  podle 3.5 a  $b$  je tedy inverzní k  $a$ .  $\square$

Poznamenejme, že existují okruhy (říká se jim *jednoduché*), které neobsahují žádné vlastní (oboustranné) ideály, a zároveň se nejedná o tělesa. Typickým příkladem jsou maticové okruhy  $M_n(T)$ , kde  $n > 1$  a  $T$  je komutativní těleso.

Uvážíme-li ideál  $I$  okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$ , pak je  $I$  podgrupa grupy  $R(+)$ , tedy můžeme pracovat s ekvivalencí  $\text{rmod } I$  danou podmínkou  $(a, b) \in \text{rmod } I \Leftrightarrow a - b = a + (-b) \in I$ .

Nyní budeme aplikovat Větu 4.8 na aditivní grupu okruhu:

**Poznámka 10.6.** Je-li  $I$  ideál okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$ , potom je faktorová algebra  $R/I(+, \cdot, -, [0]_I, [1]_I)$  rovněž okruh a  $\text{Ker } \varphi$  je ideál pro každý homomorfismus okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  do okruhu  $S(+, \cdot, -, 0, 1)$ .

*Důkaz.* Tom že je  $R/I(+, \cdot, -, I, 1 + I)$  okruh se snadno přímočaře ověří z definice.

$\text{Ker}\varphi$  je určitě normální podgrupa a zbývá nahlédnout, že pro každé  $r \in R$  a  $k \in \text{Ker}\varphi$  je

$$\varphi(r \cdot k) = \varphi(r) \cdot \varphi(k) = \varphi(r) \cdot 0 = 0 = 0 \cdot \varphi(r) = \varphi(k) \cdot \varphi(r) = \varphi(k \cdot r),$$

tedy  $r \cdot k, k \cdot r \in \text{Ker}\varphi$ .  $\square$

Takto zavedenému okruhu říkáme **faktorový okruh** (nebo krátce **faktorokruh**) okruhu  $R$  podle ideálu  $I$ .

**Věta 10.7.** *At'  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  je komutativní okruh a  $I$  jeho ideál. Potom  $R/I$  je těleso právě tehdy, když  $I$  je maximální ideál.*

*Důkaz.* At'  $R/I$  je těleso a buď  $J \supsetneq I$  ideál v  $R$ . Potom je  $\pi_I(J)$  ideál v  $R/I$ , přičemž  $\pi_I(J) \neq \{I\}$ , tj. nejde o triviální (nulový) ideál. Podle Věty 10.5 musí být již  $\pi_I(J) = R/I$ . Musí tedy existovat  $r \in J$  tak, že  $r + I = 1 + I$ , tj.  $1 - r \in I$ , z čehož ihned plyne  $1 = r + (1 - r) \in J$ , a proto  $J = R$ . Dokázali jsme, že  $I$  je maximální ideál.

Je-li naopak  $I$  maximální ideál a  $a \in R \setminus I$  (tj.  $a + I \neq I$  v okruhu  $R/I$ ), potom z maximality  $I$  (je totiž nutně  $aR + I = R$ ) dostáváme existenci takového  $r \in R$  a  $i \in I$ , že  $ar + i = 1$  (a tedy  $1 - ar \in I$ ). Jinak řečeno  $(a + I)(r + I) = ar + I = 1 + I$  v okruhu  $R/I$ , což znamená, že  $r + I$  je inverz v okruhu  $R/I$  k nenulovému prvku  $a + I$ . Ověřili jsme, že  $R/I$  je těleso.  $\square$

**Definice.** Buď okruh. Položme  $R[x] = \{p : \mathbf{N}_0 \rightarrow R \mid \{n \mid p(n) \neq 0\} \text{ je konečné}\}$ . Prvek  $p \in R[x]$  budeme zapisovat také ve tvaru  $p = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} p_n x^n$ , kde  $p_n = p(n)$ , tedy  $R[x]$  obsahuje právě všechny formální nekonečné sumy s konečným nosičem. Na  $R[x]$  definujeme binární operace  $+$  a  $\cdot$ , unární operaci  $-$  a nulární operace  $\mathbf{0}$  a  $\mathbf{1}$  pro  $p = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} p_n x^n$  a  $q = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} q_n x^n$ :

$$\begin{aligned} p + q &= \sum_{n \in \mathbf{N}_0} (p_n + q_n) x^n, & p \cdot q &= \sum_{n \in \mathbf{N}_0} \left( \sum_{i=0}^n p_i \cdot q_{n-i} \right) x^n, \\ -p &= \sum_{n \in \mathbf{N}_0} -p_n x^n, & \mathbf{0} &= \sum_{n \in \mathbf{N}_0} 0 x^n, & \mathbf{1} &= 1x^0 + \sum_{n>0} 0x^n. \end{aligned}$$

Je-li  $p \neq \mathbf{0}$ , budeme největší takové  $n \in \mathbf{N}_0$ , že  $p_n \neq 0$ , nazývat stupněm polynomu  $p$ . Stupeň polynomu  $\mathbf{0}$  položíme roven  $-1$ . Stupeň polynomu  $p$  budeme označovat  $\text{st } p$ .

**Poznámka 10.8.** *Nechť  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  je okruh a  $p, q \in R[x]$ .*

- (1)  $R[x](+, \cdot, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$  je okruh a množina  $\{sx^0 \mid s \in R\}$  jeho podokruh izomorfní okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$ ,
- (2)  $\text{st } p + q \leq \max(\text{st } p, \text{st } q)$ ,
- (3) je-li  $p, q \neq \mathbf{0}$ , pak  $\text{st } p \cdot q \leq \text{st } p + \text{st } q$ , je-li navíc  $R$  oborem integrity, potom  $\text{st } p \cdot q = \text{st } p + \text{st } q$ ,
- (4)  $R[x]$  je obor integrity právě tehdy, když je  $R$  obor integrity,

*Důkaz.* Mějme  $p = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} p_n x^n$ ,  $q = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} q_n x^n$ ,  $r = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} r_n x^n \in R[x]$ .

(1) Nejprve poznamenejme, že jsou všechny operace dobře definované a přímočaře ověříme komutativitu a asociativitu operace  $+$ :

$$p + q = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} (p_n + q_n) x^n = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} (q_n + p_n) x^n = q + p,$$

$$(p + q) + r = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} ((p_n + q_n) + r_n) x^n = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} (p_n + (q_n + r_n)) x^n = p + (q + r).$$

Protože  $\mathbf{0}$  je zjevně neutrální prvek operace  $+$  a vidíme, že  $p + (-p) = \mathbf{0}$ , je  $R(+, -, 0)$  komutativní grupa. Podobně

$$\begin{aligned} r \cdot (p + q) &= r \cdot \sum_{n \in \mathbf{N}_0} (p_n + q_n) x^n = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} \left( \sum_{i=0}^n r_i \cdot (p_{n-i} + q_{n-i}) \right) x^n = \\ &= \sum_{n \in \mathbf{N}_0} \left( \sum_{i=0}^n r_i \cdot p_{n-i} \right) x^n + \sum_{n \in \mathbf{N}_0} \left( \sum_{i=0}^n r_i \cdot q_{n-i} \right) x^n = p \cdot r + q \cdot r, \end{aligned}$$

důkaz druhé distributivity je symetrický. Konečně zbývá ověřit, že je  $R(\cdot, 1)$  monoid:

$$(p \cdot q) \cdot r = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} \left( \sum_{i+j=n} p_i \cdot q_j \right) x^n \cdot r = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} \left( \sum_{i+j+k=n} p_i \cdot q_j \cdot r_k \right) x^n = p \cdot (q \cdot r).$$

a

$$p \cdot \mathbf{1} = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} \left( \sum_{i=0}^n p_i \cdot \mathbf{1}_{n-i} \right) x^n = \sum_{n \in \mathbf{N}_0} (p_n \cdot \mathbf{1}) x^n = p = \mathbf{1} \cdot p,$$

kde  $\mathbf{1} = \sum_n \mathbf{1}_n x^n$ , tedy  $\mathbf{1}_0 = 1$  a  $\mathbf{1}_n = 0$  pro všechna  $n > 0$ . Bezprostředně z konstrukce okruhu  $R[x]$  vidíme, že zobrazení  $\nu : R \rightarrow R[x]$  dané vztahem  $\nu(r) = rx^0$  je prostý okruhový homomorfismus, proto díky 9.1(2) dostáváme izomorfismus okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  s podokruhem  $\nu(R) = \{sx^0 \mid s \in R\}$ .

(2) Plyne z inkluze  $\{n \mid p_n + q_n \neq 0\} \subseteq \{n \mid p_n \neq 0\} \cup \{n \mid q_n \neq 0\}$ .

(3) Označme  $\nu = \text{st } p$  a  $\mu = \text{st } q$  a uvědomme si pro každé  $n > \nu + \mu$ , že koeficient u  $x^n$  v polynomu  $p \cdot q$  je  $\sum_{k=0}^n (p_k \cdot q_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-\mu} (p_k \cdot 0) + \sum_{k=n-\mu+1}^n (0 \cdot q_{n-k}) = 0$ , proto  $\text{st } p \cdot q \leq \nu + \mu$ .

Je-li  $R$  obor integrity, máme koeficient polynomu  $p \cdot q$  u  $x^{\nu+\mu}$ :

$$\sum_{k=0}^{\nu+\mu} (p_k \cdot q_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-\mu-1} (p_k \cdot 0) + p_\nu \cdot q_\mu + \sum_{k=n-\mu+1}^n (0 \cdot q_{n-k}) = p_\nu \cdot q_\mu \neq 0,$$

neboť  $p_\nu \neq 0$  a  $q_\mu \neq 0$ .

(4) Je-li  $R[x]$  obor integrity, je každý jeho podokruh oborem integrity, tedy i okruh  $R$  podle (1). Je-li  $R$  obor integrity a  $p, q \neq \mathbf{0}$ , máme podle (3)  $\text{st } p \cdot q = \text{st } p + \text{st } q \geq 0$ , proto  $p \cdot q \neq 0$ .  $\square$

Okruhu  $R[x](+, \cdot, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$  budeme říkat *okruhem polynomů* (jedné neurčitě) a jeho prvkům *polynomy*.

**Věta 10.9** (Dělení se zbytkem). *Nechť  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  je obor integrity, a,  $b \in R[x]$ , kde  $b = \sum b_n x^n$ . Předpokládejme, že  $m = \text{st } b \geq 0$  a  $b_m$  je invertibilní v  $R$ . Pak existují takové jednoznačně určené polynomy  $q, r \in R[x]$ , že  $a = b \cdot q + r$  a  $\text{st } r < \text{st } b$ .*

*Důkaz.* Tvrzení dokážeme indukcí podle  $n = \text{st } a - \text{st } b$ . Jestliže  $\text{st } a < \text{st } b$ , a tedy  $n < 0$ , stačí položit  $q = 0$  a  $r = a$ . Platí-li existenční tvrzení pro všechna  $i < n$ , dokážeme ho pro  $n$ . Bud'  $a = \sum a_n x^n$  a položíme  $q_0 = a_{n+m} b_m^{-1} x^n$  a  $t = a - q_0 \cdot b$ . Podle 10.8(2) a (3) je  $\text{st } t \leq \max(\text{st } a, \text{st } q_0 + \text{st } b) = n + m$  a koeficient polynomu  $t$  u mocniny  $x^{n+m}$  je  $a_{n+m} - a_{n+m} b_m^{-1} b_m = 0$ , tedy  $\text{st } t - \text{st } b < n$  a můžeme pro polynom  $t$  užít indukčního předpokladu, podle nějž existují takové polynomy  $q_1$  a  $r$ , že  $t = b \cdot q_1 + r$  a  $\text{st } r < \text{st } b$ . Položíme-li nyní  $q = q_0 + q_1$ , dostáváme

$$b \cdot q + r = b \cdot q_0 + b \cdot q_1 + r = b \cdot q_0 + t = a.$$

Konečně předpokládejme, že  $a = b \cdot q' + r'$  a  $\text{st } r' < \text{st } b$ . Potom  $b \cdot (q - q') = r' - r$  a podle 10.8(3) a protože  $\text{st}(r' - r) < \text{st } b$ , dostáváme  $r' - r = 0$ , a proto  $q - q' = 0$   $\square$

## 11. KONSTRUKCE TĚLES

**Věta 11.1.** *Nechť  $T(+, \cdot, -, 0, 1)$  je komutativní těleso. Pak je každý ideál okruhu  $T[x](+, \cdot, -, 0, 1)$  hlavní.*

*Důkaz.* Vezměme libovolný nenulový ideál  $I$  a v ideálu  $I$  zvolme nenulový polynom  $p$  nejmenšího možného stupně. Zřejmě  $pT[x] \subseteq I$ . Nechť  $i \in I$ . Pak podle 10.9 existují takové polynomy  $q, r \in T[x]$ , že  $i = p \cdot q + r$  a  $\text{st}(r) < \text{st}(p)$ . Protože  $r = i - p \cdot q \in I$  a  $\text{st}(p)$  byl minimální, je nutně  $r = 0$  a  $pT[x] = I$ .  $\square$

Je-li  $T$  komutativní těleso, ukážeme, jak poznat maximální ideály v okruhu  $T[x]$ , tj. okruhu polynomů v jedné neurčité (značené  $x$ ) s koeficienty v  $T$ .

**Definice.** O polynomu  $f \in T[x]$  stupně alespoň jedna řekneme, že je *ireducibilní*, pokud neexistují polynomy  $g, h \in T[x]$  takové, že  $f = gh$  a současně  $\deg g, \deg h < \deg f$ .

**Poznámka 11.2.** *Bud'  $T$  komutativní těleso a  $I$  ideál okruhu  $T[x]$  a  $g \in T[x]$ .*

- (1) *existuje  $f \in T[x]$  takové, že  $I = fT[x]$ ,*
- (2)  *$I$  je maximální právě tehdy, když existuje ireducibilní polynom  $f \in T[x]$  takový, že  $I = fT[x]$*

*Důkaz.* (1) Je-li  $I = \{0\}$ , položme  $f = 0$ . Jinak vezměme nenulové  $f \in I$  nejmenšího možného stupně. Ukážeme, že  $I = fT[x]$ .

Bud'  $g \in I$  libovolné. Vydělme  $g$  polynomem  $f$  se zbytkem: existují tedy  $q, r \in T[x]$  tak, že  $g = qf + r$  a  $\deg r < \deg f$ . Jelikož  $f, g \in I$  a  $I$  je ideál, máme rovněž  $r = g - qf \in I$ , a tedy  $r = 0$  vzhledem k minimalitě stupně  $f$ . Jelikož  $g$  bylo libovolné, ukázali jsme, že  $I \subseteq fT[x]$ . Druhá inkluze je triviální.

(2) Z Poznámky 11.2 víme, že existuje  $f \in T[x]$  takový, že  $I = fT[x]$ . Dále stačí využít vztahu z Příkladu 10.3(4): pro ideál  $gT[x]$  máme  $fT[x] \subsetneq gT[x] \subsetneq T[x] \Leftrightarrow g|f$  a současně  $g \nmid 1$  a  $f \nmid g$ ; pravá strana ekvivalence neříká nic jiného, než  $g|f$  a  $0 < \deg g < \deg f$ , tj.  $f$  není ireducibilní.  $\square$

Nyní zkonstruujeme konečná (komutativní) tělesa, přičemž budeme následující výsledek brát jako fakt (bez důkazu).

**Tvrzení.** Pro každé prvočíslo  $p$  a  $n \in \mathbb{N}$  existuje ireducibilní polynom  $f \in \mathbb{Z}_p[x]$  stupně  $n$ . Navíc v  $\mathbb{Z}_p[x]$  platí  $f|(x^{p^n} - x)$ .

Větu o konečných tělesech zformulujeme v klasickém znění. Důkaz bodů (2) a (3) ovšem uvádíme jen informativně.

**Věta 11.3.** (1) *Pro každé prvočíslo  $p$  a  $n \in \mathbb{N}$  existuje komutativní těleso o  $p^n$  prvcích.*

(2) *Je-li  $\mathbb{F}$  konečné těleso, pak  $|\mathbb{F}| = p^n$  pro  $p$  prvočíslo a  $n \in \mathbb{N}$ .*

(3) *Libovolná dvě konečná komutativní tělesa o témže počtu prvků jsou izomorfní.*

*Důkaz.* (1) Z faktu výše máme existenci ireducibilního polynomu  $f \in \mathbb{Z}_p[x]$  stupně  $n$ . Definujme  $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x]$ . Potom z Poznámky 11.2(2) a Věty 10.7 plyne, že

$\mathbb{F}_{p^n}$  je komutativní těleso. Označíme-li  $I = f\mathbb{Z}_p[x]$ , v tomto tělese (pro  $g, h \in \mathbb{Z}_p[x]$ ) platí  $g + I = h + I$  právě tehdy, když  $f$  dělí  $g - h$ ; mj. tedy  $g + I = (g \bmod f) + I$ . Jako zbytky po dělení  $f$  figurují právě všechny polynomy nad  $\mathbb{Z}_p$  stupně  $< n$ , těch je  $p^n$ , což je následně i počet prvků  $\mathbb{F}_{p^n}$ .

(2) Buď  $\mathbb{F}$  konečné těleso. Uvažujme cyklickou podgrupu  $\langle 1 \rangle$  grupy  $\mathbb{F}(+, -, 0)$ . Ta musí být konečná, a tedy  $\mathbb{Z}_p(+) \cong \langle 1 \rangle(+) \cong \mathbb{Z}_p$  pro nějaké  $p \in \mathbb{N}$ . Uvažujme izomorfismus, který posílá prvek  $k \in \mathbb{Z}_p$  na prvek  $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{k \times}$  tělesa  $\mathbb{F}$ , a jak je v podobných

případech zvykem, pro další úvahy ztotožníme prvky tělesa  $\mathbb{F}$  tvaru  $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{k \times}$ ,

kde  $0 \leq k < p$ , a prvky množiny  $\mathbb{Z}_p$ . Z grupy  $\mathbb{Z}_p$  tímto ztotožněním uděláme podgrupu grupy  $\mathbb{F}(+, -, 0)$ .

Jelikož z distributivity máme  $\underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_{k \times} \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_{m \times} = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{km \times} =$   
 $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{(km \bmod p) \times}$ , tvoří  $\mathbb{Z}_p$  dokonce podokruh tělesa  $\mathbb{F}$ .

Dále,  $p$  musí být prvočíslo. Jinak by existovaly  $0 \neq k, m \in \mathbb{Z}_p$  tak, že  $km = 0$ , což v žádném tělese (tedy ani v  $\mathbb{F}$ ) není možné.

Nyní je již snadné si uvědomit, že  $\mathbb{F}$  tvoří vektorový prostor nad svým podtělesem  $\mathbb{Z}_p$ , a tedy  $\dim_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{F} = n \in \mathbb{N}$ . V důsledku toho jest  $|\mathbb{F}| = p^n$ .

(3) Ukážeme, že je-li  $\mathbb{F}$  konečné komutativní těleso o  $p^n$  prvcích, potom  $\mathbb{F} \cong \mathbb{F}_{p^n}$  (z části (1) důkazu). Tak jako v bodu (2) budeme BÚNO předpokládat, že  $\mathbb{Z}_p$  je přímo podtělesem tělesa  $\mathbb{F}$  (nikoliv pouze izomorfní podtělesu generovanému prvkem 1).

Nejprve nahlédneme, že každý prvek tělesa  $\mathbb{F}$  je kořenem polynomu  $x^{p^n} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ . To pro 0 zřejmě platí a pro nenulové prvky to plyne aplikací Poznámky 7.1 na grupu  $\mathbb{F}^*(\cdot, ^{-1}, 1)$ , která má  $p^n - 1$  prvků.

Z faktu výše plyne, že ireducibilní polynom  $f \in \mathbb{Z}_p[x]$  použitý ke konstrukci tělesa  $\mathbb{F}_{p^n}$ , dělí v  $\mathbb{Z}_p[x]$  polynom  $x^{p^n} - x$ . To ovšem znamená, že ho dělí i v jeho nadokruhu  $\mathbb{F}[x]$ . Máme tedy nějaký polynom  $g$  takový, že  $fg = x^{p^n} - x$ . Dosadíme-li nyní libovolný prvek  $a \in \mathbb{F}$ , máme  $f(a)g(a) = 0$ , což znamená, že  $a$  je kořen jednoho ze dvou těchto polynomů. Jelikož polynom  $g$  má menší stupeň než  $p^n$  (a tedy méně než  $p^n$  kořenů), musí existovat nějaké  $a \in \mathbb{F}$ , které je kořenem polynomu  $f$ .

Pro toto  $a$  uvažujme (dosazovací) homomorfismus  $d_a : \mathbb{Z}_p[x] \rightarrow \mathbb{F}$  definovaný vztahem  $d_a(h) = h(a)$ . Výše jsme dokázali, že  $f\mathbb{Z}_p[x] \subseteq \text{Ker}(d_a)$ . Můžeme proto užít Větu o homomorfismu pro okruhy, která nám dá (jediný) okruhový homomorfismus  $\psi : \mathbb{Z}_p[x]/f\mathbb{Z}_p[x] \rightarrow \mathbb{F}$ , pro nějž  $d_a = \psi \pi_{f\mathbb{Z}_p[x]}$ . Jelikož  $d_a(1) = 1 \neq 0$ , je  $\psi$  nenulový homomorfismus. Víme, že  $\text{Ker}(\psi)$  musí být ideál tělesa  $\mathbb{F}_{p^n}$ , a tedy nutně  $\text{Ker}(\psi)$  je triviální (jednoprvkový) ideál (užíváme Větu 10.5). To ovšem znamená, že  $\psi$  je prosté, a tedy musí být i na, jelikož jde o zobrazení mezi dvěma stejně velkými konečnými množinami. Tudíž  $\psi$  je hledaný izomorfismus těles  $\mathbb{F}_{p^n}$  a  $\mathbb{F}$ .  $\square$

Wedderburnova věta říká, že všechna konečná tělesa jsou komutativní. Důkaz ale není nikterak triviální. V důkazu části (3) jsme využili komutativitu tělesa  $\mathbb{F}$ , abychom mohli argumentovat, že polynom  $g$  nemá v  $\mathbb{F}$  více kořenů, než je jeho stupeň; to ovšem nad nekomutativními tělesy neplatí! Stačí uvážit polynom  $x^2 + 1$  nad tělesem kvaternionů. Ten má za kořeny  $i, j, k, -i, -j, -k$ .

Důkaz následujícího důležitého tvrzení o konečných multiplikativních grupách vyžaduje jisté znalosti z teorie polynomů nad obecným tělesem, proto ho provedeme až v příštím semestru:

**Věta 11.4.** *Nechť  $T(+, \cdot)$  je komutativní těleso a nechť  $G$  je konečná podgrupa multiplikativní grupy  $T \setminus \{0\}(\cdot)$ . Potom  $G$  je cyklická grupa.*

**Příklad 11.5.** (1) Je-li  $p$  prvočíslo, pak  $\mathbb{Z}_p$  je se sčítáním a násobením modulo  $p$  těleso, proto je podle předchozí věty  $\mathbb{Z}_p^*(\cdot)$  cyklická grupa řádu  $p - 1$ . Je-li  $p - 1 = \prod_{i=1}^k p_i^{s_i}$  prvočíselný rozklad, kde  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  a  $r_i > 0$ , pak můžeme generátory a podgrupy grupy  $\mathbb{Z}_p^*(\cdot)$  počítat postupem Příkladu 7.4. Tedy  $\mathbb{Z}_p^*(\cdot)$  obsahuje právě  $\prod_{i=1}^k (p_i - 1)p_i^{r_i-1}$  generátorů a  $\prod_{i=1}^k (r_i + 1)$  podgrup.

(2) Z předchozí úvahy plyne, že  $\mathbb{Z}_{53}^*(\cdot)$  je cyklická grupa řádu  $52 = 2^2 \cdot 13$ , proto  $\mathbb{Z}_{53}^*(\cdot)$  obsahuje právě  $2 \cdot 12 = 24$  generátorů a  $3 \cdot 2 = 6$  podgrup.

**Definice.** Okruh  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  se nazývá *komutativní*, je-li operace  $\cdot$  komutativní. Komutativní okruh nazveme *oborem integrity*, platí-li pro každé  $a, b \in R$ , že  $a \cdot b = 0$  implikuje  $a = 0$  nebo  $b = 0$ .

*Podokruhem* okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  budeme rozumět každou podalgebru algebry  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$ .

**Příklad 11.6.** (1) Okruhu celých čísel  $\mathbf{Z}(+, \cdot, -, 0, 1)$  je oborem integrity.

(2) Každé komutativní těleso i každý jeho podokruh jsou obory integrity.

(3) Okruh reálných polynomů  $\mathbf{R}[x](+, \cdot, -, 0, 1)$  je obor integrity.

Následující tvrzení zobecňuje dobře známou konstrukci zlomků pro všechny obory integrity. Ukážeme, že každý obor integrity lze chápat jako podokruh nějakého tělesa, tedy bod (2) předchozího příkladu je jediným možným typem příkladu oboru integrity.

Uvažujme obor integrity  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$ , a definujme algebru  $F(+, \cdot, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ , kde  $F = R \times (R \setminus \{0\})$  s operacemi:  $(a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d)$ ,  $(a, b) + (c, d) = (a \cdot d + b \cdot c, b \cdot d)$ ,  $-(a, b) = (-a, b)$ ,  $\mathbf{0} = (0, 1)$  a  $\mathbf{1} = (1, 1)$ . Na algebře  $F(+, \cdot, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$  konečně definujme relaci  $\sim$  předpisem  $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$ .

**Věta 11.7.** *Pro algebru  $F(+, \cdot, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$  platí:*

- (1)  $F(+)$  a  $F(\cdot)$  jsou komutativní monoidy,
- (2)  $\sim$  je kongruence na  $F(+, \cdot, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$  a  $(0, a) \sim \mathbf{0}$  a  $(a, a) \sim \mathbf{1}$  pro každé  $a \in R \setminus \{0\}$ ,
- (3)  $F/\sim$  je komutativní těleso,
- (4) zobrazení  $\sigma : R \rightarrow F/\sim$  dané předpisem  $\sigma(r) = [(r, 1)]_\sim$  je prostý okruhový homomorfismus.

*Důkaz.* Vezměme  $(a, b), (c, d), (e, f) \in F$ .

(1) Postupujeme zcela přímočaře podle definice.

$$\begin{aligned} (a, b) + ((c, d) + (e, f)) &= (a, b) + ((cf + de, df)) = ((adf + b(cf + de), bdf)) = \\ &= ((adf + bcf + bde, bdf)) = (((ad + bc)f + bde, bdf)) = ((a, b) + (c, d)) + (e, f), \\ (a, b) + (c, d) &= (ad + bc, bd) = (cb + ad, bd) = (c, d) + (a, b). \end{aligned}$$

Ověřili jsme, že je operace  $+$  asociativní a komutativní. Uvážíme-li, že  $(a, b) + (0, 1) = (a, b)$ , máme dokázáno, že  $F(+)$  je komutativní monoid. Totéž provedeme pro násobení:

$$(a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) = (a, b) \cdot ((ce, df)) = (ace, bdf) = ((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f),$$



dále  $(a, b) \cdot (c, d) = (c, d) \cdot (a, b)$  a  $(a, b) \cdot (1, 1) = (a, b)$ , proto i  $F(\cdot)$  je komutativní monoid.

(2) Předně uvažme, že je relace  $\sim$  zřejmě reflexivní a symetrická a předpokládejme, že  $(a, b) \sim (c, d)$  a  $(c, d) \sim (e, f)$ , tedy  $ad = bc$  a  $cf = de$ . Potom  $adf = bcf = bde$ , a proto  $(af - be)d = 0$ . Jelikož  $d \neq 0$ , dostáváme z definice oboru integrity, že  $af - be = 0$ , a tudíž  $(a, b) \sim (e, f)$ . Díky pozorování Příkladu 3.3 z minulého semestru zbývá ověřit sloučitelnost  $\sim$  s operacemi  $+$ ,  $\cdot$  a  $-$ . Předpokládejme, že  $(a_i, b_i) \sim (c_i, d_i)$  tedy  $a_i d_i = c_i b_i$  pro  $i = 1, 2$ . Proto  $(a_1 b_2 + b_1 a_2) d_1 d_2 = a_1 d_1 \cdot b_2 d_2 + a_2 d_2 \cdot b_1 d_1 = c_1 b_1 \cdot b_2 d_2 + c_2 b_2 \cdot b_1 d_1 = (c_1 d_2 + d_1 c_2) b_1 b_2$ , tedy  $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) \sim (c_1, d_1) + (c_2, d_2)$ . Dále  $a_1 a_2 d_1 d_2 = c_1 c_2 b_1 b_2$ , tudíž  $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) \sim (c_1, d_1) \cdot (c_2, d_2)$  a konečně  $(-a_1, b_1) \sim (-c_1, d_1)$  podle 5.2(2). Vztahy  $(0, a) \sim \mathbf{0}$  a  $(a, a) \sim \mathbf{1}$  plynou okamžitě z definice  $\sim$ .

(3) Díky (1), (2) a 3.10 už víme, že  $F/\sim (+)$  a  $F/\sim (\cdot)$  jsou komutativní monoidy. Zbývá tedy dokázat existenci opačných prvků monoidu  $F/\sim (+)$  a distributivitu. Označme  $\frac{a}{b}$  rozkladové třídy  $[(a, b)]_\sim$ . Všimněme si, že  $\frac{ad}{bd} = \frac{ac}{bc}$  pro každé nenulové  $b, d \in R$ , protože  $(ad, bd) \sim (ac, bc)$ . Nyní snadno spočítáme, že

$$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{a + (-a)}{bb} = \frac{0}{bb} = \mathbf{0},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} = \frac{acf + bdae}{bdf} = \frac{acf + ade}{bdf} = \frac{a}{b} \cdot \frac{cf + de}{df} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right).$$

Konečně, zvolíme-li  $\frac{a}{b} \neq \mathbf{0}$ , pak  $(a, b) \not\sim (0, 1)$ , tedy  $a \neq 0$ , a proto  $\frac{b}{a} \in F$  a  $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \mathbf{1}$ . Tím jsme dokázali, že každý nenulový prvek  $F$  je invertibilní, a proto je  $F/\sim$  komutativní těleso.

(4) Okamžitě vidíme, že je  $\frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \frac{a \cdot b}{1}$ ,  $\frac{a}{1} + \frac{b}{1} = \frac{a+b}{1}$  a  $\sigma(1) = \mathbf{1}$ , proto je  $\sigma$  homomorfismus. Konečně, je-li  $\sigma(a) = \sigma(b)$ , pak  $a = b$ , tedy jde o prostý homomorfismus.  $\square$

**Definice.** Komutativní těleso  $F/\sim$  budeme nazývat *podílovým tělesem* okruhu  $R$  a jeho prvky budeme značit  $\frac{a}{b} = [(a, b)]_\sim$ .

**Příklad 11.8.** (1) Těleso racionálních čísel  $\mathbf{Q}(+, \cdot, -, 0, 1)$  je podílovým tělesem okruhu celých čísel  $\mathbf{Z}(+, \cdot, -, 0, 1)$ .

(2) Těleso racionálních lomených funkcí je podílovým tělesem okruhu reálných polynomů  $\mathbf{R}[x](+, \cdot, -, 0, 1)$ .

## 12. SVAZY

Připomeňme, že relaci  $\leq$  na množině  $M$  budeme říkat *uspořádání*, je-li reflexivní a tranzitivní a splňuje-li podmínku  $a \leq b$ ,  $b \leq a \Rightarrow a = b$  pro každé  $a, b \in M$  (tj. jde o slabě antisymetrickou relaci). Dvojice  $(M, \leq)$  se obvykle nazývá uspořádaná množina.

**Definice.** Necht'  $\leq$  je uspořádání na množině  $M$  a  $A \subseteq M$ . Řekneme, že  $m \in A$  je *nejmenší* (resp. *největší*) prvek množiny  $A$ , jestliže  $m \leq a$  (resp.  $a \leq m$ ) pro všechna  $a \in A$ . *Supremem* (resp. *infimem*) množiny  $A$  budeme rozumět nejmenší prvek množiny  $\{n \in M \mid \forall a \in A : a \leq n\}$  (resp. největší prvek množiny  $\{n \in M \mid \forall a \in A : n \leq a\}$ ), supremum značíme  $\sup_{\leq}$  a infimum  $\inf_{\leq}$ . Dvojici  $(M, \leq)$  budeme říkat *svaz*, pokud pro každé dva prvky  $a, b \in A$  existuje supremum a infimum

množiny  $\{a, b\}$ . Svaz  $(M, \leq)$  je úplným svazem, existuje-li supremum a infimum každé podmnožiny množiny  $M$ .

**Příklad 12.1.** Připomeňme známé příklady uspořádání a svazů:

- (1) Relace dělení  $/$  je uspořádání na množině všech přirozených čísel  $\mathbf{N}$ , navíc  $\sup_/(n, m) = nsn(n, m)$  a  $\inf_/(a, b) = NSD(n, m)$ , proto je  $(\mathbf{N}, /)$  svaz.
- (2) Přirozené uspořádání  $\leq$  indukce na množině všech celých (reálných, racionálních) čísel  $\mathbf{Z}$  ( $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{Q}$ ) strukturu (dokonce lineárně uspořádaného) svazu, kde  $\sup_{\leq}(a, b) = \max(a, b)$  a  $\inf_{\leq}(a, b) = \min(a, b)$ .
- (3) Inkluze tvoří na množině všech podmnožin  $\mathcal{P}(X)$  množiny  $X$  uspořádání a  $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$  úplný svaz kde  $\sup_{\subseteq}(\mathcal{B}) = \bigcup \mathcal{B}$  a  $\inf_{\subseteq}(\mathcal{B}) = \bigcap \mathcal{B}$  pro každou podmnožinu  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ .
- (4) Je-li  $\mathcal{C}$  množina všech podalgeber nebo všech kongruencí na nějaké algebře, ukážeme, že  $(\mathcal{C}, \subseteq)$  tvoří úplný svaz, kde  $\sup_{\subseteq}(\mathcal{B}) = \bigcap \{C \in \mathcal{C} \mid \bigcup \mathcal{B} \subseteq C\}$  a  $\inf_{\subseteq}(\mathcal{B}) = \bigcap \mathcal{B}$  pro každé  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{C}$ .  
 $\subseteq$  je uspořádání a  $\bigcap \mathcal{B}$  je zjevně infimem. Protože je množina  $\mathcal{C}$  dle 8.6 uzavřená na průniky, vidíme, že  $\bigcap \{X \in \mathcal{C} \mid \bigcup \mathcal{B} \subseteq X\}$  tvoří nejmenší prvkem  $\mathcal{C}$  obsahujícím všechna  $B \in \mathcal{B}$ , což je podle definice právě supremum vzhledem k inkluzi.
- (5) id je na libovolné neprázdné množině  $M$  uspořádání, ovšem pro  $|M| > 1$  se jistě nejedná o svaz.

Je-li  $(M, \leq)$  svaz, budeme pro každé dva prvky  $m, n \in M$  značit  $m \vee n = \sup_{\leq}(m, n)$  a  $m \wedge n = \inf_{\leq}(m, n)$ . Zavedené binární operace  $\vee$  nazveme *spojení* a  $\wedge$  *průsek*.

**Věta 12.2.** (1) Je-li  $(M, \leq)$  svaz, pak pro všechna  $a, b, c \in M$  platí:

- (S1)  $a \vee b = b \vee a$ ,  $a \wedge b = b \wedge a$ ,
- (S2)  $a \vee a = a = a \wedge a$ ,
- (S3)  $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$ ,  $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$ ,
- (S4)  $a \vee (b \wedge a) = a = a \wedge (b \vee a)$ .

(2) Necht'  $M(\wedge, \vee)$  je algebra s dvěma binárními operacemi, které splňují podmínky (S1) – (S4) a definujeme na  $M$  relaci  $\leq$  předpisem:  $a \leq b \Leftrightarrow b = a \vee b$ . Pak platí  $a \leq b \Leftrightarrow a = a \wedge b$ , dále  $(M, \leq)$  je svaz a  $\sup_{\leq}(a, b) = a \vee b$  a  $\inf_{\leq}(a, b) = a \wedge b$ .

*Důkaz.* (1) Vlastnosti (S1) a (S2) jsou okamžitým důsledkem definice  $\wedge$  a  $\vee$ .

(S3) Položme  $d = a \vee (b \vee c)$ . Dokážeme, že je  $d$  supremem množiny  $\{a, b, c\}$ . Podle definice  $\vee$  je  $a \leq d$  a  $b, c \leq b \vee c \leq d$ , tedy  $d$  je horní odhad množiny  $\{a, b, c\}$ . Zvolme nějaké  $e$ , pro něž  $a, b, c \leq e$ . Pak  $(b \vee c) \leq e$ , protože je  $e$  horní odhad množiny  $\{b, c\}$  a  $(b \vee c)$  je supremem této množiny. Stejným argumentem dostaneme  $a \vee (b \vee c) \leq e$ , tedy  $a \vee (b \vee c) = \sup_{\leq}(\{a, b, c\}) = c \vee (a \vee b) = (a \vee b) \vee c$  díky (S1). Důkaz druhé podmínky je symetrický.

(S4) Protože  $b \wedge a \leq a$  a  $a \leq a$ , máme  $a \vee (b \wedge a) \leq a$ . Naopak  $a \leq a \vee (b \wedge a)$ , tedy ze slabé antisymetrie plyne, že  $a = a \vee (b \wedge a)$ . I tentokrát pro ověření druhé podmínky stačí zaměnit spojení průsekem a relaci  $\leq$  relací  $\geq$ .

(2) Nejprve ukážeme, že je  $\leq$  uspořádání. Protože  $a = a \vee a$  díky (S2), máme podle definice  $a \leq a$ . Vezmeme-li  $a \leq b$  a  $b \leq c$ , tj.  $b = a \vee b$ ,  $c = b \vee c$ , pak  $c = (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) = a \vee c$  díky (S3), tedy  $a \leq c$ . Konečně platí-li, že  $a \leq b$  a  $b \leq a$ , dostáváme z (S1), že  $b = a \vee b = b \vee a = a$ .

Nyní ověříme, že  $b = a \vee b \Leftrightarrow a = a \wedge b$ . Za symetrie podmínek pro  $\wedge$  a  $\vee$  plyne, že stačí abychom ověřili jen jednu implikaci. Necht' například  $b = a \vee b$ . Potom  $a \wedge b = a \wedge (a \vee b) = a \wedge (b \vee a) = a$  podle (S1) a (S4). Vidíme, že je definice  $\leq$  symetricky formulovatelná pomocí podmínky  $a \leq b \Leftrightarrow a = a \wedge b$ .

Zbývá dokázat, že  $\sup_{\leq}(a, b) = a \vee b$  (tvrzení pro  $\wedge$  se dokáže symetricky). Předně  $a \vee (a \vee b) = (a \vee a) \vee b = a \vee b$  díky (S3) a (S2) a  $b \vee (a \vee b) = (a \vee b) \vee b = a \vee (b \vee b) = a \vee b$  díky (S1), (S3) a (S2), tudíž  $a, b \leq (a \vee b)$ . Vezmeme-li prvek  $c$ , pro který  $a, b \leq c$ , pak  $c = a \vee c$  a  $c = b \vee c$ , proto  $c = a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$  podle (S3). Tím jsme ověřili, že  $(a \vee b) \leq c$ , což znamená, že  $\sup_{\leq}(a, b) = a \vee b$ .  $\square$

Dokázané tvrzení poskytuje dva ekvivalentní pohledy na svaz: buď jako na uspořádanou množinu se supremy a infimy nebo algebru splňující čtveřici axiomů (S1)–(S4).

**Příklad 12.3.** U příkladů svazů uvedených v 12.1 máme tedy dva způsoby jak na svaz nahlížet:

- (1)  $(\mathbf{N}, /)$  odpovídá algebře  $\mathbf{N}(\text{GCD}, \text{lcm})$ ,
- (2)  $(\mathbf{Z}, \leq)$  (respektive  $(\mathbf{R}, \leq)$ ,  $(\mathbf{Q}, \leq)$ ) odpovídá algebře  $\mathbf{Z}(\text{min}, \text{max})$  (respektive  $\mathbf{R}(\text{min}, \text{max})$ ,  $\mathbf{Q}(\text{min}, \text{max})$ ),
- (3)  $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$  odpovídá algebře  $\mathcal{P}(X)(\cap, \cup)$ .

**Definice.** O svazu  $S(\wedge, \vee)$  řekneme, že je *distributivní*, platí-li pro každé  $a, b, c \in S$  rovnost  $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ .

**Poznámka 12.4.** Svaz  $S(\wedge, \vee)$  je distributivní, právě když pro každé  $a, b, c \in S$  platí, že  $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ , tedy svaz  $S(\wedge, \vee)$  je distributivní, právě když je opačný svaz  $S(\vee, \wedge)$  distributivní.

*Důkaz.* Ze symetrie vlastností operací plyne, že stačí dokázat pouze jednu implikaci. Necht' je svaz distributivní. Budeme s využitím definice distributivity a 12.2 upravovat:  $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = ((a \wedge b) \vee a) \wedge ((a \wedge b) \vee c) = a \wedge (a \vee c) \wedge (b \vee c) = a \wedge (b \vee c)$ , kde druhá rovnost plyne z (S4) a třetí rovnost plyne z (S1) a (S4) a  $\square$

**Příklad 12.5.** (1) Svaz  $\mathcal{P}(X)(\cap, \cup)$ , kde  $\mathcal{P}(X)$  je množina všech podmnožin množiny  $X$ , je distributivní.

(2) Necht'  $M_5 = \{\mathbf{0}, \mathbf{1}, u, v, w\}$ , buď  $\mathbf{0}$  nejmenší prvek,  $\mathbf{1}$  největší prvek a  $u \vee v = u \vee w = v \vee w = \mathbf{1}$  a  $u \wedge v = u \wedge w = v \wedge w = \mathbf{0}$ . Protože  $u \vee (v \wedge w) = u \vee \mathbf{0} \neq \mathbf{1} = \mathbf{1} \wedge \mathbf{1} (u \vee v) \wedge (u \vee w)$ , není  $M_5(\wedge, \vee)$  distributivní svaz. (říká se mu obvykle diamant).

**Definice.** Necht'  $f : A \rightarrow B$  je zobrazení a  $(A, \leq)$  a  $(B, \leq)$  jsou svazy. Řekneme, že je  $f$  *homomorfismus* (*izomorfismus*) jde-li o homomorfismus (izomorfismus) algeber  $A(\wedge, \vee)$  a  $B(\wedge, \vee)$  a  $f$  nazveme *monotónním* zobrazením, platí-li implikace  $a_1 \leq a_2 \Rightarrow f(a_1) \leq f(a_2)$ . *Podsvazem* svazu  $A(\wedge, \vee)$  budeme rozumět podalgebru algebry  $A(\wedge, \vee)$ .

**Poznámka 12.6.** Homomorfismus svazů je monotónní zobrazení.

*Důkaz.* Je-li  $f : A \rightarrow B$  homomorfismus svazů a  $a_1 \leq a_2 \in A$ , pak  $a_2 = a_1 \vee a_2$ . Proto  $f(a_2) = f(a_1 \vee a_2) = f(a_1) \vee f(a_2)$  a tedy  $f(a_1) \leq f(a_2)$ .  $\square$

**Věta 12.7.** Bijekce svazů  $f$  je izomorfismus, právě když jsou  $f$  i  $f^{-1}$  monotónní zobrazení.

*Důkaz.* Díky 12.6 stačí dokázat zpětnou implikaci. Ověříme sloučitelnost  $f$  například s  $\vee$ . Mějme  $f : A \rightarrow B$  takovou bijekci svazů, že  $f$  i  $f^{-1}$  jsou monotónní, a zvolme  $a, b \in A$ . Protože  $a, b \leq a \vee b$ , je  $f(a), f(b) \leq f(a \vee b)$ , tudíž  $f(a) \vee f(b) \leq f(a \vee b)$ . Podobně  $f(a), f(b) \leq f(a) \vee f(b)$ , proto  $a, b \leq f^{-1}(f(a) \vee f(b))$  a  $a \vee b \leq f^{-1}(f(a) \vee f(b))$ . Použijeme-li na poslední vztah znovu monotónii  $f$ , dostaneme  $f(a \vee b) \leq f(a) \vee f(b)$ . Ze slabé antisymetrie  $\leq$ , potom plyne, že  $f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$ .  $\square$

**Příklad 12.8.** Uvažujme svazy  $(S_1, \leq)$  a  $(S_2, \leq)$ , kde  $S_1 = \{0, 1, a, b\}$ ,  $S_2 = \{0, 1, A, B\}$  a daný relacemi:  $0 < a < 1$ ,  $0 < b < 1$  a  $0 < A < B < 1$ . Potom zobrazení  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ ,  $f(a) = A$ ,  $f(b) = B$  je monotónní, ale není to homomorfismus svazů, protože  $f(a \wedge b) = f(0) = 0 \neq A = f(a) \wedge f(b)$ .

### 13. BOOLEOVY ALGEBRY

**Definice.** Necht' má svaz  $S(\wedge, \vee)$  nejmenší prvek  $0$  a největší prvek  $1$ . Prvek  $a \in S$  nazveme *atomem* (resp. *koatomem*), jestliže  $a$  pokrývá  $0$  (resp.  $1$  pokrývá  $a$ ). *Komplementem* prvku  $a \in S$  nazveme takový prvek  $a' \in S$ , že  $a \vee a' = 1$  a  $a \wedge a' = 0$ .

**Poznámka 13.1.** Každý prvek distributivního svazu má nejvýše jeden komplement.

*Důkaz.* Necht'  $a \vee b_i = 1$  a  $a \wedge b_i = 0$  pro  $i = 1, 2$ . Pak  $b_i = b_i \wedge 1 = b_i \wedge (a \vee b_j) = (b_i \wedge a) \vee (b_i \wedge b_j) = 0 \vee (b_i \wedge b_j) = b_i \wedge b_j$ , tedy  $b_i \leq b_j$  pro všechna  $i, j \in \{1, 2\}$ , což znamená, že  $b_1 = b_2$ .  $\square$

Konečné uspořádané množiny je často výhodné znázornit Hasseovým diagramem, připomeňme jeho definici:

**Definice.** Necht'  $(M, \leq)$  je uspořádaná množina a  $a, b, c \in M$ . Řekneme, že prvek  $b$  *pokrývá* prvek  $a$  (píšeme  $a < b$ ), jestliže  $a \leq b$ ,  $a$  není  $b$  a  $a \leq c \leq b \Rightarrow c = a$  nebo  $c = b$ . *Hasseovým diagramem* uspořádané množiny  $(M, \leq)$  rozumíme orientovaný graf, jehož vrcholy tvoří prvky množiny  $M$  a  $a$  je s  $b$  spojen takovou hranou, že  $b$  se nachází výše než  $a$ , právě když  $b$  pokrývá  $a$ .

**Definice.** *Booleovou algebrou* nazveme takovou algebru  $S(\vee, \wedge, 0, 1, ')$ , že  $S(\wedge, \vee)$  je distributivní svaz s největším prvkem  $1$  a nejmenším prvkem  $0$  a unární operace  $'$  přiřadí každému prvku jeho komplement. *Homomorfismem* (izomorfismem) Booleových algeber rozumíme homomorfismus (izomorfismus) algeber v obvyklém smyslu.

**Příklad 13.2.** Necht'  $\mathcal{P}(X)$  je množina všech podmnožin množiny  $X$  a pro každou podmnožinu  $Y \subseteq X$  definujme  $Y' = X \setminus Y$ . Pak  $\mathcal{P}(X)(\cup, \cap, \emptyset, X, ')$  je Booleova algebra.

**Poznámka 13.3.** Necht'  $S(\vee, \wedge, 0, 1, ')$  je Booleova algebra. Pak pro každé  $a, b \in S$  platí:

- (1)  $(a')' = a$ ,
- (2)  $(1)' = 0$  a  $(0)' = 1$ ,
- (3)  $(a \vee b)' = a' \wedge b'$ ,
- (4)  $(a \wedge b)' = a' \vee b'$ .

*Důkaz.* (1) a (2) plyne přímo z definice a 13.1 a (4) je symetrické k (3).

(3)  $(a \vee b) \wedge (a' \wedge b') = (a \wedge a' \wedge b') \vee (b \wedge a' \wedge b') = 0 \vee 0 = 0$  a podobně  $(a \vee b) \vee (a' \wedge b') = (a \vee b \vee a') \wedge (a \vee b \vee b') = 1 \vee 1 = 1$ .  $\square$

Vezmeme-li  $M = \{m_1, \dots, m_n\}$  neprázdnou konečnou podmnožinu Booleovy algebry, pak značme  $\bigwedge M = m_1 \wedge m_2 \wedge \dots \wedge m_n$  a  $\bigvee M = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_n$ . Dále  $\bigwedge \emptyset = \mathbf{1}$  a  $\bigvee \emptyset = \mathbf{0}$ .

**Věta 13.4.** *Bud'  $S(\vee, \wedge, \mathbf{0}, \mathbf{1}, ')$  konečná Booleova algebra a  $A$  buď množina všech atomů svazu  $S$ . Potom zobrazení  $\phi : \mathcal{P}(A) \rightarrow S$  dané předpisem  $\phi(B) = \sup B$  je izomorfismus Booleových algeber  $S(\vee, \wedge, \mathbf{0}, \mathbf{1}, ')$  a  $P(A)(\cup, \cap, \emptyset, X, ')$ .*

*Důkaz.* Pro každé  $M = \{m_1, \dots, m_n\} \subseteq S$  značme  $\bigwedge M = m_1 \wedge m_2 \wedge \dots \wedge m_n$  a  $\bigvee M = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_n$ , dále  $\bigwedge \emptyset = \mathbf{1}$  a  $\bigvee \emptyset = \mathbf{0}$ .

Definujeme nejprve zobrazení  $\psi : S \rightarrow \mathcal{P}(A)$  předpisem  $\psi(s) = \{a \in A \mid a \leq s\}$ . Okamžitě vidíme, že zobrazení  $\phi$  i  $\psi$  jsou monotónní vzhledem k inkluzi a  $\phi(\emptyset) = \mathbf{0}$ . Ukážeme-li navíc, že je  $\phi$  bijekce slučitelná s průsekem a spojením, pak nutně  $\phi(A) = \mathbf{1}$  a  $\phi(B') = \phi(B)'$  pro každé  $B \in \mathcal{P}(A)$ . Podle 12.7 tedy zbývá ověřit, že  $\phi \circ \psi = \text{Id}_S$  i  $\psi \circ \phi = \text{Id}_{\mathcal{P}(A)}$ , tedy že  $\phi$  je bijekce a  $\phi^{-1} = \psi$ .

Položme  $t = \phi\psi(s) = \bigvee \{a \in A \mid a \leq s\}$ . Potom  $t = \bigvee \{a \in A \mid a \leq s\} \leq s$ . Všimněme si, že díky distributivitě  $s = s \wedge \mathbf{1} = s \wedge (t \vee t') = (s \wedge t) \vee (s \wedge t') = t \vee (s \wedge t')$ . Předpokládáme-li, že  $t \neq s$ , pak z předchozího vidíme, že  $(s \wedge t') \neq \mathbf{0}$ , a díky konečnosti  $S$  najdeme nějaký atom  $a_0$ , který leží pod prvkem  $s \wedge t'$ , tedy  $a \leq t'$  a  $a \in \psi(s)$ , a proto  $a \leq t$ . Zjistili jsme, že  $a \leq t \wedge t' = \mathbf{0}$ , což je spor, tudíž  $s = t$ .

Nyní položme  $C = \psi\phi(B) = \{a \in A \mid a \leq \bigvee B\}$ . Vezmeme-li  $b \in B$ , pak  $b \leq \bigvee B$ , a proto  $b \in C$ , čímž jsme ověřili inkluzi  $B \subseteq C$ . Zvolme tedy  $c \in C$  a uvažme, že  $\mathbf{0} \neq c = c \wedge \bigvee B = \bigvee \{c \wedge b \mid b \in B\}$  díky distributivitě a konečnosti  $B$ . To ovšem znamená, že existuje  $b \in B$ , pro něž  $c \wedge b \neq \mathbf{0}$ . Protože jsou oba prvky  $b$  a  $c$  atomy, máme  $b = c$ , čímž jsme dokázali, že  $B = C$ .  $\square$

**Příklad 13.5.** (1) Je-li  $S(\vee, \wedge, \mathbf{0}, \mathbf{1}, ')$  Booleova algebra o  $64 = 2^6$  prvcích, pak je podle předchozí věty izomorfní Booleově algebře  $P(X)(\cup, \cap, \emptyset, , ')$  pro  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

(2) Neexistuje žádná patnáctiprvková Booleova algebra, protože podle Věty 13.4 musí být každá Booleova algebra izomorfní potenční Booleově algebře, tedy musí mít  $2^n$  prvků, kde  $n$  je počet atomů.

**Definice.** Nechť je  $A$  množina a  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(A)$  je nějaký systém podmnožin množiny  $A$ . Řekneme, že  $\mathcal{C}$  je *uzávěrovým systémem nad  $A$* , pokud

- (1)  $A \in \mathcal{C}$ ,
- (2) pro každý podsystém  $\{B_i \mid i \in I\} \subseteq \mathcal{C}$ , je  $\bigcap \{B_i \mid i \in I\} \in \mathcal{C}$ .

**Poznámka 13.6.** *Bud'  $\mathcal{C}$  uzavěrový systém obsažený v systému všech ekvivalencí na množině  $A$ . Nechť pro  $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(A)$  a  $e \in A$  platí:*

- (a)  $[e]_\rho \in \mathcal{N}$  pro každé  $\rho \in \mathcal{C}$ ,
- (b) pro každé  $N \in \mathcal{N}$  existuje takové  $\rho \in \mathcal{C}$ , že  $N = [e]_\rho$ ,
- (c) pro každé  $\rho, \eta \in \mathcal{C}$  platí, že  $[e]_\rho \subseteq [e]_\eta \Rightarrow \rho \subseteq \eta$ .

*Pak  $\mathcal{N}$  je uzavěrový systém na  $A$  (a tedy svaz) a zobrazení  $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{N}$  dané předpisem  $\varphi(\rho) = [e]_\rho$  je izomorfismus svazů.*

*Důkaz.* Nejprve ukážeme, že je  $\mathcal{N}$  uzavěrový systém. Protože  $A \times A \in \mathcal{C}$ , máme  $A = [e]_{A \times A} \in \mathcal{N}$  díky (a). Vezmeme-li  $N_i \in \mathcal{N}$ ,  $i \in I$ , pak podle (b) existuje pro každé  $i \in I$  taková ekvivalence  $\rho_i \in \mathcal{C}$ , že  $N_i = [e]_{\rho_i}$ . Protože je  $\mathcal{C}$  uzavěrový systém, tedy  $\bigcap_{i \in I} \rho_i \in \mathcal{C}$ , dostáváme  $\bigcap_{i \in I} N_i = \bigcap_{i \in I} [e]_{\rho_i} = [e]_{\bigcap_{i \in I} \rho_i} \in \mathcal{N}$  opět díky (a).

Nyní stačí podle 12.7 ověřit, že je  $\varphi$  dobře definovaná bijekce a že  $\varphi$  i  $\varphi^{-1}$  jsou monotónní vzhledem k inkluzi. Korektnost definice přitom zaručuje podmínka (a), podmínka (b) říká, že je  $\varphi$  na  $\mathcal{N}$ , a z podmínky (c) plyne, že jde o prosté zobrazení. Konečně, je-li  $\rho \subseteq \eta$ , pak  $[e]_\rho \subseteq [e]_\eta$  pro každou dvojici ekvivalencí  $\rho$  a  $\eta$ , což zaručuje monotónii  $\varphi$ , a monotónie  $\varphi^{-1}$  je přímo obsahem podmínky (c).  $\square$

**Věta 13.7.** (1) *Všechny normální podgrupy libovolné grupy  $G(\cdot)$  tvoří svaz a zobrazení  $\rho \rightarrow [1]_\rho$  je izomorfismus svazu všech kongruencí na grupě  $G(\cdot)$  svazu všech normálních podgrup.*

(2) *Všechny kongruence a všechny ideály okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  tvoří spolu s inkluzí svazy a zobrazení  $\rho \rightarrow [0]_\rho$  je izomorfismus svazu všech kongruencí na svazu všech ideálů okruhu  $R$ .*

*Důkaz.* (1) Označme symbolem  $\mathcal{C}$  množinu všech kongruencí na  $G(\cdot)$ , tj. ekvivalencí slučitelných s operací  $\cdot$  (viz 8.4(3)), symbolem  $\mathcal{N}$  množinu všech normálních podgrup  $G(\cdot)$  a symbolem  $e$  neutrální prvek  $G(\cdot)$ . Z 12.1(4) plyne, že je  $\mathcal{C}$  uzávěrový systém a 4.8 zaručuje, že jsou splněny předpoklady (a), (b), (c) Poznámky 13.6, odkud plyne závěr.

(2) Nejprve dokážeme, že ekvivalence  $\rho$  je kongruence na  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$ , právě když  $[0]_\rho$  je ideál a  $(a, b) \in \rho \Leftrightarrow a - b \in [0]_\rho$ . Je-li  $\rho$  je kongruence na okruhu  $R$ , pak jde také o kongruenci grupy  $R(+)$ , proto je  $[0]_\rho$  podle 4.8 podgrupou  $R(+)$  a  $(a, b) \in \rho \Leftrightarrow a - b \in [0]_\rho$ . Zbývá ověřit, že jde o ideál. Zvolme  $i \in [0]_\rho$  a  $r \in R$ , tedy  $(i, 0) \in \rho$  a  $(r, r) \in \rho$ , proto  $(ir, 0) = (ir, 0r) \in \rho$  a  $(ri, 0) = (ri, r0) \in \rho$ , tedy  $ir, ri \in I$ .

Předpokládejme, že je  $I$  je ideál a definujme  $(a, b) \in \rho \Leftrightarrow a - b \in I$ . Potom  $I = [0]_\rho$  a podle 4.8 je  $\rho$  slučitelné s  $+$ . Zvolme  $(a, b), (c, d) \in \rho$ . Pak  $a - b, c - d, (a - b)c, b(c - d) \in [0]_\rho$ , a tudíž  $-a + b \in [0]_\rho$  a  $ac - bd = (a - b)c + b(c - d) \in [0]_\rho$ , proto  $(-a, -b), (a \cdot c, b \cdot d) \in \rho$ , čímž jsme ověřili, že je  $\rho$  kongruence na  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$ .

Nyní stejným způsobem jako v důkazu (1) nahlédneme že jsou pro  $e = 0$ ,  $\mathcal{C}$  množinu všech kongruencí a  $\mathcal{N}$  množinu všech ideálů okruhu  $R(+, \cdot, -, 0, 1)$  splněny předpoklady 13.6, odkud dostáváme závěr.  $\square$